

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط**

لوتان پلوس
أقراص

- لديك تضيق في الصمام الأبهري أو التاجي (تضيق صمامات القلب) أو إعتلال عضلة القلب الضخامي (مرض بؤدي لسمكة عضلة القلب)
- لديك سكري
- كان لديك داء القرفوس
- لديك أو كانت لديك حالة من التحسس، الربو أو حالة تسبب لك ألاماً في المفاصل، طفح جلدي وسخونة (البويوس - ذاتية إحصارية ههازية)
- لديك نسب مرتقبة من الكالسيوم أو نسب مرتقبة من البوتاسيوم أو كنت تخضع لحمية فقيرة البوتاسيوم
- كنت بحاجة لإجراء فحوص وظائف الغدة نظيرية الدانية، أنت ملزم بزيارة طبيبك أو الطاقم الطبي بذلك تناول أقراص لوتان پلوس
- كنت تعاني من فرط الداودستيرونية الأولى (متلازمة تحدث في أعقاب خلل في الغدة الكظرية وتتعلق بزيادة إفراز هرمون الداودستيرون من قبل الغدة)
- كنت تتناولوا أي أحد من الأدوية التالية التي تتغلب على معالجة ارتفاع ضغط الدم:

 - مثبطات ACE (مثلًا إيناتريپيل، إيزينوبيريل، راميبيريل)، خاصة إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى
 - تقلقيات السكري
 - أقراص السكري

من شأن طبيبك أن يقوم بفحص الأداء الوظيفي لكتيتك، ضغط الدم وكمية الشوارد الكهربائية (مثلًا، البوتاسيوم) في دم بفارصل زمنية محددة.

كنت تتناولوا أخرى مؤخرًا أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، يرجوك عليك إبلاغ الطبيب العادي أو الصيدلي عن ذلك.

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

انظر أيضًا المعلومات تحت عنوان «لا تتناول لوتان پلوس إذا»،

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

إذا كنت تتناولوا، أو إذا ثناوات مؤخرًا أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2).

Losartan potassium 50 mg
Hydrochlorothiazide 12.5 mg

يحتوي كل قرص من لوتان پلوس:

لوسارتان پلوتاسيوم 50 ملغ
هيدروكلوروتيازيد 12.5 ملغ

هيروكلاوروتيازيد 12.5 ملغ

إقرأ النشرة تمعن حتى نهايتها قبل استخدام الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن لوتان پلوس. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

وصف هذا الدواء غير العادي من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم، حتى ولو بدا لك أن حالته الطبية مشابهة لحالتك.

لوتان پلوس غير مخصص للأطفال والمرأة ما دون عمر 18 سنة.

(1) لأى غرض مخصوص الدواء؟

لوتان پلوس مخصص لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، ويساعد أيضًا على تقليل خطورة حدوث سكتة لدى مرضى يعانون من ضغط دم مرتفع أو متدفع، وسمكة في بطين الأيسر (البطين الأساسي) للقلب.

المضيبي الملاجيء، لوتان پلوس هو عبارة من مزيج من حاجب المستقبل أنجيوتنتسين II (لوسارتان) ومدر البول من نوع تيابيريد (هيروكلاوروتيازيد).

(2) قبل إستعمال لوتان پلوس

لتناول لوتان پلوس أداء:

كنت تتناولوا لوتان پلوس (أليلوج) لـ لوسانتران، هيروكلاوروتيازيد أو لك واحد من المركبات الأخرى لهذا الدواء (أنظر معلومات إضافية في الفقرة 6).

كنت حساسًا لمواد أخرى التي تعتبر من مشتقات سلفوناميدات (مثلًا، تيابيريد آخر)، بعض الأدوية المضادة للجراثيم مثل كوتريموكسازول، إسأل طبيبك إذا لم تكن واثقاً.

لديك خلل خطير في وظيفة الكلى.

لديك نسب مرتقبة من الصوديوم أو نسب مرتقبة من الكالسيوم التي لا يمكن تصحيحها بالعلاج.

كنت تناولوا لوتان پلوس أيضًا من تلقاءك.

كنت حامل أكثر من ثلاثة أشهر (يفضل أيضًا الإمتناع عن لوتان پلوس في بداية الحمل - أنظر فقرة «الحمل والإرضاخ»).

لديك ضرر خطير في وظيفة الكلى أو أن كليتك لا تنتج البول أبدًا.

لديك السكري أو خلل في وظائف الكلى و كنت تتناول دواء لتخفيض ضغط الدم الحادى على الأيسكرين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال لوتان پلوس:

تحذر من طبيبك، الصيدلي أو الممرضة قبل أن تتناول الدواء.

بنوتج على إبلاغ طبيبك بأنك تعتقدين بأنك حامل (أو من شانك أن تصبحي حاملًا)، لا يوصى بإستعمال لوتان پلوس في بداية الحمل ولا يجوز تناوله إذا كنت في الثلث الثاني والثالث من الحمل، وذلك لأنه قد يسبب ضررا خطيرا للرضيع إذا تناوله في هذه المرحلة (أنظر فقرة «الحمل والإرضاخ»).

قبل الملارج بـ لوتان پلوس من المهم إبلاغ الطبيب إذا:

أصبت في الماضي بسرطان الجلد، أو إذا ظهرت لديك آفة غير متوقعة في الجلد خلال فترة إستعمال الدواء.

إن إستعمال هيروكلاوروتيازيد قد يزيد من خطورة تطور سرطان في الجلد وفي الشفتين (سرطان الجلد من التعرض الشمسي والأشعة فوق البنفسجية (UV)) خلال فترة إستعمال لوتان پلوس.

عانتي في الماضي من انتفاخ في الوجه، الشفتين، الحجاجة أو الإنسان

كنت تناولتي مدرات بوالية.

كنت تناولي أو أنتين من تقييات و/أو إسهال شديد.

لديك قصور في القلب.

لديك خلل في وظائف الكبد (أنظر الفقرة 2 لا يجوز إستعمال لوتان پلوس إذا).

لديك تضيق في الشريانين المؤدية للكليتين (تضيق في شريانين الكليتين) أو لديك كلية واحدة فقط تعمل، أو إذا جزئت رعاية كلية في الأوعية الأخيرة.

لديك تضيق في الشريانين (تضليل عصيدي)، ذبحة صدرية (آلام في الصدر نتيجة تدلي وظيفة القلب)

يجب على إبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو من شانك أن تصبحي حاملًا) يوصيك طبيبك

