

עלון לצרכן לפי הקנות הרחוקים (תכשירים)

התש"פ - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אולזפין ODT טבע 5 מ"ג טבליות מסיסות בפה

הרכב:

לל טבליה מסיסה בפה מכילה:

אולזפין 5 mg מ"ג Olanzapine

אולזפין ODT טבע 10 מ"ג טבליות מסיסות בפה

הרכב:

לל טבליה מסיסה בפה מכילה:

אולזפין 10 mg מ"ג Olanzapine

לימדם על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. אם עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

מידע חיוני אודות התרופה:
תרופות אנטי פסיכוטיות (כגון **אולזפין ODT** **טבע**) עלולות להעלות את הסיכון לתמונה באשנים ממוגרם (הגבילים מבלבול, אובדן זיכרון וקשר לבעיות) (המגביה הקשורה לפסיכוזה). התרופה אינה מיועדת לטיפול בפסיכוזה במבוגרים הסובלים מדימנציה.

אולזפין ODT טבע מיועדת למבוגרים מעל גיל 18 שנים.

1. לימה מיועדת התרופה?

אולזפין אקטיו ואחזקתי בסכיזופרניה.

אולזפין ODT טבע מותווה לטיפול בתסמינים של הפרעות פסיכוטיות.

אולזפין ODT טבע מותווה לטיפול קצר טווח בהתקפי מאניה חריפים הקשורים להפרעה די-קוטבית.

מניעה של השינות בהפרעה די-קוטבית:

בחולים שהתקף המאניה שלהם הגיב לטיפול באולזפין, **אולזפין ODT טבע** מותווה למניעה של השינות בחולים עם הפרעה די-קוטבית.

טיפול משולב בהפרעה די-קוטבית :

השילוב של **אולזפין ODT טבע** עם ליתיום או ואלפראט מותווה לטיפול קצר טווח בהתקפי מאניה חריפים הקשורים להפרעה די-קוטבית .

קבוצה תרופוטית:

תרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפויות.

התסמינים של סכיזופרניה כוללים שמיעת קולות, ראיית דברים שאינם קיימים, אמונה בדברים שאינם נכונים, חשדות וניתוק.

התסמינים של הפרעה די-קוטבית מסוג I כוללים: לסיכון תקופות של דיכאון ושל מצב רוח מורמם או עצבנות, עלייה בפעילות וחוסר מנוחה, מחשבות אדורות, דיבור מהיר, שינויים בתיאבון, התנהגות אימפולסיבית וירידה בצורך לישון.

התסמינים של דיכאון עמיד כוללים ירידה במצב הרוח, העניינות נמוכה, עלייה בתחושת אשמה, ירידה באנרגיה, ירידה בהיגיון, שינויים בתיאבון, ומחשבות אובדניות או התנהגות אובדנית.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה גריש (אלרגי) לאולזפין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").
- למדם מפסיף על התוויות נגד של ליתיום או ואלפראטז של לפניו בסמוך התוויות נגד של העלונים המצורפים לריצה של תכשירים אלה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
אולזפין ODT טבע גורמת להפרעה ביכולת ההגן להפחית טמפרטורה. יש להימנע ממצבים בהם היתכן עליית יתר בחום הגוף והתייבשות. כגון פעילות גופנית מוגברת או שהייה תכופה במקומות חמים. יש להקפיד על שתיית נוזלים כדי למנוע התייבשות.

אולזפין ODT טבע עלולה לגרום לתת לחץ דם במעבר משכיבה לישיבה. התסמינים כוללים: סחרחורת, קצב מהיר או איטי, ובחלק מהחולים קצב הלב תלול. תופעה זו מתרחשת לרוב בתחילת הטיפול.

אולזפין ODT טבע עלולה לגרום לשינויות, תת לחץ דם במעבר משכיבה לישיבה ואי יציבות מוסרית ותחושתית שעלולים לגרום לפגיעות בתנואה מני שלברים ופגיעות נוספות. יש להשתמש בהירות ולשקף/סיכון/ תועלת במטופלים עם רקע רפואי או תרופות העלולים להגביר את הסיכון לפגיעות.

נצפתה עלייה במשקל בחולים שנטלו **אולזפין ODT טבע** יש לעקוב אחר המשקל באופן קבוע.

יש לעקוב אחר רמות סוכר ושומונים בדם כיוון ש**אולזפין ODT טבע** עלולה לגרום לעליית מדדים אלו.

במטופלים בעלי היסטוריה רפואית של רמות נמוכות של תאי דם לבנים, יש לבצע ספירות דם באופן קבוע בחודשים הראשונים לטיפול לצורך מעקב. **אולזפין ODT טבע** עלולה לגרום לירידה ברמות תאי דם לבנים. יש לעקוב הפסקת טיפול באולזפין ODT טבע במציאת התסמיין הראשון למצב זה. עם מטופלים הסובלים מירידה ברמות תאי דם לבנים להיות תחת מעקב אחר תופעת חום או תסמינים אחרים המעידים על זיהום. אם ישנם תסמינים כאלו יש להפסיק את הטיפול באולזפין ODT טבע באופן מיידי.

לא מומלץ לישול **אולזפין ODT טבע** בחולים מבוגרים הסובלים מדימנציה עקב היתכנות תופעות לוואי מחורות: נפילות, שינוניות, בעיות הקיפית, הליכה משונה, בריחת שתן, צוקת עלייה במשקל, חולשה, חום, דלקת ריאות, עייבה בפה, הדיות וזלזוליות, שבץ ומוות.

חולים סכיזופרניים ובפילוריים הינם בסיכון גבוה לביצוע טיפונות האבדאות. לכן, בזמן הטיפול באולזפין ODT טבע יש לבצע מעקב צמוד אחר חולים אלו.

יש להזהר במטופלים שסבלו בעבר אל הסובלים מעמצירת שתן. הגדלה של בלוטת הערמונית. עצירות או היסטוריה של חסימת מעיים.
יתוש שימושו **באולזפין ODT טבע** במטופלים אלה עלול לגרום לתופעות כגון עצירות, יבש בפה ודופק מהיר (טקיכרדיה). מניסיון שהצטבר לאחר שיווק התרופה נמצא כי הסיכון לתופעות לוואי מחורות (כולל נמצי תמותה) עלול בעת שילוב של אולזפין עם תרופות אנטי כוליגנריות.

לפני הטיפול באולזפין ODT טבע ספר לרופא אם:

- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב.
- אתה סובל או סבלת בעבר משבץ או "מיני שבץ" (תסמינים זמניים יש שבץ).
- אתה סובל מבעיות בכבד, ממערכת הטיפול (כגון חסימה בעיניים).
- אתה סובל/מאלצהימ"ר, מטרסן שד.
- אתה חווה מחשבות אובדניות או פגיעה בעצמך. במקרה כזה עליך לפנות מיידית לרופא או לאחד מיון.
- אתה סובל או סבלת בעבר מבלוטת ערמונית מוגדלת.
- אתה סובל או סבלת בעבר מפרסדיום, סוכרת או רמות סוכר גבוהות, יש לחץ דם גבוה או נמוך, רמות גבוהות של כולסטרוול או טריגליצרידים או חולה מרבה בפעילות גופנית או שווה במקומות חמים לעיתים תכופות.
- יש לך היסטוריה של שימוש לרעה בתרופות. אתה סובל מנופלוקסטורניה
- מזיקה (Phenylketonuria) - **אולזפין ODT טבע** מכילה פנילאלנין (אספרטיים).
- מילה גריש ליקוּזט - **אולזפין ODT טבע** מכילה הרקטין ועלולה לגרום לרגישות אצל אנשים הרגישים ליקוּזט.
- אתה סובל מנל בעיה רפואית אחרת.

עישון:

אם אתה מעשן - יש לדווח על כך לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

ילדים ומתבגרים:

אולזפין ODT טבע מיועדת למבוגרים מעל גיל 18 שנים.

בדיקות ומעקב:

יש לעקוב בתחילת הטיפול ובמשך הטיפול אחר רמות הסוכר בדם, במיוחד אם אתה סובל מסוכרת או מרמות סוכר גבוהות (mg/dL 100-126 ביום). יש לעקוב אחר רמות השומנים (כולסטרוול וטריגליצרידים) בדם, במיוחד בחולים הסובלים מהפרעות ברמות שומני הדם או מגורמי סיכון

לפתח הפרעות אלה. יש לבצע בדיקות דם לרמות שומנים בדם בתחילת הטיפול ובמהלכו גם אם אינך סובל מתסמינים כלשהם.

עלייה במשקל יכולה הינה תופעת לוואי נפוצה בטיפול באולזפין ODT טבע. יש לקחת זאת בחשבון טרם תחילת הטיפול ולבצע בדיקות מעקב שגרתיות אחר המשקל.

במטופלים בעלי היסטוריה של רמות נמוכות של תאי דם לבנים, יש לעקוב אחר רמות תאי דם לבנים בחודשים הראשונים לטיפול. יש לשקול הפסקת הטיפול באולזפין ODT טבע בהופעת התסמיין הראשון המשמעותי המצביע על ירידה בתאי דם לבנים.

תגובות בין-תרופתיות:

אם אתה לוקח או את לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות לא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- דיאזפם: מתן בו זמני של **אולזפין ODT טבע** ודיאזפם עלול לגרום לתת לחץ דם במעבר משכיבה לישיבה (תת לחץ דם אורטוסטטי).
- תרופות מנומליות לאפילפסיה - יש לקבצפמן, פלוקסמין, אומפרזול ורימפמפיץ - עלולות להפסיע על רמות אולזפין בדם.
- תרופות המכילות פחם פעיל - עלולות להפחית את הספיגה של אולזפין.
- תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית כולל תרופות להרגעה, תרופות לדיכאון ותרופות לשינה, תרופות לאפילפסיה - יש להיזהר במתן בו זמני של תרופות אלה ואולזפין.
- תרופות הורדרת לחץ הדם - אולזפין עלול להגביר את אפקט הורדרת לחץ הדם במתן משולב עם תרופות אלה.
- תרופות הממוקות פעילות דומימן (כגון התרופה לטיפול בפרקינסון - דוהופה) - אולזפין עלול לעכב פעילות תרופות אלו.
- תרופות אנטיכולרגיות - שילובן יחד עם **אולזפין ODT טבע** עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי מחורות במערכת היכול הנובעות מירידה בתנועתיות מערכת העיכול.

שימוש בתרופה ומזון:

ניתן לקחת **אולזפין ODT טבע** עם או בלי אוכל.

שימוש בתרופה וגריכת אלכוהול:

המעט מעריכת אלכוהול בזמן שימוש **אולזפין ODT טבע** שתיית אלכוהול בזמן נטילת **אולזפין ODT טבע** עלולה לגרום לך להיות יותר ישוני בהשוואה לנטילת **אולזפין ODT טבע** ללא אלכוהול.

היריון, הנקה ופוריות:

היריון
ההייעצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה.

עם הרופא אם את בהיריון או מתכננת בעובר. ילודים עלולים לפתח תסמונת מגילה אם האם נטלה את התרופה במיטריסטם האחרון (שלושת החודשים האחרונים) של ההיריון. תסמונת המגילה כלולת את התסמינים הבאים: חוסר שקט, רעד, קישיון/חולשה שרירים, שינויות, עצבנות, בעיות נשימה ובעיות בהאכלה. אם הילד נשלב מפתח אחד או יותר מהתסמינים הללו, צרי קשר עם הרופא.

הנקה

התרופה עוברת לחלב אם. שוחחי עם הרופא לגבי הדרך הטובה ביותר להאכל את התינוק אם את נוטלת **אולזפין ODT טבע**.

פוריות

טיפול באולזפין ODT טבע עלול לגרום לעלייה ברמת פרולקטין בדם, שיכולה להוביל לפגיעה הפיכה בפוריות בשניים בגיל הפריון.

הגיה ושימוש במכונות:

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לשינויות ולהשפיע על יכולת קבלת החלטות, חשיבה חדה או תגובה מהירה ועל כן מחייב זהירות בהגיהה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות. המעט מעל פעילות ששזו עד שבחכן כיצד **אולזפין ODT טבע** משפיעה עליך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
אולזפין ODT טבע מכילה לקוּזט וסוכרוז.
אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבולות (רגישות) לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה. סוכרוז עלול להיות מזיק לשיניים.

אולזפין ODT טבע 5 מ"ג מכילה 2.25 מ"ג אספרטיים סבבליה.

אולזפין ODT טבע 10 מ"ג מכילה 4.5 מ"ג אספרטיים סבבליה.

אספרטיים היו מקור לפיילאלנין. אספרטיים עלול להזיק לך אם אתה סובל מפנילקטורניה (PKU), הפרעה גנטית נדירה בה מופיעה הצטברות של פיילאלנין מפני שהגוף אינו יכול לפנות אותו באופן תקין.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד במתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. ייתכן שהרופא יצטרך לשנות את המינון על למציאת המינון המתאיין לך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין להוציא את הטבליה בידיים יבשות ובהירות (כדי למנוע נזק שבירתה) ולהניחה בפה מייד. הטבליה נמסה ברוק במהירות, לכן ניתן לבלוע אותה בקלות עם או בלי משקה. אין מידע על התרופה כשהיא מרוסקת, חצויה או כתוששה. אין לרסק, לחצות או ללעות את הטבליה!

לא קיים מידע על התרופה בשימוש בזוגדה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עלול לחוש רעם, חלונות הפרעה דיבור, ארגטיביזם, חוסר שקט, קצב לב מהיר וירידה ברמת הכיורה. אם נטלת מנת יותר או אם בטעות ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לאחד מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לישול את התרופה הזו בזמן ההיעד, קח את התרופה כשתיזכר. אם זה בסמוך למועד נטילת המנה הבאה, דלג על המנה וקח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין לישול מנה פכולה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

כדי למנוע תופעות לוואי מחורות אין להפסיק נטילת אולזפין ODT טבע בפתאומיות, אם עליך להפסיק לישול אולזפין ODT טבע, הרופא ינהא אותך כיצד יש לדוק התווית.

אין לישול תרופות בוחשן! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה גוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

נכון כעת, התרופה, השימוש באולזפין ODT טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. שלא תיבהל ומקרה רשמת תופעות הלוואי. ייתכן שילא תסבול מואת מנתן.

אולזפין ODT טבע עלולה לגרום לתופעות לוואי מחורות:

- עלייה בסיכון למוות במטופלים קשישים הסובלים מבלבול, אובדן זיכרון ואובדן קשר עם המציאות (פסיכוזה הקשורה בדימנציה). **אולזפין ODT טבע** אינה מיועדת לשימוש במטופלים קשישים הסובלים מדימנציה.
- עלייה ברמות הסוכר בדם (היפרגליקמיה)** עלולה להתרחש במטופלים הסובלים מסוכרת ובמטופלים שאינם סובלים מסוכרת. עלייה ברמת הסוכר בדם עלולה לגרום ל:
 - 8 • טוקסאידיזם: עלייה ברמות חומצה בדם בעקבות הצטברות קטונים • תדרמת (קומה) מוות
- הרופא לבצע בדיקות דם לרמות סוכר בדם לפני תחילת הטיפול **שימוש באולזפין ODT טבע** ובמהלכו. במטופלים שאינם סובלים מסוכרת, עלולה להתרחש עלייה ברמות הסוכר בדם בעת הפסקת הטיפול **באולזפין ODT טבע**. מטופלים הסובלים מסוכרת וחלק מהמטופלים שלא סבלו מסוכרת בעת תחילת הטיפול **שימוש באולזפין ODT טבע** עלולים להיות רמות סוכר בדם בעת הפסקת הטיפול **אולזפין ODT טבע** אם אתה סובל מסוכרת.
 - איתך באיזו תדירות נלבע בדיקות דם לרמות סוכר בזמן נטילת **אולזפין ODT טבע**.
 - יש לפנות לרופא** אם אתה סובל מאחד מתסמיני רמת סוכר גבוהה בדם:
 - צימאון מוגבר
 - עלייה בתחושת מתן שתן
 - הרגשת רעב מוגברת
 - חולשה ועייפות
 - בחילה
 - בלבול או ריח פירות מהפה

- עלייה ברמות שומנים (כולסטרוול וטריגליצרידים) בדם עלולה להתרחש במטופלים **אולזפין ODT טבע**. על הרופא לבצע בדיקות דם לרמות כולסטרוול ושומנים בדם בתחילת הטיפול ובמהלכו גם אם אינך סובל מתסמינים כלשהם.
- עלייה במשקל נפוצה מאוד במטופלים **אולזפין ODT טבע**. על הרופא שנה עלייה קיצונית במשקל, לכן על הרופא לשקול אותך במהלך הטיפול **אולזפין ODT טבע**. יש להתייעץ עם הרופא בנוגע לרזכים לשמירה על המשקל כגון תזונה בריאה ופעילות גופנית.
- שינויות מוגברת של שבץ או "מיני-שבץ" איורוע איסכמי חוליף (TIA) קרבב קשישים** הסובלים מפסיכוזה הקשורה בדימנציה (קשישים הסובלים מאובדן קשר עם המציאות בעקבות בלבול ואובדן זיכרון). **אולזפין ODT טבע** אינה מאושרת עבור מטופלים אלה.

- תסמונת נוירולפטית ממאירה (Neuroleptic Malignant Syndrome)**
 - מזכז דירך אך תמור מאוד אשר עלול להתרחש במטופלים הסובלים תרופות אנטי-פסיכוטיות, כולל **אולזפין ODT טבע**. תסמונת נוירולפטית ממאירה עלולה לגרום למוות ומחייבת אשפוז. יש לפנות מיד לרופא אם אתה סובל מ:
 - חום גבוה
 - הזעה מוגברת
 - נוקשות שרירים
 - בלבול
 - שינויים בנשימה, בדופק ובלחץ הדם
- תופעת לואי הכוללת אאזינופיליה ותסמינים סיסטמיים (Drug - Dress Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)**. תופעה זו עלולה לכלול: פריחה, חום, בלוטות נפחות ומעורבות על איברים פנימיים נוספים כגון כבד, כליות, ריאות ולב. תופעה זו עלולה לגרום לפעמים למוות, לכן יש לספר לרופא מיד אם אתה סובל מאחד מהסימנים הללו.
- Tardive dyskinesia** - מצב הגורם לתנועות או רצונות, בעיקר על הפנים או הלינגו. התופעה עלולה להמשיך גם אחרי הפסקת הטיפול **באולזפין ODT טבע** עלולה גם להתחיל אחרי הפסקת הטיפול **באולזפין ODT טבע**. יש לספר לרופא אם יש לך תנועות גוף לא שגולטות.
- ירידה בלחץ הדם בעת שינוי תנוחה** הכוללת תסמינים כגון סחרחורת, דופק מהיר או איטי או עליופון. התופעה מתרחשת בעיקר בתחילת נטילת התרופה.
- קושי בליעיה** העלול לגרום למזון או לשתייה להגיע לריאות.
- פרוכוסים** - ספר לרופא אם אתה חווה פרקוס במהלך הטיפול **באולזפין ODT טבע**.
- בעיות בוויסות חום הגוף** - אתה עלול לסבול מעלייה בחום הגוף, לדוגמה כשאתה מתעמל או נמצא באיזור חם. חשוב לשתות מים על מנת למנוע התייבשות. יש לפנות מיד לרופא אם אתה הנייה חולה מאוד וסובל מתסמינים של התייבשות:
 - הזעת יתר או חוסר הזעה
 - יובש בפה
 - מרגיש חם מאוד
 - צימאון מוגבר
 - אצירת שתן

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות מאוד: חולשה (חוסר אנרגיה), יובש בפה, עצירות, הפרעות עיכול, שינויות, סחרחורת, פגיעות מקריות, נדודי שינה, פרקינסוניזם.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות:
חום, רעד, תאי בג, כאב חזה, כאבים בגפיים, כאבים במפרקים, עלייה בקצב הלב, יתר לחץ דם, הקאה, אי שקט גופני, תיאבון מוגבר, שינויי התנהגות, עלייה ברמות טריגליצרידים בדם, עלייה במשקל, תת לחץ דם במעבר משכיבה לישיבה, דימום תת עורי המתבטא בכתמים בעור, בצקת הקיפית, הליכה לא גורלה, נוקשות שרירים, ליקויי הגייה (דיבור), חלדת, שיעול, עין עצלה, דלקת הלוע, נמנום, בריחת שתן, זיהום בדרכי השתן, עלייה ברמות פרולקטין, עלייה ברמות של אלקאלין פוספאטאז, הפרשת חלב מהשד, גדילה של השד בגברים, פגיעה בזיכרון, נמלול, מצב רוח מורמם (אופוריה), קוצר נשימה, עור יבש, אקנה, פגיעה בראייה, כאבי מחזור ודלקת בנרתיק בשניים, צואה קשה או מתן צואה לעיתים רחוקות.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות:
צמרמורת, בצקת בפנים, גרישות לאור, ניסיון התאבדות, שבץ, התרחבות כל ידם, בחילה, הקאה, בצקת בלושן, ירידה ברמות תאי דם לבנים, ירידה ברמות טסיות הדם, רמות גבוהות של בילירובין בדם, רמות נמוכות של חלבונים בדם, בעיות קואורדינציה, הפרעה דיבור, ירידה בחשק המיני, קהות חושית, דימום מהאף, נשירת שיער, יובש בעיניים, שינויים במיקוד הראייה (אקומודציה), אי אונות, שינויים במחזור החודשי (כגון לא וסת, ירידה/עלייה בדימום הווינוי, דימום ויסתי כבד), אצירת שתן, תכיפות ודחופות במתן שתן, פנרי שתן גדול, כאב בשד, דיסטוניה (התכווצות שרירי הצוואר, קשוי בליעיה, קשוי נשימה, הוצאה של הלושן), פגיעות בבטן ומוות על רקע סוכרת.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות:
אפסות הגנבאזר, חסימת מעיים, כבד שומני, אסטוארופוזיס, תדרמת, בצקת בריאות, התרחבות אישונים, מוות פתאומי.

תופעות לוואי בשכיחות שאינה ידועה:
התגובה אלרגית [כגון תגובה אנפילקטית, התפתחות הפנים או הגרון (אקדומטה), גירוד פריחה], תדרמת הקשורה לסוכרת, טוקסאידיזם, סוכרת, תופעות לוואי שעלולות להופיע בעת הפסקת טיפול (בחילה, הקאה אחרה), אהבת, דלקת בלבליב וכבד, פגיעה בכבד, הפרשת רוק מוגברת, תסמונת הרגליים העצבניות (Restless legs syndrome), נוטיטורפיה (ירידה בסוג מוסים של תאי דם לבנים), זקפה כואבת וממושית (פריאפיזם), פגיעה בשרירים הגורמת לכאבים (ברדומיטיוסי), פקקת ורידים, גמגום.

אם הופיעה תופעת לוואי אם אתה מתופעות הלוואי המתמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דייווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית המפרט משרד הבריאות (www.health.gov.il) והמנה לטופס המקוּן לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

לשמור הערלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש למנוע במקום גורו מחוץ לתישג ידע וטווח ראייהם של ילדים ו/או תינוקות ודי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך הפגוזה או **exp. date)** המופיע על גבי האריזתך. התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- יש לאחסן במקום יבש, מנותל ל-C-25%, לשמור באריזה המקורית על מנת להגן מאור.

6. מידע נוסף:

נוסף על המרכיב הפעיל, טבליות אולזפין ODT טבע מכילות גם: