

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986
يُسَوَّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: أنظر الفقرة 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إيتوريكوكسيب تارو	إيتوريكوكسيب تارو	إيتوريكوكسيب تارو	إيتوريكوكسيب تارو
30 ملغ	90 ملغ	60 ملغ	120 ملغ
أقراص مطليّة	أقراص مطليّة	أقراص مطليّة	أقراص مطليّة
يحتوي كل قرص على:			
etoricoxib 30 mg	etoricoxib 90 mg	etoricoxib 60 mg	etoricoxib 120 mg
إيتوريكوكسيب 30 ملغ	إيتوريكوكسيب 90 ملغ	إيتوريكوكسيب 60 ملغ	إيتوريكوكسيب 120 ملغ

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن إيتوريكوكسيب تارو. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
- هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.
- هذا الدواء ليس معدّاً للأطفال وللمراهقين دون سن 16 سنة.

1. ما هو إيتوريكوكسيب تارو ولماذا يُستعمل؟

1.1 ما هو إيتوريكوكسيب تارو؟

المجموعة العلاجية: إنه دواء من مجموعة الأدوية التي تُدعى مثبطات COX-2 الانتقائية. تنتمي هذه إلى مجموعة الأدوية التي تُدعى مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (NSAIDs).

1.2 لم يُستعمل هذا الدواء؟

إيتوريكوكسيب تارو 30 ملغ يُساعد في تخفيف الألم والانتفاخ (التهاب) في المفاصل والعضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من فُصال عظمي (Osteoarthritis).

إيتوريكوكسيب تارو 60 ملغ يُساعد في تخفيف الألم والانتفاخ (التهاب) في المفاصل والعضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من فُصال عظمي (Osteoarthritis)، التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الحرشفية (ankylosing spondylitis).

إيتوريكوكسيب تارو 90 ملغ يُساعد في تخفيف الألم والانتفاخ (التهاب) في المفاصل والعضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الحرشفية (ankylosing spondylitis).

إيتوريكوكسيب تارو 90 ملغ يُستعمل أيضاً لعلاج قصير المدى بالألم متوسط بعد عملية جراحية في الأسنان.

إيتوريكوكسيب تارو 120 ملغ يُساعد في تخفيف الألم والانتفاخ (التهاب) في المفاصل والعضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من النقرس (Gout).

ما هو الفُصال العظمي (Osteoarthritis)؟

الفُصال العظمي هو مرض مفاصل. يحدث هذا المرض نتيجة تحلّل تدريجي للغضروف الذي يبطن أطراف العظام. يؤدي هذا الأمر إلى انتفاخ (التهاب)، ألم، حساسية، تصلّب وإعاقة.

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي طويل الأمد في المفاصل. يؤدي هذا المرض إلى ألم، تصلب، انتفاخ وفقدان متزايد لحركة المفاصل الذي يؤثر عليها. ممكن أن يؤدي أيضاً إلى التهابات في مناطق أخرى من الجسم.

ما هو مرض النقرس (Gout)؟

مرض النقرس هو مرض نوبات فجائية ومتكررة لالتهاب مؤلم جداً واحمرار المفاصل. يحدث هذا المرض نتيجة لترسب بلورات معدنية في المفاصل.

ما هو التهاب المفاصل الحرشفية (ankylosing spondylitis)؟

التهاب المفاصل الحرشفية هو مرض التهابي في العمود الفقري والمفاصل الكبيرة.

2. قبل استعمال الدواء

2.1. يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية لإيتوريكوكسيب أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها هذا الدواء (أنظر الفقرة 6).
- أنت حساس لأدوية مضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) بما في ذلك الأسبيرين ومثبطات COX-2 (أنظر "الأعراض الجانبية"، الفقرة 4).
- كنت تعاني من تقرح فعال في المعدة أو نزيف في المعدة أو في الأمعاء.
- كنت تعاني من مرض كبد خطير.
- كنت تعاني من مرض كلي خطير.
- أنت حامل أو ممكن أن تكوني حامل أو إذا أنت مرضعة (أنظري "الحمل، الإرضاع والخصوبة"، فقرة 2).
- كنت دون سن 16 عاماً.
- كنت تعاني من مرض أمعاء التهابي، مثل مرض كروهن، التهاب تقرحي في الأمعاء الغليظة أو التهاب الأمعاء الغليظة.
- كنت تعاني من ضغط دم مرتفع غير قابل للسيطرة بواسطة علاج (افحص مع الطبيب أو مع الممرضة إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كان ضغط الدم مسيطر عليه بصورة جيدة).
- كنت تعاني من مشاكل في القلب وهذا يشمل قصور في القلب (متوسط أو شديد)، ذبحة صدرية (ألم في الصدر).
- كنت تعاني من مرض نقص تروية القلب، أصبت بنوبة قلبية أو جراحة مجازة أو مرض أو عية دموية محيطي (ضعف تدفق الدم في الساقين أو القدمين بسبب تضيق أو انسداد أو عية الدم).
- عانيت من أي نوع من السكتة الدماغية (بما في ذلك نوبة دماغية صغيرة، نوبة إقفارية (TIA)).
- إيتوريكوكسيب ممكن أن يزيد قليل من خطر حدوث نوبة قلبية وسكتة دماغية ولذلك يُمنع تناوله من قبل المرضى الذين كان لديهم في الماضي مشاكل في القلب أو سكتة دماغية.

إذا كنت تعتقد أن أحد هذه ينطبق عليك، لا تتناول الأقراص حتى استشارة طبيبك.

2.2 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بـ إيتوريكوكسيب تارو، أعلم الطبيب إذا:

- كان لديك ماض من نزف في المعدة أو تقرحات.
- أصبت بجفاف، مثلاً في أعقاب نوبة طويلة من النقيؤ أو إسهال.
- كان لديك انتفاخ نتيجة احتباس سوائل.
- كان لديك ماض من قصور في القلب أو أي مرض قلب آخر.
- كان لديك ماض من ضغط دم مرتفع. يمكن أن يرفع إيتوريكوكسيب تارو ضغط الدم لدى أشخاص معينين، خاصة في الجرعات المرتفعة، وسيقوم الطبيب بفحص ضغط الدم بين حين وآخر.
- كان لديك ماض من مرض في الكبد أو في الكلى.
- أنت تحصل على علاج للعدوى. إيتوريكوكسيب تارو يمكن أن يحجب أو يخفي حالة سخونة التي هي إشارة لوجود عدوى.
- كنت تعاني من السكري، كولسترول مرتفع أو إذا أنت مدخن. قد تزيد هذه العوامل من ارتفاع الاحتمال لديك للإصابة بمرض قلب.

- أنت امرأة تحاول الحمل.
- أنت فوق سن 65 عامًا.

إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كان أحد البنود ينطبق عليك، تحدث مع طبيبك قبل تناول إيتوريكوكسيب تارو من أجل أن تعرف إذا كان هذا المستحضر ملائمًا لك.

يعمل إيتوريكوكسيب تارو جيدًا وبصورة متساوية لدى المرضى المراهقين الشباب ولدى المرضى الأكبر سنًا. إذا أنت فوق 65 عامًا، سيقوم الطبيب بمراقبتك كما ينبغي. لا حاجة لملائمة الجرعة للمرضى الذين هم فوق سن 65 عامًا.

2.3 ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

بشكل خاص، إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية، سيقوم الطبيب بمراقبة حالتك من أجل أن يتأكد من أن هذه الأدوية تعمل كما ينبغي، بعد بدء العلاج بإيتوريكوكسيب تارو:

- أدوية مميعة للدم (مضادات التخثر) مثل وارفارين
- ريفامبيسين (مضاد حيوي)
- ميتوتريكسات (دواء يُستعمل لتنشيط جهاز المناعة ويُستعمل في أحيان متقاربة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي)
- سيكلوسبورين أو تاكروليموس (أدوية لتنشيط جهاز المناعة)
- ليثيوم (دواء لعلاج أنواع مختلفة من الاكتئاب)
- مستحضرات معدة لعلاج ضغط الدم المرتفع وقصور في القلب، التي تُدعى مثبطات ACE وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، مثل إنالابريل، رامبيريل، لوسارتان و- فالسارتان.
- مدرّات البول
- ديجوكسين (أدوية لقصور القلب وعدم انتظام دقات القلب)
- مينوكسيديل (دواء لعلاج فرط ضغط الدم)
- سالبوتامول أقراص أو محلول يُعطى عن طريق الفم (دواء للربو)
- حبوب منع الحمل (هذا المزيج ممكن أن يزيد الاحتمال لظهور أعراض جانبية)
- علاج هورموني بديل (هذا المزيج ممكن أن يزيد الاحتمال لظهور أعراض جانبية)
- أسبيرين، الاحتمال لحدوث تقرحات في المعدة يكون أكبر إذا كنت تتناول إيتوريكوكسيب تارو مع أسبيرين.
- أسبيرين لمنع نوبات قلبية أو سكتة دماغية:
- يمكن تناول إيتوريكوكسيب تارو مع جرعات منخفضة من أسبيرين. إذا أنت تتناول حاليًا جرعة منخفضة من أسبيرين لمنع حصول نوبات قلبية أو سكتة دماغية، يُمنع التوقف عن تناول أسبيرين بدون استشارة الطبيب.
- أسبيرين وأدوية أخرى مضادة للالتهابات غير الستيرويدية أخرى (NSAIDs):
- يُمنع تناول أسبيرين بجرعات مرتفعة أو أدوية مضادة للالتهابات أخرى أثناء تناول إيتوريكوكسيب تارو.

2.4 استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول أقراص إيتوريكوكسيب تارو مع أو بدون الطعام. بدء تأثير إيتوريكوكسيب تارو ممكن أن يكون أكثر سرعة عند تناوله بدون طعام.

2.5 الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

يُمنع استعمال أقراص إيتوريكوكسيب تارو خلال الحمل. إذا أنت حامل، أو تعتقد أنك قد تكونين حامل، أو إذا أنت تخططين لتحمل، يُمنع تناول الأقراص. إذا حملت، توقفي عن تناول الأقراص واستشيري طبيبك. استشيري طبيبك إذا لم تكوني متأكدة أو إذا كنت تحتاجين لنصيحة إضافية.

الإرضاع

ليس معروفًا فيما إذا كان إيتوريكوكسيب تارو يُفرز في حليب الأم. إذا أنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، استشيري طبيبك قبل تناول الدواء. إذا كنت تتناولين إيتوريكوكسيب تارو، يُمنع الإرضاع.

الخصوبة

إيتوريكوكسيب تارو غير موصى به للنساء اللواتي يحاولن الحمل.

2.6 السياقة واستعمال الماكينات

تم التبليغ عن دوار ونعاس لدى قسم من المرضى الذين تناولوا إيتوريكوكسيب تارو. لا تقم بالسياقة إذا كنت تشعر بدوار أو بنعاس. لا تستخدم أي أدوات أو ماكينات إذا كنت تشعر بدوار أو بنعاس.

2.7 معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي إيتوريكوكسيب تارو على لاكتوز. إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم قدرة تحمل لأي نوع من السكريات، اتصل مع الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

2.8 الأطفال والمراهقين

يُمنع إعطاء هذا الدواء للأطفال وللمراهقين دون سن 16 عامًا.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال إيتوريكوكسيب تارو دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

يُمنع تناول جرعة أكبر من الجرعة الموصى بها لحالتك. سيقوم الطبيب بمناقشة علاجك من حين إلى آخر. من الضروري استعمال الجرعة الأصغر التي تسيطر على ألمك ولا تتناول إيتوريكوكسيب تارو لفترة أطول من المطلوب. ذلك لأن احتمال حدوث نوبات قلبية وحالات دماغية ممكن أن يزداد بعد علاج مستمر، خاصة في الجرعات المرتفعة.

هناك جرعات مختلفة لهذا المستحضر وسيُسجل لك طبيبك الجرعة الملائمة لك وفقًا لمرضك.

الجرعة الموصى بها عادة هي:

الفصال العظمي

الجرعة الموصى بها هي 30 ملغ مرّة في اليوم، يمكن زيادة الجرعة حتى الحد الأقصى 60 ملغ مرّة في اليوم، بحسب الحاجة.

التهاب المفاصل الروماتويدي

الجرعة الموصى بها هي 60 ملغ مرّة في اليوم، مع زيادة قصوى حتى 90 ملغ مرّة في اليوم، بحسب الحاجة.

التهاب المفاصل الحرشقية

الجرعة الموصى بها هي 60 ملغ مرّة في اليوم، مع زيادة قصوى حتى 90 ملغ مرّة في اليوم، بحسب الحاجة.

لحالات نقرس مفصلي حاد ولألم بعد عملية جراحية في الأسنان، يجب استعمال إيتوريكوكسيب فقط لفترة الألم الأعراض.

النقرس (gout)

الجرعة الموصى بها هي 120 ملغ مرّة في اليوم، الذي يجب استعماله فقط في المرحلة الحادة من الألم، ويقتصر على 8 أيام علاج كحد أقصى.

ألم بعد عملية جراحية في الأسنان

الجرعة الموصى بها هي 90 ملغ مرّة في اليوم، ويقتصر على 3 أيام علاج كحد أقصى.

المتعاجون مع مشاكل في الكبد

- إذا كنت تعاني من مرض كبد خفيف، يُمنع تناول أكثر من 60 ملغ مرّة في اليوم.
- إذا كنت تعاني من مرض كبد معتدل، يُمنع تناول أكثر من 30 ملغ مرّة في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

الاستعمال للأطفال والمراهقين

يُمنع إعطاء إيتوريكوكسيب تارو للأطفال وللمراهقين دون سن 16 عامًا.

المسنون

لا حاجة لملاءمة الجرعة للمتعالجين المسنين، كما هو الأمر مع أدوية أخرى. يجب توخي الحذر مع المتعالجين المسنين.

طريقة إعطاء الدواء

إيتوريكوسيب تارو معدّ للإعطاء عن طريق الفم. يجب تناول الأقراص مرّة في اليوم. يُمكن تناول إيتوريكوسيب تارو مع أو بدون طعام. يجب بلع الدواء مع كمية صغيرة من الماء. لا توجد معلومات بالنسبة لسحق/ لشطر/ لمضغ الأقراص.

إذا تناول جرعة أعلى من إيتوريكوسيب تارو مما يجب عليك

لا تتناول أبداً أقراص أكثر مما أوصاك الطبيب. إذا تناولت أقراص إيتوريكوسيب تارو أكثر مما يجب، يجب عليك التوجه للحصول على علاج طبيّ فوري. إذا تناول جرعة أعلى أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجّه، فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبه الدواء معك.

إذا نسيت تناول إيتوريكوسيب تارو

من المهم تناول إيتوريكوسيب تارو كما وصف لك الطبيب. إذا نسيت تناول جرعة، يجب تناول القرص التالي في وقته المعتاد، في اليوم التالي. يُمنع تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة التي نسيتها. يجب عليك إكمال العلاج بأكمله بحسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحيّة، يُمنع التوقّف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب. يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائيّة في كلّ مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانيّة

كجميع الأدوية، قد يسبّب استعمال إيتوريكوسيب تارو أعراضاً جانيّة لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانيّة. من المحتمل ألا تعاني من أيّ منها.

إذا كان يتطوّر لديك أحد الأعراض التالية، يجب عليك إيقاف العلاج بـ إيتوريكوسيب تارو والتوجه فوراً إلى الطبيب (أنظر "قبل استعمال الدواء" الفقرة 2):

- ضيق تنفس، آلام في الصدر وانتفاخ الكاحلين الذي يظهر أو يتفاقم
- اصفرار الجلد والعينين (يرقان) – هذه أعراض لمشاكل في الكبد
- ألم حاد في البطن أو متواصل أو براز أسود اللون
- رد فعل تحسّسي الذي يمكن أن يشمل ردود فعل جلدية مثل تقرحات أو بثور، أو انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في التنفس.

أعراض جانيّة التي يمكن أن تحدث خلال العلاج بـ إيتوريكوسيب تارو:

شائعة جدًا (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من 10

- ألم بطن

شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

- سيّخ جاف (التهاب وآلم بعد اقتلاع سن)
- انتفاخ الرجلين و/أو كفوف القدمين نتيجة احتباس سوائل (وذمة)
- دوام، صداع
- خفقان (ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة)، عدم انتظام ضربات القلب (arrhythmia)
- ارتفاع ضغط الدم
- صفير أو ضيق تنفس (تشنج قصبيّ)
- إمساك، غازات (فائض غازات)، التهاب المعدة (التهاب بطانة المعدة)، حرقة، إسهال، سوء هضم (Dyspasia) عدم راحة في البطن، غثيان، تقيؤ، التهاب المريء، تقرحات في الفم
- تغييرات في فحوصات الدم تتعلق في الكبد
- كدمات
- ضعف وإرهاق، مرض شبيه بالإنفلونزا

غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

- التهاب المعدة والأمعاء (التهاب جهاز الهضم الذي يدمج المعدة والأمعاء الدقيقة أيضًا / أنفلونزا البطن)، التهاب مجاري التنفس العليا، التهاب مجاري البول
- تغيرات في قيم الفحوصات في المختبر (انخفاض عدد كريات الدم الحمراء، انخفاض عدد كريات الدم البيضاء، انخفاض في الصفائح)
- فرط حساسية (رد فعل تحسسي الذي يشمل شرى التي ممكن أن تكون حادة بصورة تحتاج إلى علاج طبيّ فوريّ)
- ارتفاع أو انخفاض في الشهية، زيادة في الوزن
- قلق، اكتئاب، انخفاض في الحدة العقلية: الرؤية، الشعور أو سماع أمور غير موجودة (هذيان)
- تغيرات في الذوق، عدم المقدرة على النوم، انعدام الإحساس أو وخز، نعاس
- تشوش الرؤية، تهيج في العين واحمرار
- صفير في الأذنين، فيرتجو (Vertigo – شعور بدوار أثناء الوقوف في المكان)
- عدم انتظام دقات القلب (رجفان أذيني)، نبض قلب سريع، قصور في القلب، شعور بضيق، ضغط أو شعور بالثقل في الصدر (ذبحة صدرية Angina pectoris)، نوبة قلب
- احمرار، سكتة دماغية، سكتة دماغية صغيرة (نوبة إقفارية عابرة)، ارتفاع خطير في ضغط الدم، التهاب الأوعية الدموية.
- سُعال، ضيق تنفس، نزيف من الأنف
- انتفاخ في المعدة أو في الأمعاء، تغييرات في نمط التغوط، جفاف في الفم، قرحة معوية، التهاب بطانة المعدة الذي يمكن أن يكون خطيرًا وأن يؤدي إلى نزيف، متلازمة الأمعاء العصبية، التهاب البنكرياس
- انتفاخ الوجه، طفح جلدي أو حكة في الجلد، احمرار الجلد
- تقلص/ تشنج العضلات، ألم/ تصلب العضلات
- مستويات مرتفعة من البوتاسيوم في الدم، تغييرات في فحوصات الدم أو البول التي لها علاقة بالكلى، مشاكل خطيرة في الكلى
- ألم في الصدر

نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10,000

- وذمة وعائية (Angioedema) – رد فعل تحسسي مصحوب بانتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحنجرة وقد تؤدي إلى صعوبة في التنفس أو في البلع، التي قد تكون خطيرة والتي قد تحتاج إلى علاج طبيّ فوريّ// ردود فعل تآقي التي تشمل صدمة (رد فعل تحسسي خطير الذي قد يحتاج إلى علاج طبيّ فوريّ).
- ارتباك، تملل
- مشاكل في الكبد (التهاب كبد)
- مستويات منخفضة من البوتاسيوم في الدم
- قصور في الكبد، اصفرار الجلد و/أو العينين (يرقان)
- ردود فعل جلدية خطيرة

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّل إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب النقيوّ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنع تناول إيتوربيكوكسيب تارو بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب الخزن في درجة حرارة تحت الـ 25°C.

يجب الخزن في العبوة الأصلية للحفاظ عليه من الرطوبة.

يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من الدواء. إنّ ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:
اللب:

Calcium hydrogen phosphate, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, croscarmellose sodium.

طلاء القرص:

Hypromellose, titanium dioxide, triacetin, lactose monohydrate.

كيف يبدو إيتوريكوسيب تارو ومحتويات العبوة

إيتوريكوسيب تارو أقراص تتوفر بأربعة عيارات:

- إيتوريكوسيب تارو 30 ملغ أقراص ذات لون أبيض، مستديرة، محدبة من الجهتين، مطلية ومع علامة "E90X" من جهة واحدة و- "30" من الجهة الأخرى.
- إيتوريكوسيب تارو 60 ملغ أقراص ذات لون أبيض، مستديرة، محدبة من الجهتين، مطلية ومع علامة "E90X" من جهة واحدة و- "60" من الجهة الأخرى.
- إيتوريكوسيب تارو 90 ملغ أقراص ذات لون أبيض، مستديرة، محدبة من الجهتين، مطلية ومع علامة "E90X" من جهة واحدة و- "90" من الجهة الأخرى.
- إيتوريكوسيب تارو 120 ملغ أقراص ذات لون أبيض، مستديرة، محدبة من الجهتين، مطلية ومع علامة "E90X" من جهة واحدة و- "120" من الجهة الأخرى.

حجم العبوات:

- 30 ملغ: عبوات ذات 28 قرص في الشريط.
- 60، 90 ملغ: عبوات ذات 14 قرص في الشريط.
- 120 ملغ: عبوات ذات 7 أقراص في الشريط.

المنتج:

Synthon Hispania, S.L., C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat,
08830 Barcelona, Spain

صاحب التسجيل وعنوانه:

تارو انترناشيونال م.ض.، شارع هيكتور 14، خليج حيفا 2624761

تم تحرير هذه النشرة في تشرين أول 2020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

إيتوريكوسيب تارو 30 ملغ أقراص: 160-49-34822-00

إيتوريكوسيب تارو 60 ملغ أقراص: 160-50-34823-00

إيتوريكوسيب تارو 90 ملغ أقراص: 160-51-34824-00

إيتوريكوسيب تارو 120 ملغ أقراص: 160-52-34825-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين