

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אטוריקוקסיב תרו תרו 30 מ"ג	אטוריקוקסיב תרו 60 מ"ג	אטוריקוקסיב תרו 90 מ"ג	אטוריקוקסיב תרו 120 מ"ג
טבליות מצופות	טבליות מצופות	טבליות מצופות	טבליות מצופות
כל טבליה מכילה:	כל טבליה מכילה:	כל טבליה מכילה:	כל טבליה מכילה:
etoricoxib 30 mg	etoricoxib 60 mg	etoricoxib 90 mg	etoricoxib 120 mg
אטוריקוקסיב 30 מ"ג	אטוריקוקסיב 60 מ"ג	אטוריקוקסיב 90 מ"ג	אטוריקוקסיב 120 מ"ג

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון עלון זה עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על אטוריקוקסיב תרו. אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא או הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה לשלך.
- התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

1. מהי אטוריקוקסיב תרו ולמה היא משמשת?

1.1 מהי אטוריקוקסיב תרו?

קבוצה תרפויטית: זוהי תרופה מקבוצת תרופות הנקראת מעכבי COX-2 סלקטיביים. אלו משתייכים לקבוצת תרופות הנקראת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs).

1.2 למה משמשת התרופה?

אטוריקוקסיב תרו 30 מ"ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות (דלקת) במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים מאוסטוארטריטיס.

אטוריקוקסיב תרו 60 מ"ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות (דלקת) במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים מאוסטוארטריטיס, ראומטואיד ארטריטיס ודלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis).

אטוריקוקסיב תרו 90 מ"ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות (דלקת) במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים מראומטואיד ארטריטיס, ודלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis).
אטוריקוקסיב תרו 90 מ"ג משמשת גם לטיפול קצר-טווח בכאב בינוני לאחר ניתוח דנטלי.

אטוריקוקסיב תרו 120 מ"ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות (דלקת) במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים משיגדון (גאוט).

מהי אוסטוארטריטיס?

אוסטוארטריטיס היא מחלה של המפרקים. היא נגרמת כתוצאה מפירוק הדרגתי של סחוס אשר מרפד את קצות העצמות. הדבר גורם לנפיחות (דלקת), כאב, רגישות, קשיין ומוגבלות.

מהי ראומטואיד ארטריטיס?

ראומטואיד ארטריטיס היא מחלה דלקתית ארוכת טווח של המפרקים. היא גורמת לכאב, קשיון, נפיחות ואובדן מתגבר של תנועה במפרקים עליהם היא משפיעה. היא עשויה לגרום גם לדלקת באזורים אחרים של הגוף.

מהו שיגדון (גאוט)?

שיגדון היא מחלה של התקפים פתאומיים וחוזרים של דלקת מכאיבה מאוד ואודם של המפרקים. היא נגרמת על ידי משקעים של גבישים מינרליים במפרקים.

מהי דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis)?

דלקת חוליות מקשחת היא מחלה דלקתית של עמוד השדרה ומפרקים גדולים.

2. לפני השימוש בתרופה

2.1 אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה אלרגי (רגיש) לאטוריקוקסיב או לכל אחד מהמרכיבים האחרים של תרופה זו (ראה בפרק 6).
- אתה אלרגי לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות (NSAIDs) כולל אספירין ומעכבי COX-2 (ראה "תופעות לוואי", פרק 4).
- יש לך כיב פעיל בקיבה או דימום בקיבה או במעי.
- יש לך מחלת כבד חמורה.
- יש לך מחלת כליות חמורה.
- את בהיריון או עשויה להיות בהיריון או את מיניקה (ראי "היריון, הנקה ופוריות", פרק 2).
- אתה מתחת לגיל 16 שנים.
- יש לך מחלת מעיים דלקתית, כגון מחלת קרוהן, דלקת כיבית של המעי הגס או דלקת של המעי הגס.
- יש לך לחץ דם גבוה שאינו נשלט על ידי טיפול (בדוק עם הרופא או אחות אם אינך בטוח האם לחץ הדם נשלט היטב).
- אתה סובל מבעיות בלב כולל אי ספיקת לב (בינונית או חמורה), אנגינה (כאב חזה).
- אתה סובל ממחלת לב איסכמית, היה לך התקף לב או ניתוח מעקפים או מחלת כלי דם היקפית (זרימת דם ירודה ברגליים או בכפות הרגליים עקב היצרות או חסימת כלי דם).
- היה לך כל סוג שהוא של שבץ (כולל מיני שבץ, התקף איסכמי חולף (TIA)).
- אטוריקוקסיב עלול להגביר מעט את הסיכון להתקף לב ושבץ ולכן אין ליטול אותו בחולים שהיו להם בעבר בעיות בלב או שבץ.

אם אתה חושב כי אחד מאלו נוגע אליך, אל תיטול את הטבליות עד שתתייעץ עם הרופא.

2.2 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באטוריקוקסיב תרו ספר לרופא אם:

- יש לך היסטוריה של דימום בקיבה או של כיבים.
- התייבשת, לדוגמה בעקבות התקף ארוך של הקאה או שלשול.
- יש לך נפיחות עקב אגירת נוזלים.
- יש לך היסטוריה של אי ספיקת לב או כל מחלת לב אחרת.
- יש לך היסטוריה של לחץ דם גבוה. אטוריקוקסיב תרו יכולה להעלות לחץ דם באנשים מסוימים, במיוחד במינונים גבוהים, והרופא ירצה לבדוק את לחץ הדם מדי פעם.
- יש לך היסטוריה של מחלת כבד או כליות.
- אתה מקבל טיפול לזיהום. אטוריקוקסיב תרו עלולה להסוות או להסתיר חום אשר הינו סימן של זיהום.
- יש לך סוכרת, כולסטרול גבוה או אם אתה מעשן. גורמים אלה יכולים להגדיל את הסיכון שלך למחלת לב.

- את אישה המנסה להרות.
- אתה מעל גיל 65 שנים.

אם אינך בטוח אם אחד הסעיפים הרשומים מעלה חלים עליך, **דבר עם הרופא לפני נטילת אטוריקוקסיב תרו** כדי לברר אם תכשיר זה מתאים לך. אטוריקוקסיב תרו עובדת היטב במידה שווה בחולים בוגרים צעירים ובחולים מבוגרים יותר. אם אתה מעל גיל 65 שנים, הרופא ירצה להשגיח עליך כראוי. אין צורך בהתאמת מינון בחולים מעל גיל 65 שנים.

2.3 תגובות בין תרופתיות

אם אתה נוטל או נטלת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, עליך להודיע על כך לרופא המטפל או לרוקח.

- בפרט, אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות, הרופא ירצה לעקוב אחרך על מנת לבדוק כי התרופות פועלות כראוי, לאחר תחילת הטיפול באטוריקוקסיב תרו:
- תרופות אשר מדללות את הדם (נוגדי קרישה) כמו וארפרין
 - ריפאמפיצין (אנטיביוטיקה)
 - מטוטרקסט (תרופה המשמשת לדיכוי מערכת החיסון ולעיתים קרובות משמשת לטיפול בראומטואיד ארטריטיס)
 - ציקלוספורין או טקרולימוס (תרופות לדיכוי מערכת החיסון)
 - ליתיום (תרופה לטיפול בסוגים שונים של דיכאון)
 - תכשירים המיועדים לטיפול בלחץ דם גבוה ובאי ספיקת לב, הנקראים מעכבי ACE וחוסמי הרצפטור לאנגיוטנסין, לדוגמה אנלאפריל, רמיפריל, לוסרטן וואלסרטן.
 - משתנים
 - דיגוקסין (תרופה לאי ספיקת לב וקצב לב לא סדיר)
 - מינוקסידיל (תרופה לטיפול ביתר לחץ דם)
 - סלבוטאמול טבליות או תמיסה למתן דרך הפה (תרופה לאסתמה)
 - גלולות למניעת היריון (השילוב עלול להגדיל את הסיכון לתופעות לוואי)
 - טיפול הורמונלי חלופי (השילוב עלול להגדיל את הסיכון לתופעות לוואי)
 - אספירין, הסיכון לכיבים בקיבה גדול יותר אם אתה נוטל אטוריקוקסיב תרו עם אספירין.
 - אספירין למניעת התקפי לב או שבץ:
- ניתן ליטול אטוריקוקסיב תרו עם **מינונים נמוכים** של אספירין. אם אתה נוטל כעת מינון נמוך של אספירין כדי למנוע התקפי לב או שבץ, אין להפסיק ליטול אספירין ללא התייעצות עם הרופא.
- אספירין ותרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות אחרות (NSAIDs):
- אין ליטול אספירין **במינון גבוה** או תרופות אנטי-דלקתיות אחרות בזמן נטילת אטוריקוקסיב תרו.

2.4 שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול טבליות אטוריקוקסיב תרו עם או בלי האוכל. תחילת ההשפעה של אטוריקוקסיב תרו עשויה להיות מהירה יותר כאשר היא ניטלת ללא אוכל.

2.5 היריון, הנקה ופוריות

היריון

אין ליטול טבליות אטוריקוקסיב תרו במהלך ההיריון. אם את בהיריון או חושבת כי את עשויה להיות בהיריון, או אם את מתכננת להיכנס להיריון, אין ליטול את הטבליות. אם נכנסת להיריון, הפסיקי לקחת אותן והתייעצי עם הרופא. התייעצי עם הרופא אם אינך בטוחה או זקוקה לעצה נוספת.

הנקה

לא ידוע אם אטוריקוקסיב תרו מופרשת בחלב אם. אם את מיניקה, או מתכננת להיניק, התייעצי עם הרופא שלך לפני נטילת התרופה. אם את נוטלת אטוריקוקסיב תרו אין להיניק.

פוריות

אטוריקוקסיב תרו אינה מומלצת לנשים המנסות להרות.

2.6 נהיגה ושימוש במכונות

סחרחורת וישנוניות דווחו בחלק מהחולים שנטלו אטוריקוקסיב תרו. אל תנהג אם אתה מרגיש סחרחורת או ישנוניות. אל תשמש בכלים כלשהם או מכונות אם אתה מרגיש סחרחורת או ישנוניות.

2.7 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אטוריקוקסיב תרו מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים כלשהם, צור קשר עם הרופא לפני נטילת תרופה זו.

2.8 ילדים ומתבגרים

אין לתת תרופה זו לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש ליטול אטוריקוקסיב תרו בדיוק כפי שאמר לך הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. **אין ליטול יותר מהמנה המומלצת למצבך.** הרופא ירצה לדון בטיפול שלך מדי כמה זמן. חשוב כי תשתמש במנה הקטנה ביותר אשר שולטת בכאב שלך ולא תיטול אטוריקוקסיב תרו לזמן ארוך יותר מהדרוש. זאת מכיוון שהסיכון להתקפי לב ולאירועים מוחיים עשוי לעלות לאחר טיפול ממושך, במיוחד במינונים גבוהים.

קיימים חוזקים שונים לתכשיר זה והרופא ירשום את החוזק המתאים עבורך בהתאם למחלתך.

המינון המומלץ בדרך כלל הוא:

אוסטאוארטריטיס

המינון המומלץ הוא 30 מ"ג פעם ביום, ניתן לעלות למקסימום של 60 מ"ג פעם ביום, במקרה הצורך.

ראומטואיד ארטריטיס

המינון המומלץ הוא 60 מ"ג פעם ביום, עם הגדלה מירבית ל- 90 מ"ג פעם ביום במידת הצורך.

דלקת חוליות מקשחת

המינון המומלץ הוא 60 מ"ג פעם ביום, עם הגדלה מירבית ל- 90 מ"ג פעם ביום במידת הצורך.

למצבי שיגדון ארטריטי חריף ולכאב לאחר ניתוח דנטלי, יש להשתמש באטוריקוקסיב רק לתקופת הכאב הסימפטומטי.

שיגדון (גאוט)

המינון המומלץ הוא 120 מ"ג פעם ביום, שבו יש להשתמש רק בשלב האקוטי של הכאב, מוגבל למקסימום 8 ימי טיפול.

כאב לאחר ניתוח דנטלי

המינון המומלץ הוא 90 מ"ג פעם ביום, מוגבל למקסימום 3 ימי טיפול.

מטופלים עם בעיות כבד

- אם יש לך מחלת כבד קלה, אין ליטול יותר מ- 60 מ"ג פעם ביום.
- אם יש לך מחלת כבד מתונה, אין ליטול יותר מ- 30 מ"ג פעם ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

שימוש בילדים ובמתבגרים

אין לתת אטוריקוקסיב תרו לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

קשישים

אין צורך בהתאמת מינון במטופלים קשישים. כמו עם תרופות אחרות, יש לנקוט זהירות עם מטופלים קשישים.

אופן המתן

אטוריקוקסיב תרו מיועדת למתן דרך הפה. יש ליטול את הטבליות פעם ביום. ניתן ליטול אטוריקוקסיב תרו עם או בלי אוכל. יש לבלוע את התרופה עם כמות קטנה של מים. אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה של הטבליות.

אם נטלת יותר אטוריקוקסיב תרו מכפי שהיית צריך

לעולם אין ליטול יותר טבליות ממה שהרופא המליץ. אם נטלת יותר מדי טבליות אטוריקוקסיב תרו, עליך לגשת לקבלת טיפול רפואי מיד. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים ולהביא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול אטוריקוקסיב תרו

חשוב ליטול אטוריקוקסיב תרו כפי שרשם הרופא. אם החמצת נטילת מנה, יש ליטול את הטבליה הבאה בזמנה הרגיל, ביום שלמחרת. אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. עליך להשלים את הטיפול במלואו כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. **אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.** אם יש לך שאלות נוספות כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה, שאל את הרופא או הרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו כל התרופות, אטוריקוקסיב תרו עשויה לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

אם אתה מפתח כל אחד מהסימנים הבאים, עליך להפסיק את הטיפול באטוריקוקסיב תרו ולפנות לרופא מיד (ראה "לפני השימוש בתרופה" פרק 2):

- קוצר נשימה, כאבים בחזה ונפיחות בקרסוליים שמופיעים או מחמירים
- הצהבה של העור והעיניים (צהבת) - אלו הם סימנים לבעיות בכבד
- כאב בטן חמור או מתמשך או צואה שחורה
- תגובה אלרגית שיכולה לכלול תגובות עוריות כגון כיבים או שלפוחיות, או התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון העלולים לגרום קשיי נשימה.

תופעות לוואי נוספות העלולות להתרחש במהלך הטיפול באטוריקוקסיב תרו:

שכיחות מאוד (very common) - תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מתוך 10

- כאב בטן

שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100

- מכתשית יבשה (דלקת וכאב לאחר עקירת שן)
- התנפחות של הרגליים ו/או כפות הרגליים עקב אצירת נוזלים (בצקת)
- סחרחורת, כאב ראש
- פלפיטציות (דפיקות לב מהירות או לא סדירות), קצב לב לא סדיר (אריתמיה)
- עלייה בלחץ הדם
- צפצופים או קוצר נשימה (עווית סמפונות)
- עצירות, גזים (עודף גזים), דלקת קיבה (דלקת של רירית הקיבה), צרבת, שלשול, קשיי עיכול (דיספסיה) / אי-נוחות בטנית, בחילה, הקאה, דלקת של הוושט, כיבים בפה
- שינויים בבדיקות דם הקשורות לכבד
- חברות
- חולשה ועייפות, מחלה דמוית שפעת

לא שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000

- דלקת הקיבה והמעיים (דלקת של מערכת העיכול המערבת הן את הקיבה והן את המעי הדק/שפעת הבטן), דלקת של דרכי הנשימה העליונות, דלקת בדרכי השתן
- שינויים בערכים של בדיקות מעבדה (ירידה במספר תאי הדם האדומים, ירידה במספר תאי הדם הלבנים, ירידה בטסיות)
- רגישות יתר (תגובה אלרגית הכוללת סרפדת אשר עשויה להיות חמורה באופן שיידרוש טיפול רפואי מיידי)
- עלייה או ירידה בתיאבון, עלייה במשקל
- חרדה, דיכאון, ירידה בחדות מנטלית: ראייה, הרגשה או שמיעה של דברים שאינם קיימים (הזיות)
- שינויים בטעם, אי יכולת לישון, חוסר תחושה או עקצוץ, ישנוניות
- טשטוש ראייה, גירוי בעין ואדמומיות
- צלצולים באוזניים, ורטיגו (תחושה של סחרור בזמן עמידה במקום)
- קצב לב לא סדיר (פרפור פרוזדורים), קצב לב מהיר, אי ספיקת לב, הרגשה של התהדקות, לחץ או כבדות בחזה (אנגינה פקטוריס), התקף לב
- הסמקה, שבץ, מיני שבץ (התקף איסכמי חולף), עלייה חמורה בלחץ הדם, דלקת של כלי הדם
- שיעול, קוצר נשימה, דימום מהאף
- נפיחות בקיבה או במעי, שינויים בדפוסי עשיית הצרכים, יובש בפה, כיב קיבה, דלקת של רירית הקיבה העלולה להיות חמורה ולהוביל לדימום, תסמונת המעי הרגיז, דלקת של הבלב
- התנפחות של הפנים, פריחה בעור או גרד בעור, אדמומיות של העור
- התכווצות/עווית שרירים, כאב/נוקשות שרירים
- רמות גבוהות של אשלגן בדם, שינויים בבדיקות דם או שתן הקשורות לכליות, בעיות חמורות בכליות
- כאב בחזה

נדירות (rare) - תופעות שמופיעות ביותר ממשמש אחד מתוך 10,000

- אנגיואדמה (תגובה אלרגית המלווה בהתנפחות של הפנים, שפתיים, לשון ו/או גרון אשר עלולים לגרום לקושי בנשימה או בבליעה, ועשויים להיות חמורים באופן שיידרוש טיפול רפואי מיידי) // תגובות אנפילקטיות הכוללות שוק (תגובה אלרגית חמורה הדורשת טיפול רפואי מיידי)
- בלבול, חוסר מנוחה
- בעיות בכבד (דלקת כבד)
- רמות נמוכות של נתרן בדם
- אי ספיקת כבד, הצהבה של העור ו/או העיניים (צהבת)
- תגובות עוריות חמורות

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו, כמו כל תרופה אחרת, יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש באטוריקוקסיב תרו לאחר תאריך התפוגה (exp. date) אשר מצויין על האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. **תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל-25°C. יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מפני לחות. אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

• נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
ליבה:

Calcium hydrogen phosphate, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, croscarmellose sodium.

ציפוי הטבליה:

Hypromellose, titanium dioxide, triacetin, lactose monohydrate.

כיצד נראית אטוריקוקסיב תרו ותכולת האריזה

אטוריקוקסיב תרו טבליות זמינות בארבעה חוזקים:

- **אטוריקוקסיב תרו 30 מ"ג** טבליות בצבע לבן, עגולות, קמורות משני הצדדים, מצופות ומסומנות ב-"E9OX" מצידן האחד וב-"30" מצידן השני.
- **אטוריקוקסיב תרו 60 מ"ג** טבליות בצבע לבן, עגולות, קמורות משני הצדדים, מצופות ומסומנות ב-"E9OX" מצידן האחד וב-"60" מצידן השני.
- **אטוריקוקסיב תרו 90 מ"ג** טבליות בצבע לבן, עגולות, קמורות משני הצדדים, מצופות ומסומנות ב-"E9OX" מצידן האחד וב-"90" מצידן השני.
- **אטוריקוקסיב תרו 120 מ"ג** טבליות בצבע לבן, עגולות, קמורות משני הצדדים, מצופות ומסומנות ב-"E9OX" מצידן האחד וב-"120" מצידן השני.

גודל אריזות:

30 מ"ג: אריזות בגודל 28 טבליות במגשיות.
60, 90 מ"ג: אריזות בגודל 14 טבליות במגשיות.
120 מ"ג: אריזות בגודל 7 טבליות במגשיות.

יצרן:

Synthon Hispania, S.L., C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona, Spain

בעל הרישום וכתובתו:

תרו אינטרנשיונל בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761

נערך באוקטובר 2020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אטוריקוקסיב תרו 30 מ"ג טבליות: 160-49-34822-00

אטוריקוקסיב תרו 60 מ"ג טבליות: 160-50-34823-00

אטוריקוקסיב תרו 90 מ"ג טבליות: 160-51-34824-00

אטוריקוקסיב תרו 120 מ"ג טבליות: 160-52-34825-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.