


ستيموفيل 300 مكم/0.5 مل محلول للتسريب أو للحقن

المادة الفعالة وتركيزها:
كل 0.5 مل تحتوي على:
فيجراسيت 300 مكم/غرام
(Filgrastim 300 micrograms)



رسمه 2

ستيموفيل 480 مكم/0.5 مل محلول للتسريب أو للحقن

المادة الفعالة وتركيزها:
كل 0.5 مل تحتوي على:
فيجراسيت 480 مكم/غرام
(Filgrastim 480 micrograms)

اقرأ الشرة بيعان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء، تحوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء، إذا كانت لديك أنسنة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى هذا الدواء وصف لعلاج حالتك الصحية، لا تعلمه للأخرين، وهو قد يسبب لهمضرر حتى إذا بدأ كل أن جاثمهم صحية مشابهة.

نلت انتشاره في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل أعراض جانبية لدى قسم من المستخدمين، لا تزعج من قراءة قائمة الأعراض الجانبية من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها.

4. أعراض جانبية

كما في كل دواء قد تسبب استعمال ستيموفيل أعراض جانبية لدى قسم من المستخدمين، لا تزعج من قراءة قائمة الأعراض الجانبية من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها.

يجرب التوجيه فوراً إلى الطبيب إذا حدث العلاج:

- النزيف دفع كمي مائي على طبيكه متعدد المكونات في ضغط الدم، معروبات تنفس، انتفاخ الوجه (شدة)، انتفاخ الجلد، طفح مثير للحكة (شدة)، انتفاخ الجلد، الشفاف، الغم، اللسان أو الحال (دورة عرقية)، وضيق الأنف.
- انتشار سمع، سخونة، وسعوبات تنفس، قد تكون هذه علامات لامتنازمة ضيق التنفس الحاد (Acute Respiratory Distress Syndrome).
- انتشار مرضي مع سرطان.

أو تعرق في الطحال.

- انتشار علاج لقلة الدخالات المزمن والشيخوخة (البيبة المزمنة)، من الممكن أن يقوم طبيكه بإجراء فحوصات بول ثانية إذا كنت تعاني من هذه الظاهرة أو إذا غيرت دينوكس على زراعة المريء.
- كثرة تعرق من أحد الأعراض الجانبية التالية أو من مزيج منها: انتفاخ الذي قد يكون مرتبط بتناول أدوية، معروبات تنفس، انتفاخ في البطن وشوارع بالمتلازمة، وشوارع بالمتلازمة.

قد تكون هذه أعراض حادة غير عادي (قد تظهر لدى حتى مستخدم 1 من بين 100) التي تدعى متلازمة التسرب الشعري، التي تؤدي بالدم بناءً على الأدوية الدموية الصغيرة للجسم وتنتهي علاج طبي طارئ.

إذا كنت تعاني بأي واحدة من الأعراض التالية:

- سخونة، ارتجاع، أو انتشار بذري شديد، ظلم قلب سريع، ارتياب أو قلة تنفس، ضيق التنفس، الماء متطرف أو قلة راحة وجداً صوت أو متغير.
- قد تكون هذه أعراض حادة شديدة ("الاشتباه")، هذا ثورث وخم من رد فعل التهابي بكمال الجسم الذي قد يكون مهدد للحياة وتستوجب علاج طبي طارئ.

إذا كنت تعاني من أصابة كافية (التهاب كيتيات الكلم)، أصابة كافية شديدة لدى مرضى الذين تلقوا ستيموفيل، توجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من انتفاخ في الوجه أو في الكاحلين، مد في البول أو بول يلوون يبني أو انتشت بذلك تبول أقل من المتوقع.

أعراض جانبية إضافية

عرض جانبية شائعة جداً (أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستخدم 1 من بين 10):

- تقيؤات.
- غثيان.
- سلسات أو ترقق شاذ للشعر (صلع).
- تعب.
- الماء وانتفاخ شفاء الجهاز الهضمي - من الماء واحتياج الشفاف (التهاب الفشاد).
- انتفاخ في تعداد صفات الدم الذي يقلل من قدرة الدم على التخطيط (التهاب الصفراء).
- تعداد منخفض من خلايا الدم الحمراء (أقر الدم).
- سخونة.
- المراس.
- اسهال.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 من مستخدمين من بين 100):

- التهاب الصبار (التهاب الشعب الهوائية).
- التهاب في جهاز التنفس المخاطي.
- انتفاخ في الشفاف.
- عدم القدرة على الدم (أرق).
- دوران.
- انتفاخ في الحساسية، بشكل أساسي في الحال.
- وخز أو آلة شعور في البنين أو الرجال.
- ضغط عدم منخفض.
- ضغط عدم مرتفع.
- شمال.
- شمال شفاف.
- الماء في البول وفي البطل (الماء فموي ينبع).
- تزيف من الأنف (رغاف).
- أنسداد.
- الماء في الدم.
- تضخم الشفاف.
- مطر.
- أحمر الدم (حمس).
- شنج عصارات.
- الماء عند التبول.
- الماء في المصدر.
- ضغط عام (ضعف وهن، قلة طاقة).
- شعر عام غير جيد (قلة دهون).
- انتفاخ في البنين وفي الرجال.
- ارتفاع في ازدياد معينة في الدم.
- تزيفات في كيدها الدم.
- رد فعل للتسريب.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 من مستخدمين من بين 10,000):

- ارتفاع في عدد خلايا الدم البيضاء.
- رد فعل للتسريب.
- رضق نفقي العظم المزروع (مرض العظم جيلاً الثاني).
- متواترات مرتفعة من حمض الوريك في الدم التي قد تؤدي إلى انتفاخ (gout).
- اصابة في البدن الناجحة من قبل انتفاخ الأوردة الصغيرة في البدن.
- رات لا تصلح كما ينوي وتسبب ضيق التنفس (فشل تنفس).
- انتفاخ وأو سعال في الرئتين (تضيق رئوي).
- التهاب الرئتين (مرض رئوي حاد).
- تضليل العظام بسبب غير سليم للرئتين.
- تزيف من الرئتين.
- قلة امتصاص الأكسجين في الرئتين (تضيق التاكسي).
- مطر جاهلي مع تواء.
- مرض الذي يسبب انتفاخ في كافة العظام، يؤدي إلى ضعفها، يجعلها أكثر قابلية للكسر ويزيد انتفاخ الكسور (تخلخل العظام).


أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 من مستخدمين من بين 10,000):

- التهاب في الشريان الأبهري ("الأورطي") (اظهر رسمة 1).
- الماء في العظام.
- رد فعل تصريح ماجي هيدروليكية.
- الماء وانتفاخ في المفاصل، شبه اداء التهاب القرص (كتاب).
- تغير في الطريقة التي ينظم بها الجسم وزن السوائل في الجسم، والذي قد يؤدي إلى انتفاخ.
- التهاب الأوعية الدموية في الجلد.
- افات باردة ومؤلمة بدون بروز في الأطراف وأحياناً في الوجه والرقبة، مع سخونة (Sweet's syndrome).
- زيادة في حدة التهاب مفاصل روماتوид.
- تغير شاذ في البول.
- انتفاخ في كافة العظام.


إذا ظهر عرض جانبية، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبية لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التنبلة عن أعراض جانبية يمكن التفليغ عن أعراض جانبية على الرابط (التنبلة عن أعراض جانبية) أو الذهاب إلى وزارة الصحة (www.health.gov.il).

يذكر التنبلة عن أعراض جانبية، إنها تقتصر على ملحوظة المخالفة لافتراض العلاج.




رسمه 3




رسمه 4




رسمه 5



رسمه 6



رسمه 7



رسمه 1

يحتوي ستيموفيل على المادة الفعالة وتركيزها: فيجراسيت 300 مكم/غرام (Filgrastim 300 micrograms).

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.

أنت تناوله في كل مرة قد تسبب استعمال ستيموفيل على المريض الذي يتعافى من المرض المخالط.