



## 5. כיצד לאחסן את התרופה?

- מגע הרעלתית! תרופה זו וככל תרופה אחרת יש לשמר במקומם סגור מחוץ להישג ידם וטוחה ראייתם של ילדים / וא/or תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלתית. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מההופעה.
- אין להשמנתה בתרופה אחריו תאריך התגובה (exp. date) המופיע על גבי האריהה/נית. תאריך התגובה מתייחס ליום ההארון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל 25°C.
- לאחר הפעטה הראשונה ניתן להשתמש בשער 4 שבועות על מנת למשנע סיכון ללהותם. בכל פעם שאתה מחייב להשתמש בקבוק חדש רשאי את תאריך הפעטה על גבי התוויות והקרטון.
- הייעוץ בזוקח כיצד לזרוק את התרופות שאין בשימוש יותר בכדי לעוזר להגן על הסביבה.

## 6. מידע נוסף

נסוף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Propylene glycol, boric acid, mannitol, sodium chloride, polyoxyethylene hydrogenated, Castor oil 40 (HCO-40), Polyquaternium-1 solution (equivalent to Polyquaternium-1), hydrochloric acid and/or sodium hydroxide (for pH adjustment), purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האזינה  
**דואטובר** היא תמיסה צלוללה, כוורת צבע המסתפקת בבקבוק פלסטיק בפח容 של 2.5 מ"ל בעל פקק מוברג. הבקבוק איזו בשיטמי אלומיניום.

**בעל הרישום והיבואן וכותבותו:** נברטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 7126 תל אביב.

**נערך בדצמבר 2020**  
**מספר רישום בפנקס התרופות הממלכתי** במשרד הבריאות:  
144 33 31764

לשם הפשטות ולהקלת הקיריהה, עליון זה נסוח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מועמדת לבני שני המינים.

pigmentacija בתוך העין, אישונים מורחבים, שינויים במצב הריסים, שינויים במרקם הריסים, שדה ראייה לא תקין.

תופעת כלילית

הפרעות באזונים ובמבנה (האזור הפנימי): סחרחות המלווה בחששה טיבורית, גלאגולים ואזרזים.

לב וכלי דם: קצב לב אטטי, דיפיקטור לב, בעקבות (אגירת נולדים), שניי בדורך (קצב או מהירות), איספוקת לב (מחלת לב המלווה בקדצרים) ונפיחות של כוות הרגליים והרגלים עקב איגרת נולדים), סוג מסוים של הפרעה בעקבות הלב, תחתך או צחצח צד ממושך, רינוין, דיזים ורגלים קרים, רידה באפסקת דם למוח. דרכי נשימה: הגאות דרכי נשימה בריאות (לרוב במוטלים עם محلה קימוט), נזלת או גושש באף, התעטשות (בגלל אלרגיה), קושי בשימה, לדמים מהאף, ביש באף. מערכת העצבים ותנועות כליליות: קושי בשינה (נדודי שינה), סטיות לוליה, ווגדן ציכון, היית, רידה בכוח ובאנרגיה, חרדה (עדיף לחץ ראש).

מערכת העיכול, הפרעות טעם, בחילות, הפרעות עיכול, שלשול, יבש בהרפה, כאב בטן, הקאות ועיצרות.

אלרגיה: עליה בתסמיין אלרגיה, תנובות אלרגיות כליליות כולל נפיחות מתחת לעור שיכולה להשול באזוריים כגון הפנים והגבים, ולרבים מכם משוכנעה מה שיכלול בורות לקושי בבלוטיות או בנשימה, פריחה כלילית או מוקמיה, גרד, תנובות אלרגיות פתאומיות חמורה מכוננת חיה.

עור: פריחה בעור בעלת מראה לב-נורא (porosisiform) או חמרה בסופומאלית, קליפול העור, פריחה מוגברת לא רגאל של השער, דלקת בעור המלה בפרקיה אדומה אדמדמה, שמיים בצעב השער, נשרה של ריסים, גרד, צמיחת שיער לא לרלה, א玳מויז בעור.

שרירים: הגברת סימנים ומוגנים של מיאסטניה גרביס ( הפרעה בשירים), תחשות לא נורולות כגון דקירות, חולשת/עיפויות שרירים. כאב שרירים שלא נגרם עקב מוגנוני, כאבים במפרקים. הרפרעות כליליות ובՄՐחמת השתן: קושי וכואב בעת מתן שתן, דילפה לא צונתית של שתן.

מערכת הריביריה: אין אונות, רידה בחשך המין. מבלולים: מותן מוכנות של סוכר בدم, עליה בסמני סרטן בלוטת הערמוני.

אם הופיעה מופעת לוואי, אם אחת מהתופעות הלואוי מחמורה או כאשר אתה מוגבל מטופפת לוואי שלא צינה בעلون, עיר להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי!

ניתן לדוח על תופעות לאויאי למשרד הבריאות באמצעות לוחzieה על הקישור "דו"ח על תופעות לוואי" עוקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המופיע לדווח על תופעות לוואי, או ע"י כינוס לקיושו: <https://sideeffects.health.gov.il>