

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

מוקולית 375 מ"ג  
טבליות מציצה בטעם  
דבש-לימון  
Mucolit 375 mg  
Lozenges Honey-Lemon  
Flavour

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבלית מציצה מכילה: קרבוציסטאין 375 mg Carbocysteine  
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים. עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מפחיתה את צמיגות הליחה ומכייחת. התרופה מיועדת להקלה בהפרעות במערכת הנשימה המלוות בליחה מוגברת ו/או צמיגה.

קבוצה תרופיסית: מכייחים.

### 2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לקרבוציסטאין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6). הסימנים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות נשימה או בליעה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.
- הנך סובל ממיב בקיבה או במעי.

### אזהרות מיוחדות המנועות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול במוקולית, ספר לרופא אם:

• הנך מבוגר

• סבל בעבר ממיב בקיבה או במעי

### אינטראקציות/תגובות בין תרופות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה לוקח:

• תרופות אחרות שעלולות לגרום לדימום בקיבה

### הריון, הנקה ופוריות

השימוש במוקולית אינו מומלץ בהריון ובהנקה.

אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון. עשוי להיות בהריון, מתכנתת להיכנס להריון, מניקה או מתכנתת להניק.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל טבלית מציצה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן ועל כן נחשבת לנטולת נתרן.

טבלית המציצה מכילה Sunset Yellow שעלול לגרום לתגובות אלרגיות.

טבלית המציצה מכילה 10.5 מ"ג אספרטיים. אספרטיים הוא מקור לפנילאלין. עלול להיות מסוכן במטופלים עם פנילקטונוריה, הפרעה גנטית נדירה בה יש הצטברות פנילאלין בגוף.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

2 טבליות מציצה, 3 פעמים ביום. כאשר חל שיפור ניתן להפחית לטבלית מציצה אחת, 4 פעמים ביום.

התרופה אינה מיועדת לילדים. ישנן צורות מתן אחרות לילדים, לדוגמה: מוקולית תמיסה למתן דרך הפה, טיפטיפות מוקולית.

אין לעבור על ההנחיה המומלצת.

### מחשך הטיפול:

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא. אולם במידה וחלה החמרה במצבך במהלך הטיפול יש לפנות לרופא לפני תום 7 ימי הטיפול.

**צורת הנטייה:** את טבליות המציצה יש למצוץ או ללעוס.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, אתה עלול לסבול מקלקול קיבה (הפרעות במערכת העיכול).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארזת התרופה איתך.

**אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש,** אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויה והמנה בכל פעם שהנך**

**נוטל תרופה.** הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש במוקולית עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית**

**חולים במקרים הבאים:**

• תגובה אלרגית, הימנים כוללים: פריחה, בעיות נשימה או בליעה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.

• שלפוחיות או דימום על העור, כולל סביב השפתיים, העיניים, הפה, האף ואיברי המין. ייתכן שתופעות אלו יהיו מלוות בתסמינים דמויי

הנך בהריון. עשוי להיות בהריון, מתכנתת להצביע על תסמונת הנקראת תסמונת טיבנס-ג'ונסון (Stevens-Johnson syndrome).

• הקאה דמית, צואה שחורה כזפת.

**יש לידע את הרופא או הרוקח אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מחמירה או נמשכת מעבר למספר ימים:**

• בחילה או הקאה

• שלשול

• כאב בטן

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**דיווח על תופעות לוואי:**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופו המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע היעדרות תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ארייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך מתמנע הרישוק. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

### 6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Xylitol, Sodium Starch Glycolate, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Aspartame, Lemon Flavour, Honey Flavour, Quinoline Yellow 70-E104, Sunset Yellow FCF E110.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

האריזה מכילה מגשות המכילות 12, 18, 24, 36 טבליות מציצה. כל טבלית מציצה הינה עגולה, שטוחה, בצבע כתום בטעם דבש-לימון. ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

**שם היצרן/בלעל הרישום וכתובתו:** כצטע"ת תעשיות כימיות בע"מ, רחוב

הקדמה 3, קרית מלאכי.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך 06/2016 ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך 01/2021.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 142022973601

שלש הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

