

Инструкция по применению препарата, в соответствии с

«Положением о фармацевтах (Препараты)» - 1986

Лекарство продается без рецепта врача

Ренни® со вкусом апельсина

Жевательные таблетки

Активные вещества:

Кальция карбонат 680 мг (272 мг доступного кальция)

Calcium carbonate 680 mg

Магния карбонат 80 мг

Magnesium carbonate (heavy) 80 mg

Неактивные вещества и аллергены в препарате: см. раздел 2, пункт «Важная информация о некоторых из компонентов препарата» и раздел 6 «Дополнительная информация».

Прежде чем начать применение препарата, внимательно прочтите инструкцию до конца. Инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Необходимо принимать данный препарат согласно указаниям в пункте дозировки настоящей инструкции. Если вам потребуется дополнительная информация, проконсультируйтесь у фармацевта. Вам следует обратиться к врачу, если симптомы вашего заболевания усугубились или не улучшились в течение 14 дней.

1. Для чего предназначен данный препарат?

Препарат предназначен для облегчения состояний повышенной желудочной кислотности и изжоги. Каждая таблетка нейтрализует 16 mEq кислоты.

Терапевтическая группа: Антациды.

Ренни предназначен для лечения симптомов, являющихся следствием заброса кислотного содержимого желудка в пищевод и ротовую полость, что вызывает ощущение жжения или боли за грудиной.

Ренни также используется для лечения симптомов, которые вызывает повышенная кислотность содержимого желудка, например, если вы страдаете от изжоги.

2. Перед применением препарата

Не применяйте препарат, если:

- Вы страдаете аллергией на карбонат кальция или карбонат магния или на любой из дополнительных компонентов, содержащихся в препарате (список всех компонентов см. в разделе 6 «Дополнительная информация»).
- Вы страдаете тяжелым нарушением функции почек или почечнокаменной болезнью.
- Вы страдаете повышенным уровнем кальция или пониженным уровнем фосфатов в крови.

Особые предостережения в связи с приемом препарата

Перед началом приема препарата необходимо сообщить врачу, если:

- Вы страдаете серьезным нарушением функции почек, саркоидозом (воспалительным заболеванием, которое поражает различные органы) или хроническими либо серьезными нарушениями/заболеваниями желудка или пищеварительной системы.

Дети и подростки

Данный препарат не предназначен для детей младше 12 лет. Если ребенок младше – следует обратиться к врачу.

Лабораторные анализы и наблюдение

- До начала применения препарата следует сообщить врачу, если вы принимаете препарат из группы тиазидов (в частности, бендрофлуметиазид) для увеличения количества вырабатываемой вами мочи, так как, возможно, что врач захочет контролировать уровень кальция у вас в крови.

Межлекарственные взаимодействия

Если вы принимаете (или принимали в последнее время) другие препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта врача, или пищевые добавки, необходимо сообщить об этом врачу или фармацевту, в особенности, если вы принимаете:

- Препараты, содержащие железо или фосфаты.
- Антибиотики из группы тетрациклинов или хинолонов.
- Препараты, применяемые для лечения нарушений сердечного ритма и сердечной недостаточности из группы сердечных гликозидов, в частности дигоксин и дигитоксин.
- Препараты из группы тиазидов, в частности бендрофлуметиазид (мочегонные). См. также выше в пункте «Лабораторные анализы и наблюдение».
- Фториды.
- Левотироксин (гормон щитовидной железы).
- Элтромбопаг (препарат, применяемый для увеличения количества тромбоцитов в крови).

Одновременный прием с Ренни может влиять на действие указанных выше препаратов. Для того чтобы позволить принимаемым вами препаратам действовать наилучшим образом, рекомендуется принимать Ренни через 1-2 часа после приема этих препаратов.

Прием препарата и питание

Как и с любыми другими лекарствами из группы антацидов содержащими кальций, следует воздерживаться от употребления в пищу большого количества молока или молочных продуктов на протяжении периода приема этого лекарства.

Беременность и грудное вскармливание

Можно применять данный препарат во время беременности, но следует воздерживаться от приема высоких доз в течение продолжительных периодов времени. Не превышайте рекомендуемую дозу. Воздерживайтесь от чрезмерного употребления в пищу молока и молочных продуктов (один литр содержит не более 1.2 грамма кальция), поскольку данный препарат содержит кальций в значительном количестве. Перед применением любого препарата следует проконсультироваться у врача или фармацевта.

Можно принимать препарат в период грудного вскармливания в соответствии с рекомендованной ниже дозировкой (см. раздел 3 «Как принимать препарат?»).

Вождение автомобиля и работа с механическим оборудованием

Не ожидается, что прием данного препарата окажет какое-либо воздействие на способность управлять транспортом или работать с механическим оборудованием.

Важная информация о некоторых компонентах препарата

Каждая таблетка содержит 475 мг сахарозы. Если врач сообщил вам, что вы страдаете аллергией на некоторые сахарины, проконсультируйтесь у врача перед началом приема Ренни со вкусом апельсина.

3. Как принимать препарат?

Нужно проконсультироваться у врача или фармацевта, если вы не уверены в отношении дозировки и способа применения препарата.

Дозировка препарата обычно составляет:

- **Взрослые и дети старше 12 лет:** 1-2 таблетки для рассасывания или разжевывания, по мере необходимости; предпочтительно, приблизительно через один час после еды и перед сном.

- Для лечения изжоги можно принять еще 1-2 таблетки между этими приемами.
- Не принимайте более 10 таблеток в день.
- **Препарат не предназначен для детей младше 12 лет.**
- Избегайте продолжительного применения.
- Рекомендуется подождать примерно час-два между приемом других препаратов и приемом Ренни.

Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

Продолжительность лечения

Не следует применять данный препарат в течение более двух недель (при отсутствии соответствующей рекомендации врача). Если симптомы продолжаются более 14 дней с начала приема препарата, следует обратиться к врачу, чтобы исключить другие, более серьезные медицинские состояния, которые могут быть замаскированы применением Ренни (или другого препарата из группы антацидов).

Способ приема препарата

Следует разжевать или рассосать 1-2 таблетки Ренни так, как указано в разделе 3 «Как принимать препарат?». Можно принимать таблетки Ренни, не запивая их водой.

Если по ошибке вы приняли более высокую дозу препарата, чем требуется, вам следует немедленно обратиться к врачу или фармацевту.

Продолжительный прием препарата в высокой дозировке может вызывать нарушения функции желудка и системы пищеварения, в частности тошноту, рвоту и необычную мышечную слабость. В этом случае следует прекратить прием препарата, немедленно обратиться к врачу и обеспечить поступление достаточного количества жидкостей в организм. См. также раздел 4 «**Побочные явления**», пункт «**Следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу при появлении...**».

Если вы приняли слишком высокую дозу препарата, или если по ошибке препарат проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку от препарата.

Если вы забыли принять препарат в назначенное время, ни в коем случае не следует принимать двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Не следует принимать лекарства в темноте! Необходимо проверить этикетку препарата и его дозу при каждом приеме. Если вы пользуетесь очками, наденьте их перед приемом лекарства.

Если у вас возникли дополнительные вопросы относительно приема препарата, обратитесь с ними к врачу или фармацевту.

4. Побочные явления

Как и в случае с любым другим препаратом, прием Ренни может вызывать побочные явления у некоторых пользователей. Не пугайтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, что вы не испытаете ни одно из них.

При приеме в рекомендуемых дозах побочные явления маловероятны.

Следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу при появлении:

- **Редких** аллергических явлений, о которых сообщалось, в частности: сыпи, зуда, затруднений дыхания и отека лица, ротовой полости или гортани, анафилактического шока (тяжелая и опасная для жизни аллергическая реакция, возможными симптомами которой являются низкое артериальное давление, учащение пульса, затруднения дыхания, бронхоспазм, кожные реакции, боли или спазмы в животе, рвота и понос).

Продолжительное применение высоких доз препарата может привести к повышению уровня кальция и магния в крови выше нормального уровня, особенно у пациентов, страдающих нарушениями функции почек. Это может проявиться следующими симптомами: тошнота, рвота, нарушения функции желудка, понос, утомляемость, мышечная слабость, спутанность сознания, повышенная выработка мочи, усиление чувства жажды и обезвоживание.

Продолжительное применение Ренни в сочетании с употреблением молока или молочных продуктов может вызывать т. н. «молочно-щелочной синдром», способный привести к повышению уровня кальция в крови. У этого синдрома могут быть следующие симптомы: уменьшение вкусовых ощущений, головные боли, нарушения функции почек, утомляемость и появление подкожных образований.

При появлении побочного явления, а также если какое-либо из побочных явлений усугубляется или если вы страдаете побочным явлением, не указанным в данной инструкции, вам следует проконсультироваться у врача.

Можно сообщить о побочных явлениях в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку «Сообщение о побочных эффектах от лекарств», которая находится на интернет-сайте Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), чтобы перейти на электронный бланк сообщения о побочных явлениях, или переходя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. Как хранить препарат?

- Не отравитесь! Этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и (или) младенцев (и вне поля их зрения). Таким образом, вы сможете предотвратить отравление препаратом. Не вызывайте рвоту без соответствующего указания врача!
- Не следует принимать препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности препарата оканчивается в последний день указанного на упаковке месяца.

Условия хранения

- Следует хранить препарат при температуре ниже 25°C. Следует хранить препарат в оригинальной упаковке.
- Не следует выбрасывать препарат в канализацию или с бытовым мусором. Проконсультируйтесь у фармацевта, каким образом следует выбрасывать препараты, которые более не используются. Это поможет сохранить окружающую среду.

6. Дополнительная информация

Помимо активных веществ данный препарат содержит следующие компоненты: Sucrose, orange flavour, talc, maize starch pregelatinised, potato starch, magnesium stearate, paraffin light liquid, saccharin sodium.

Как выглядит препарат, и каково содержимое его упаковки:

Четырехугольные вогнутые таблетки для разжевывания кремово-белого цвета с отпечатанным словом «RENNIE» с обеих сторон. У таблеток есть запах апельсина. Упаковка содержит 36 таблеток.

Владелец регистрации и его адрес: «Байер Израиль Лтд.», ул. Ха-Хараш 36, Ход ха-Шарон 45240.

Название и адрес производителя: Дельфарм Гайар, Франция, Ул. Де-Лидостери 33, 74240, Гайар, Франция.

Отредактировано в сентябре 2020 года.

Регистрационный номер препарата в государственном реестре лекарственных препаратов Министерства здравоохранения: 144 16 32043 00