



ספטמבר 2020

רופא/ה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון:
Rennie Peppermint
רני בטעם מנטה
Chewable tablets
Calcium Carbonate 680 mg
Magnesium Carbonate 80 mg

אנו מבקשים להודיעכם שהעלון לצרכן של התכשירים עודכן ושאוּמץ עלון לרופא כלשונו.

התוויות מאושרות:

Relief of hyperacidity and heartburn.

בהודעה זו כלולים העידכונים המהותיים בלבד. בפירוט שלהלן מופיע, מתוך כל פרק ששונה בעלונים, רק המידע שהתעדכן. תוספת טקסט מסומנת בקו תחתון. מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.

העדכונים בעלון לרופא

אומץ עלון לרופא כלשונו.

העדכונים בעלון לצרכן

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה במצבים של חומציות יתר בקיבה וצרבת. כל טבליה סותרת 16 mEq של חומצה.

קבוצה תרפויטית: סותר חומצה. רני משמש לטיפול בסימפטומים הנובעים מהחזר של תכולת הקיבה החומצית לושט ולפה הגורם לתחושת בעירה או כאב מאחורי עצם החזה.
רני גם משמש לטיפול בסימפטומים הנגרמים על-ידי חומציות יתר של תכולת הקיבה, כגון במקרה שהנך סובל מצרבת.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הנך סובל ממחלת מליקוי חמור בתפקוד הכליות חמורה או מאבנים בכליות.
- הנך סובל מרמות סידן גבוהות בשתן או אבנים בכליות.

לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה/ מערכת השתן. יתכן והרופא יפנה אותך לביצוע בדיקות דם.
- הנך סובל מליקוי חמור בתפקוד הכליות, מסרקואידוזיס (מחלה דלקתית הפוגעת באיברים שונים בגוף) או שהנך סובל מבעיות/מחלות כרוניות או חמורות בקיבה או במערכת העיכול.
- הינך רגיש למזון כלשהו, או לתרופה כלשהי.



אינטראקציות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תכשירים המכילים ברזל או פוספט.
- תרופות אנטיביוטיות ממשפחת הטטרציקלינים או הקווינולונים.
- תכשירים המשמשים לטיפול בהפרעות קצב ואי ספיקת לב ממשפחת הגליקוזידים הלבביים כגון דיגוקסין ודיגיטוקסין.
- תרופות ממשפחת התיאזידים כגון בנדרופלומטיאזיד (תרופות משתנות). ראה גם מעלה בסעיף "בדיקות ומעקב".
- פלואורידים.
- לבוטירוקסין (הורמון בלוטת התריס).
- אלטרומבופאג' (תרופה המשמשת להעלאת מספר הטסיות בדם) מומלץ להמתין לפחות 4 שעות לפני או אחרי נטילת אלטרומבופאג' לנטילת רני.

התרופות מעלה עלולות להיות מושפעות מנטילה בו-זמנית עם רני. כדי לאפשר לתרופות שהנך נוטל לפעול באופן מיטבי, מומלץ ליטול את רני 1 – 2 שעות לאחר נטילת תכשירים אלו.

הריון, והנקה

ניתן לשימוש בנשים הרות או מניקות להשתמש בתכשיר בתקופת ההריון אך יש להימנע מנטילת מינונים גבוהים לפרקי זמן ממושכים. אין לעבור על המינון המומלץ. יש להימנע משימוש ממושך מצריכה עודפת של חלב ומוצרי חלב (ליטר אחד מכיל 1.2 גרם סידן לכל היותר), היות והתרופה מכילה כמות משמעותית של סידן. לפני השימוש בכל תרופה שהיא, יש להיוועץ ברופא או ברוקח.

ניתן ליטול תכשיר זה בתקופת ההנקה בהתאם למינון המומלץ מטה בפרק 3 "כיצד תשתמש בתרופה".

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה כל טבליה מכילה 475 מ"ג סוכרוז. אם נאמר לך על ידי רופא כי הנך סובל מרגישות לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת רני בטעם מנטה. רני טבליות לעיסות בטעם מנטה אינן מכילות נתרן ולכן מתאימות למטופלים הזקוקים לתזונה דלת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

משך הטיפול

אין להשתמש בתרופה זו במשך יותר משבועיים אלא בעצת רופאך. אם התסמינים ממשיכים מעל 14 ימים מנטילת התרופה, פנה לרופא, וזאת על מנת לשלול מצבים רפואיים חמורים יותר העלולים להיסוות על-ידי השימוש ברני (או כל תכשיר אחר מסוג סותר החומצה).

צורת הנטילה

יש ללעוס או למצוץ 1 – 2 טבליות רני באופן המתואר מעלה בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה". ניתן ליטול טבליות רני ללא מים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, יש לפנות לרופא או לרוקח במייד. שימוש ממושך במינונים גבוהים של התרופה עלול להוביל לבעיות בקיבה ומערכת העיכול כגון: בחילות, הקאות, עצירות, תשישות, וחולשת שרירים חריגה. במקרים אלו יש להפסיק את השימוש בתרופה, לפנות מיד לרופא, ולהבטיח צריכת כמויות נאותות של מים נזלים. ראה גם פרק 4 "תופעות לוואי" סעיף "יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא בהופעת".



4. תופעות לוואי

בשימוש ממושך במינונים גבוהים של התרופה עלולות להיגרם רמות סידן ומגנזיום גבוהות מדי בדם, ביחוד אצל חולים הסובלים מבעיות בתפקוד הכליות.

בשימוש ממושך במינונים גבוהים של התרופה עלולות להיגרם עלייה ברמות סידן ומגנזיום גבוהות מדי בדם, ביחוד אצל חולים הסובלים מבעיות בתפקוד הכליות.

בשימוש ממושך במינונים גבוהים או ברני בשילוב עם כמות גדולה של חלב או מוצרי חלב עלול לגרום לתסמונת "מילק אלקלי" המתבטאת העלולה להוביל לרמות גבוהות של סידן בדם. עלולים להופיע התסמינים הבאים של תסמונת זו: אבדן ירידה בחוש הטעם, כאבי ראש, הפרעות בכליות, תשישות וכן הופעת גושים מתחת לעור.

5. כיצד לאחסן את התרופה?

- אין להשליך תרופות לאשפה הביתית או לביוב. היוועץ ברוקח כיצד להיפטר מתרופות שאין לך בהם שימוש נוסף. צעדים אלו יסייעו לשמור על הסביבה.

העלון לרופא והעלון לצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug>

ניתן לקבל מודפסים ע"י פניה לחברת באייר ישראל, רח' החרש 36 הוד השרון, טלפון: 09-7626700.

בברכה,

באייר ישראל