

**Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986**

Препарат продается без рецепта врача  
Название препарата и лекарственная форма:

**Царевет X - таблетки для жевания со вкусом мяты**

**Tzarevet X Mint Flavour chewable tablets**

**Царевет X - таблетки для жевания со вкусом дыни**

**Tzarevet X Melon Flavour chewable tablets**

Каждая таблетка содержит:

500 мг карбоната кальция (200 мг биодоступного кальция)

Calcium Carbonate 500 mg (elemental calcium 200 mg)

Способность нейтрализации кислоты на таблетку: 10 мЭкв.

Перечень неактивных компонентов и аллергенов в препарате приведен в пункте 6 («Дополнительная информация»), а также в пункте «Важная информация о некоторых из ингредиентов препарата».

**Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приёмом препарата.**

Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Препарат Царевет X предназначен для детей старше 12 лет.

Следует применять препарат в соответствии с изложенным в пункте «Дозировка» данной инструкции.

Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. При обострении признаков заболевания (симптомов) или отсутствии улучшения в течение двух недель следует обратиться к врачу.

Недопустим прием Царевет X одновременно с другими лекарствами, перечисленными в разделе 2 «Взаимодействие лекарственных средств».

**1. Показания к применению:**

Для облегчения изжоги и повышенной кислотности желудка.

**Терапевтическая группа:** Антациды.

**2. Перед применением препарата:**

**☒ Не следует принимать препарат в следующих случаях:**

- при гиперчувствительности (аллергии) к активному ингредиенту - карбонату кальция или к любому другому компоненту, содержащемуся в лекарстве (перечень приведен в пункте 6);
- при избыточном содержании кальция в крови (гиперкальциемия) или избыточном содержании кальция в моче (гиперкальциурия);
- во время диеты с ограничением фосфора (фосфатов);
- при нарушениях функции паращитовидной железы;
- при почечных патологиях (в частности, при почечнокаменной болезни);
- при синдроме Золлингера-Эллисона;
- во время приема Дигоксина для лечения сердечного заболевания.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**  
**Если Вы принимаете другие лекарственные препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта, и биодобавки, или если недавно закончили лечение другим лекарством, сообщите об этом врачу или фармацевту.** Непременно сообщите врачу или фармацевту, если вы принимаете:

Диуретики группы тиазидов, бисфосфонаты для лечения потери плотности кости, тетрациклины и ципрофлоксацин (антибиотики).

Следует соблюдать интервал в 2-3 часа между приемом данного препарата и других лекарств, принимаемых перорально.

**Беременность, грудное вскармливание и фертильность:**

Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать данный препарат. См. пункт 3 - «Принятая дозировка».

**Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:**

Каждая таблетка Царевет X для жевания со вкусом мяты содержит около 7 мг Аспартама.

Каждая таблетка Царевет X для жевания со вкусом дыни содержит около 4,5 мг Аспартама.

Аспартам является источником фенилаланина, который может оказать негативное воздействие при фенилкетонурии (PKU) - редком генетическом нарушении, приводящем к скоплению в организме большого

количества фенилаланина ввиду нарушения способности к его нормальному выведению.

### **3. Как использовать препарат?**

При возникновении сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

#### **Принятая дозировка для взрослых и подростков старше 12 лет:**

разжевать 2-4 таблетки при появлении симптомов, либо в соответствии с рекомендацией врача.

Не следует принимать более 15 таблеток за 24 часа.

Беременным женщинам не следует принимать более 10 таблеток за 24 часа.

#### **Не превышать рекомендуемую дозу.**

**Продолжительность курса лечения:** Не следует принимать максимальную дозу свыше двух недель - за исключением случаев, когда длительный прием производится по рекомендации и под наблюдением вашего врача.

Не следует применять препарат в случае, если симптомы не проходят более двух недель - за исключением случаев, когда длительный прием производится по рекомендации врача.

Данное лекарство не предназначено для детей в возрасте до 12 лет.

**Форма приема** - разжевать или растворить во рту.

**Измельчение/разрезание пополам/жевание**

Можно растолочь/разжевать таблетку. **В случае передозировки** или случайного приема препарата внутрь ребенком немедленно обратитесь к врачу или в приёмный покой больницы, захватив с собой упаковку препарата.

**Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом приёме препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки.**

**Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.**

### **4. Побочные эффекты:**

Как и при приёме любого лекарственного препарата, приём таблеток Царевет X может привести к побочным эффектам у некоторых потребителей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

Побочные эффекты включают: запор, газы, тошноту, икоту.

**В случае появления или обострения какого-либо из побочных явлений, либо проявления иного, не указанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.**

Сообщить о побочных эффектах в Министерство здравоохранения можно, заполнив форму отчета о побочных эффектах по ссылке «отчет о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на домашней странице веб-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)), или по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il/>

### **5. Как хранить препарат?**

Избегайте отравлений! Во избежание отравлений этот препарат, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.

Не используйте препарат после истечения срока годности (EXP), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

**Условия хранения:** Хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре ниже 25°C.

### **6. Дополнительная информация:**

Помимо действующего вещества препарат содержит также:

**Царевет X со вкусом мяты:**  
 Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Aspartame, Peppermint flavour

**Царевет X со вкусом дыни:**  
 Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Melangor flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake

**Как выглядит препарат и содержимое упаковки?**

**Царевет X со вкусом мяты:**  
 таблетки для жевания белого цвета круглой формы с углублением, имеют характерный запах мяты.

**Царевет X со вкусом дыни:**  
 таблетки для жевания желтовато-зеленоватого цвета круглой формы с углублением, имеют характерный запах дыни.

В упаковке содержится 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 таблеток для жевания в блистерной упаковке.

В продаже могут быть представлены не все размеры упаковок.

**Владелец регистрационного удостоверения и его адрес:** CTS Chemical Industries Ltd., Акидма 3, Кирьят-Малахи.

Формат данной инструкции от 01/2021 установлен Министерством здравоохранения; содержание документа соответствует содержанию вкладыша оригинального препарата, проверенного и утвержденного Министерством здравоохранения в декабре 2014 г. Регистрационный номер лекарственного препарата в государственном реестре Министерства здравоохранения:

Царевет X со вкусом мяты - регистрационный номер: 1311430847  
 Царевет X со вкусом дыни - регистрационный номер: 1311730850

