

עלון לצריך לפי תקנות הרווקהים (תקנירם) המשנה"י - 1986

התרופה מושוקת לא מרשם רופא
שם התקנישר ואורות:

צרבת X טבליות לעיסה בעטם מנטה
Tzarevet X Mint Flavour chewable tablets

צרבת X מלון טבליות לעיסה בעטם מלון
Tzarevet X Melon Flavour chewable tablets

כל טבליה מכילה:

500 מ"ג קלציטום קרבונט (200 מ"ג סיליקון צימי) Calcium Carbonate 500 mg (elemental calcium 200 mg)

כשר סתיית חומצה לטבליה: Eq 10 mEq.

לשרותם ההורמים הבלטיים פולימרים והאלרגניים בתכנייר -

ראה סעיף 6 "מודיע נועץ" ועורך "מודיע שבר על התקן מהמכבים של התקופה".

קרא בעין את העלון עד סוףบรรטת תשמש בתפקידו. פגיעה גנטית אם הרוקח או לא הרואין או אל הרוקה.

צרבת X מיועדת לילדים מעל גיל 12 שנים.

עליך ליטול את התקנישר על פי ההוראות בסעיף נסוס. עליך לפטוט אל הרופא בדידיה ומיפוי המחלת (טפטוטומיס) מהיררים או אינם משתפרים לאחר שבעוים.

אי ליטול את התקנישר בפרק 2 "גאנובין בין תרופיות".

שופעי בפרק 2 "גאנובין בין תרופיות".

1. מה מיודעת התקופה?

לקלהות צברת וחומצות כובבה. נוגד חומצה.

2. לפוי השימוש בתפקידו:

אי להשתמש בתפקידו.

אם אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל קלציטום קרבונט או כל אחד מהמכבים הנוספים אשר מכילו ההורמה (פופוטסיט). (6).

במטופלים עם עדר סידן שיטן (הפרקליציאריה). עדיף סידן שיטן (הפרקליציאריה).

במטופלים המציגים על דיאטה דלת דרchan (פופוטסיט).

במטופלים עם בעיות בעיכולות בלוטות יותרת התannis.

במטופלים עם בעיות בכליות (כגון: אבינים בכליות).

במטופלים בעלי תסמנות זוליגנבר-אליסון.

במטופלים המציגים יגוזון לטיפול במחלת לב.

9. אינטראקציות/תגובהות בין תרופיות:

אם אתה לך, או לא לך תארחורה, תרופות

אחרות יכולות תרופות לאמר ש"ל יגיד עת הרופא עלך לרווחה. בווייזיון צזונה, 50%

או הרוקח אם אתה לך:

משתנים מסווגים תיאזרדים, ביוסטיפונאים לטיפול

ונון לדוחו על תופעות לוואי, למשרד הבריאות באמצעות
לחיצה על הקישור "דו"ח על תופעות לוואי ערך טיפול
התווחה" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות
(www.health.gov.il)

תופעות לוואי, או ע"י כינוס קלשווין:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התקופה?

גען הרעלתית הרופאה וכן כל הרופה אחרית ייש שומר
במקום מקורי מחוץ לארון דם או מיל'ם או תינוקות
ועל ידייך תמן הרעלתית. אל תגרום להקה לא לא
הוראה מוסרת הרופאה.

אין להשתמש בתפקידו אחרית תאריך התקופה (EXP)
ההופיע ע"י גבריה. תאריך התקופה מתייחס ליום
האחרון של אותו חדש.

תאריך אקסון: לשלאחיה המקורית, במקום ייש,
בטempter הנטה הנמוכה מ-25°C.

6. מידע נוספים:

מושך על המרכיב הפעיל התקופה מכילה גם:
רכבת X בטעם מלון:

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Aspartame, Peppermint flavour
רכבת X בטעם מלון:

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Melangor flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake
יכן נוראית התקופה ומה תוקן האරואה?

רכבת X בטעם מלון:
כל טבליית עליסיה הינה כבעל לבן, עוגלה עם גומינה ויש לה ריח מנטה אופייני.

רכבת X בטעם מלון:
כל טבליית עליסיה כבעל-ירוק, עוגלה עם גומינה ושלה ריח מלון אופייני.
הארואה מכילה 1, 3, 2, 1, 12, 6, 3, 24, 18, 36, 24, 12 טבליות עליסיה אורתונת במנשיות.

ישתכן שא כל דג'יל הארואה מושך.
ץ'ן/בעל הרוישם וכותבת: כס תעשיית כימיות בע"מ, הקדמה, 3, קרי מילאכי.
עלון זה דוח מאירן 01/2021 הינו ימין שבורט שנקבע ע"י משרד הבריאות ונוכנו תאום לעלון תזכיר המקשר שבסכך ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 12/2014.
מספר רישום הרופאות בפקנס התקופות הממלכתי
במשרד הבריאות:

רכבת X בטעם מלון מושך רישום: 1311430847
רכבת X בטעם מלון מושך רישום: 1311730850
לשם הפקשות וההקלת קראריה, עלון זה נוסח בלבד
כך. על אף זאת, התקופה מושДЕת לבני המים.

רכבת X בטעם מלון מושך רישום: 1311430847
רכבת X בטעם מלון מושך רישום: 1311730850
לשם הפקשות וההקלת קראריה, עלון זה נוסח בלבד
אתה מון.

תופעות לוואי כוללות: עצירות, גזים, בחילות, גיהוקים.
אם הרופאה, או כאשר תוסף כובל מותפעת לוואי של אַזְיָזִין בעילון, עליך להתייחס ע"י הרופא.

בדולדול עצם, טרטרז'ילינים וציפורולוקסצין
(אנטיביטוקיטוקו).

יש לניטול תרוף צומן של 2-3 שעות בין טלית תרופה זו
לזמן ניטול תופעות אורתונת בתפקידו דרכ הפה זו.

ה. הרוון, הנקה ופוקה:
יש להיעזר בזרע רפואי או ברוקח לפני השימוש בתפקידו אם
ההנץ ברוחין או גונקה. – "הו"ם המוקב"."

ג. מידע שבר על צבתת X: מודע שבר על הסיס בטעם מלון
כל טבלייה של צבתת X אופרטום. מיליה 3-7 מ"ג אופרטום.

מיליה 4.5-5.5 מ"ג אופרטום.
אספרטם הינו מוקר פילנאלני, אשר עלול להזין אם
אתה סובל פופיליטונופאיה (PKU), הוכרעה גנטית
דרורה הגורמת להצטבבות כמות דוגלה של פילנאלן
בגוף, משם השגשג אין מסול לפונטן קראיו.

3. כיצד השתמש בתפקידו?

עליך לדודק עם הרוקח אם תפקידו אם איןיך בטוח.
המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים ולילדים מעל

גיל 12 הא:

לעס 2-4 טבליות בעת הופעת התסמיינים, או לפני
ההמתלה הרופאה.

אין לךתית יותר מ-15 טבליות ב-24 שעות.
אם אתה בהריון, אין לךתית יותר מ-10 טבליות ב-24
שעות.

אין לךבר על המנה והתמלצת:

משך הטיפול – אין להשתמש במבנה המקסימלי בתפקידו
ירוח משכבייעים, אלא בהמלצת ובפיקוח של הרופא
שלן.

אין להשתמש בתפקידו באם הסימפטומים נמשכים מעל
שבועיים, אלא בהמלצת הרופא.

התוכנה הירה מושעת לילדים מתההן לאל 12 שנים.
צורת הנשיטה – יש להוציא או להמסס בפה.

כניתה/תיתיה/עליזה:
ניתן כנתוש/ולסוס את הטבלייה.

אם מידי רופא לא מודרך מין של בית חולים והבא את
אירוע הרופאה איתך.

אין לךתית תרופה בחושך! בדק התווית והמנה
בכל פעע שהרין נוטל תרופה. הרוכב משקפיים אם
הירין קוקהם.

אם יש לך שאלות נספוח בזונג לשימוש בתפקידו,
הוישן ברוחן או בתקינה.

4. תופעות לוואי:
כונו כל תרופה, השימוש ברכבת X בטליות עלול

לגרום לתופעות לוואי בחילוק ממהותם. אל תיבהל
לפוקם רישמת תופעות לוואי. יתכן שלא תסבול מף

אתה מון.

תופעות לוואי כוללות: עצירות, גזים, בחילות, גיהוקים.
אם הרופאה, או כאשר תוסף כובל מותפעת לוואי של אַזְיָזִין בעילון, עליך להתייחס ע"י הרופא.

אם הרופאה, או כאשר תוסף כובל מותפעת לוואי של אַזְיָזִין בעילון, עליך להתייחס ע"י הרופא.

אם הרופאה, או כאשר תוסף כובל מותפעת לוואי של אַזְיָזִין בעילון, עליך להתייחס ע"י הרופא.

אם הרופאה, או כאשר תוסף כובל מותפעת לוואי של אַזְיָזִין בעילון, עליך להתייחס ע"י הרופא.

