

نشرة طبيّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالئة

(مستحضرات) 1986

يسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيية

اسم المستحضر وشكله:

تساريقيت X أقراص للمضغ بنكهة النعناع

Tzarevet X Mint Flavour chewable tablets

تساريقيت X أقراص للمضغ بنكهة الشمام

Tzarevet X Melon Flavour chewable tablets

يحتوي كلّ قرص على:

500 ملغ من كاربونات الكالسيوم (200 ملغ من الكالسيوم

المتوفر)

Calcium Carbonate 500 mg (elemental calcium

200 mg)

قد فرص على معادلة الحمض: 10 mEq.

لمعالجة قائمة المواد غير الفعالة ومسيبات الأرحية في المستحضر -

انظر البند 2 "معلومات إضافية" والبند "معلومات هامة عن بعض

مركبات الدواء".

أفرا النشرة بتمامها حتّى نهايتها قبل استعمالك للدواء. يحتوي هذه

النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توقرت لديك أسئلة

إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

تساريقيت X مخصص للأولاد الذين عمرهم أكثر من 12 عامًا.

يتوجب عليك استعمال المستحضر وفقًا لتعليمات المذكورة في بند

الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة

إلى معلومات إضافية. يتوجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت

أعراض المرض أو لم تتحسن بعد أسبوعين.

لا يجوز استعمال تساريقيت X بالتزامن مع أدوية أخرى كما يرد

في الفصل 2 "التفاعلات بين الأدوية".

1. لأيّ غرض مخصص هذا الدواء؟

لتخفيف من الحرقة والحموضة في المعدة.

الفصلية العلاجية: مضادات الحموضة.

2. قبل استعمال الدواء:

1. لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت لديك حساسية (أرحية) للمادة الفعالة كاربونات الكالسيوم أو لأيّ واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (المفصلة في البند 6).
- لدى متلقي العلاج الذين يعانون من فرط الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) أو من فرط الكالسيوم في البول (فرط كالسيوم البول).
- لدى متلقي العلاج الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الفوسفور (الفوسفات).
- لدى متلقي العلاج الذين يعانون من مشاكل في نشاط الغدد جينية الذرقية.
- لدى متلقي العلاج الذين يعانون من مشاكل في الكليتين (مثل: حصي الكليتين).
- لدى متلقي العلاج الذين يعانون من متلازمة زولينجر-إليسون.
- لدى متلقي العلاج الذين يستعملون ديجوكسين لعلاج مرض في القلب.

1. التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في

ذلك أدوية بدون وصفة وأدوية إضافية، فأخبر الطبيب

أو الصيدلي بذلك. خصوصًا يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا

كنت تستعمل:

مدرات البول من نوع الثيازيدات، البيسفوسفونات لعلاج انخفاض

كثافة العظام، نيتراسيكلينات وسيبروفلوكساسين (مضادات حيوية).

يجب الانتظار مدة 3-2 ساعات بين تناول هذا الدواء وتناول أدوية

أخرى لإعطاءه عن طريق الفم.

2. الحمل، الإرضاع والخصوبة:

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل

استعمال الدواء. انظري البند 3 - "الجرعة الدوائية المتبعة".

3. معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي كلّ قرص من تساريقيت X أقراص للمضغ بنكهة النعناع

على ما يقارب 7 ملغ من الألياف.

يحتوي كلّ قرص من تساريقيت X أقراص للمضغ بنكهة الشمام

على ما يقارب 4.5 ملغ من الألياف.

الألياف عبارة عن مصدر للفيتول الأئين، الذي قد يسبب الضرر

إذا كنت تعاني من بيلة الفيتول كيتون (PKU)، وهو اضطراب

وراثي نادر يسبب تراكم كمية كبيرة من فينيل الأئين في الجسم،

لأنّ الجسم لا يقدر على التخلص منه بشكل صحيح.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

12- الجرعة الدوائية المتبعة عادة للبالغين والأولاد الذين سنهم فوق

الـ 2:

امتضغ 4-2 أقراص عند ظهور الأعراض، أو بحسب توصية

الطبيب.

لا يجوز استعمال أكثر من 15 قرصًا خلال 24 ساعة.

إذا كنت حاملاً، فلا يجوز استعمال أكثر من 10 أقراص خلال

24 ساعة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج - لا يجوز استعمال الجرعة القصوى لأكثر من

أسبوعين، إلا إذا كان ذلك بتوصية من طبيبك وتحت مراقبتك.

لا يجوز استعمال الدواء إذا استمرت الأعراض لأكثر من

أسبوعين، إلا بتوصية من الطبيب.

الدواء غير مخصص للأولاد دون سن الـ 12.

كيفية تناول - يجب المضغ أو الإذابة في الفم.

الهرس / الشطر / المضغ

يمكن هرس / مضغ القرص.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه

فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطحب

مكعب عبوة الدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة / راجع الملصق وتأكد من

الجرعة على كلّ مرّة تناول فيها دواء. ضع النظرات الطبيّة إذا

كنت بحاجة إليها.

إذا توقرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر

الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أيّ دواء، قد يؤدي استعمال تساريقيت X أقراص إلى نشوء

أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة

الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أيّ واحد منها.

تشمل الأعراض الجانبية: إمساك، غازات، غثيانًا، تجشّوات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت أحد الأعراض الجانبية أو إذا

كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك

استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط

على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي"

الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

(www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستشارة المصلّصة

للتبليغ عن أعراض جانبية، عن طريق النسخة إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il/

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمّم! هذا الدواء، وأيّ دواء آخر، يجب حفظه في مكان

مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأول الأطفال الرضع وبذلك

ستمنع التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP)

المدرّون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير

من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين في العبوة الأصلية، في مكان

جاف، في درجة حرارة أقلّ من 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المركّب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:

تساريقيت X بنكهة النعناع:

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch

glycolate, Magnesium stearate, Aspartame,

Peppermint flavour

تساريقيت X بنكهة الشمام:

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch

glycolate, Magnesium stearate, Melangor

flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104,

FD&C Blue NO.1 Lake

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

تساريقيت X بنكهة النعناع:

كلّ قرص للمضغ أبيض اللون، مستدير ذو انبعاج وله رائحة

نعناع مميزة.

تساريقيت X بنكهة الشمام:

كلّ قرص للمضغ لونه أصفر-أخضر، مستدير ذو انبعاج وله

رائحة شمام مميزة.

تحتوي العبوة على: 1، 2، 3، 6، 12، 18، 24، 36 قرصًا

للمضغ معبأ في لويحة.

قد لا تسوّق جميع أحجام العبوات.

المصنع / صاحب الإمتياز وعنوانه: ك ص ط للصناعات الكيمياءية

م.ض، هاكيدما 3، كريات ملاح.

صيدت هذه النشرة في 01/2021 بالتّماشى مع الصيغة التي

حدّتها وزارة الصحة ومحتواها مطابق لنشرة المستحضر

الأصلي، التي فصّمت وأقرّت من قبل وزارة الصحة في

12/2014.

رقمي تسجيل الأدوية في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

رقم تسجيل تساريقيت X بنكهة النعناع: 1311430847

رقم تسجيل تساريقيت X بنكهة الشمام: 1311730850

من أجل التبسيط وتسجيل الفراء، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة

المذكّر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.