



**משרד ראשי**

רח' החרש 4  
הוד השרון 45240  
ת.ד. 10 ת"א 61000

**Head Office**

4 Haharash St.  
Hod-Hasharon 45240  
P.O.Box 10 Tel-Aviv 61000  
Israel

Tel. +972-9-7626333  
Fax. +972-9-7626300

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

המדון: עדכון עלון לצרכן

**TZAREVET X MINT FLAVOUR      צרבת X בטעם מנטה**  
**TZAREVET X MELON FLAVOUR      צרבת X בטעם מלון**

אנו מבקשים להודיעכם כי העלון לצרכן של תכשירי צרבת X בטעם מנטה ומלון עודכן. עדכון העלון כולל החמרות.

**ההתוויה המאושרת:**

Antacid

**הרכב וחוזק חומר פעיל:**

Calcium (as Carbonate) 500 mg

**צורת מינון:**

Chewable tablets

בפירוט שלהלן מובא המידע בו בוצעו שינויים מהותיים בלבד. תוספת טקסט או טקסט בעל שינוי משמעותי מסומן בצבע. מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.

**העדכונים העיקריים בעלון לצרכן הינם בפרקים הבאים:**

**צרבת X מיועדת לילדים מעל גיל 12 שנים.**

**1. למה מיועדת התרופה?**

נוגד חומציות ותוספת סידן לתזונה להקלת צרבת וחומציות בקיבה. קבוצה תרפויטית: נוגדי חומצה.

**2. לפני השימוש בתרופה:**

**X אין להשתמש בתרופה:**

- במטופלים בעלי עודף סידן בדם (היפרקלצמיה) או עודף סידן בשתן (היפרקלציאוריה).
- במטופלים בעלי תסמונת זולינגר-אליסון.

**! אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- לפני הטיפול בתרופה צרבת X, התיעוץ עם הרופא אם: הינך בהריון או מניקה, סובל/סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול, מחלות כבד, מחלות לב/כלי דם, שברים בעצמות.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.



## ! אינטראקציות/תגובות בין תרופות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות המכילות ברזל, סידן, פוספט, מגנזיום, פלואוריד
- דיגיטליס (ללב) - כגון: דיגוקסין
- קורטיקוסטרואידים
- אנטביוטיקה: טטרציקלינים או פלורוקווינילונים (כגון - ציפרופלוקסצין), מתנאמין
- פניטואין (לעיתות)
- ויטמין D או אבץ (תוספי תזונה)
- ביספוספנאטים לטיפול באוסטאופורוזיס
- ברזל במתן פומי למניעת/טיפול אנמיה
- לבוטירוקסין לטיפול בתת פעילות של בלוטת התריס
- תרופות בצורת טבליה עם ציפוי אנטרי
- תרופות נגד פטריות כגון קטקונאזול
- סודיום פוליסטירן, סולפונט

יש לחכות פרק זמן של 2-3 שעות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות במתן דרך הפה, תכשירי ברזל במתן דרך הפה.

### עישון:

יש להימנע מעישון מופרז בטבק

### בדיקות ומעקב:

בשימוש ממושך (בהוראת רופא), ו/או במינונים גבוהים ו/או כאשר הינך סובל מבעיות בכליה יש לערוך בדיקות רמת סידן והזרחן בדם ובשתן:

### שימוש בתרופה ומזון:

- יש להימנע משתייה מופרזת של משקאות המכילים קפאין.
- אין לטול תרופה זו בו זמנית עם חלב ומוצריו, תרד, רוברבר, סובין, מוצרי דגן.

### שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בצורה מופרזת בתקופת הטיפול עם התרופה

## המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 הוא:

### להקלת צרבת:

### קשישים ומבוגרים מעל גיל 12:

לעס או המס בפה 4-22-4 טבליות בעת הופעת התסמינים, או לפי המלצת הרופא. **אם את בהריון, אין לקחת יותר מ-10 טבליות ב-24 שעות.**

### ילדים בגילאים 6-12:

לעס או המס בפה 1 טבליה עם הופעת הצרבת.

אין לצרוך יותר מ-4 טבליות ביום

### 4. תופעות לוואי:

תופעות הלוואי כוללות:

- רפלקס קיבתי-ושטי (חזרה של חומצת קיבה) לאחר הקלה ראשונית של התסמינים.
- תגובה אלרגית (רגישות) והיצרות הסימפונות (ברונכופזם).

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות <http://www.health.gov.il>. ניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לחברת כצט בע"מ, רח' החרש 4 הוד השרון, 09-7626323

בברכה,

אלון אופיר

רוקח ממונה - כצט תעשיות כימיות בע"מ