

إكسيمستان تيفع 25 ملغ

أقراص مطلية

التركيب

يحتوي كل قرص مطلي على:

إكسيمستان 25 ملغ (Exemestane 25 mg).

لقائمة المواد غير الفعّالة، الرجاء أنظري الفقرة 6. وكذلك أنظري الفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء».

إقرئي النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجعي الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدأ لك أن مرضهم مشابه لمرضك. هذا الدواء غير مخصص للأطفال.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل إكسيمستان تيفع 25 ملغ للعلاج في المرحلة المبكرة لسرطان الثدي المتعلق بالهورمونات لدى نساء بعد فترة سن اليأس، وذلك بعد أن أتممن 2-3 سنوات من العلاج بدواء تاموكسيفين.

بالإضافة لذلك، يستعمل إكسيمستان تيفع 25 ملغ لعلاج المرحلة المتقدمة من سرطان الثدي المتعلق بالهورمونات لدى نساء في مرحلة ما بعد سن اليأس (بشكل طبيعي أو محرض)، حيث تقدم لديهن المرض بعد علاج هورموني (مضاد للإستروجين) منفرد أو بعد عدة علاجات هورمونية.

الفصيلة العلاجية:

من المثبطات الستيروئيدية للإنزيم أروماتاز، مواد مضادة للأورام (مضادة للسرطان).

ينتمي إكسيمستان تيفع 25 ملغ لفصيلة أدوية مثبطات أروماتاز - الإنزيم اللازم بشكل خاص لدى النساء بعد سن اليأس لإنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية - الإستروجينات.

إن خفض نسب الإستروجين في الجسم هي عبارة عن طريقة لعلاج سرطان الثدي المتعلق بالهورمونات.

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت:

- حساسة (لديك الرجيبا) أو وجدت لديك حساسية في الماضي للمادة الفعّالة (إكسيمستان) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (معلومات إضافية الرجاء أنظري الفقرة 6)
- في فترة الحمل، من شأنك أن تكوني حامل أو مرضعة
- لست ما بعد فترة سن اليأس (لا تزال لديك دورة شهرية)

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بـ إكسيمستان تيفع 25 ملغ إحكي للطبيب إذا:

- وُجدت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى.
- كنت تعانين أو عانيت في الماضي من مرض يؤثر على صلابة العظام. من الجائز أن يرغب الطبيب بإجراء فحوص كثافة العظم قبل وخلال فترة العلاج بـ إكسيمستان تيفع 25 ملغ. سبب ذلك هو أن هذه الفصيلة من الأدوية تقلل من نسب الهرمونات الجنسية الأنثوية، الأمر الذي قد يؤدي لفقدان محتوى العظام من المعادن، الذي بدوره قد يقلل من قوتها.
- الفحوص الواجب إجراؤها قبل استعمال الدواء:
- من شأن الطبيب أن يأخذ عينات من الدم وذلك للتأكد من أنك بلغت فترة سن اليأس.

- فحص روتيني لنسبة فيتامين D، في المراحل المبكرة من سرطان الثدي، من الجائز أن تكون نسبة فيتامين D لديك منخفضة جداً. سيعطيك الطبيب إضافة من فيتامين D إذا كانت نسبة فيتامين D لديك أدنى من المستوى الطبيعي.

التداخلات بين الأدوية

إذا كنت تتناولين، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكي للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

بالأخص إذا كنت تتناولين:

- أدوية حاوية على إستروجين
 - ريفامبيسين (مضاد حيوي)
 - فينيتوين أو كاربامازيبين (مضادات الإختلاج المستعملة لعلاج الصرع)
 - مستحضرات نباتية الحاوية على هيبيبريكوم (St. John's Wort)
- لا يجوز تناول إكسيمستان تيفع 25 ملغ بنفس الوقت مع علاج هورموني بديل (HRT).

إستعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء بعد وجبة الطعام.

الحمل والإرضاع

- لا يجوز تناول إكسيمستان تيفع 25 ملغ إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة.
- إذا كنت في فترة الحمل أو تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل، بلغي الطبيب.
- إذا كان هناك أي احتمال بأنه يمكنك الحمل، إستشيري الطبيب بالنسبة لوسائل منع الحمل.

السياقة وإستعمال الماكينات

إذا كنت تشعرين بنعاس، دوار أو ضعف عندما تتناولين إكسيمستان تيفع 25 ملغ، ممنوع عليك السياقة أو تشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء إكسيمستان تيفع 25 ملغ على الصوديوم. إن كمية الصوديوم أقل من 23 ملغ للقرص، بحيث يعتبر الدواء عملياً خالٍ من الصوديوم.

3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير واثقة بما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

قرص واحد من عيار 25 ملغ مرة في اليوم يؤخذ عبر الفم، بعد وجبة الطعام، بنفس الساعة تقريباً من كل يوم. يحدد طبيبك كيفية ومدة العلاج.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق/شطر/مضغ أقراص إكسيمستان تيفع 25 ملغ.

- يجب بلع الدواء مع قليل من الماء.
- إذا كنت بحاجة للوصول إلى المستشفى خلال فترة تناول إكسيمستان تيفع 25 ملغ، فيجب إبلاغ الطاقم الطبي عن الأدوية التي تتناولينها.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجهي في الحال إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضري معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، فلا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناولي القرص المنسي حال تذكرك. إذا حان تقريباً موعد المقدار الدوائي القادم، فتناولي القرص في الوقت الإعتيادي.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى به الطبيب.