

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يسوق الدواء بموجب وصف طبيب بيطري فقط
للاستعمال في الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله وقوته
أموكسيسال بيطري، مسحوق للإذابة في مياه الشرب

2. المادة الفعالة وكميتها في وحدة الجرعة
AMOXICILLIN TRIHYDRATE 100%
أموكسيسيلين تريهيدرات 100%

3. الهدف من استعمال الدواء
علاج تلوثات ناجمة عن جراثيم حساسة لأموكسيسيلين في الدجاج اللحم.

الفئة العلاجية: مضادات حيوية من فئة البنسيلين شبه الاصطناعي.

4. موانع الاستعمال

لا يجوز معالجة الحيوانات التي يعرف بوجود حساسية لديها نحو البنسيلين أو البيتا-لاكتام.

لا يجوز إعطاء المستحضر للأرانب، الهامستر، العضلان والصفار.

5. الأعراض الجانبية

لم يتم التبليغ عن أعراض جانبية للمستحضر

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة البيت في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجه للاستشارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

6. حيوانات الهدف: الدجاج اللحم.

لا يجوز تقديم المستحضر للدجاج المخصص لوضع البيض للأكل

7. الجرعة وطريق الإعطاء

يمكن استعمال الصيغة التالية لحساب الكمية المطلوبة في اليوم من المستحضر (بالغرام):

عدد الطيور x معدل الوزن (كغم)
66 (لجرعة 15 ملغ/كغم)

بغية التأكد من أن الجرعة صحيحة، يجب تحديد وزن الجسم بشكل دقيق بقدر الإمكان لتجنب إعطاء جرعة أقل من اللازم. استهلاك الماء مع الدواء منوط بالحالة السريرية للطيور. لبلوغ الجرعة الصحيحة يجب أن يكون تركيز أموكسيسيلين ملائمًا مع الأخذ بعين الاعتبار باستهلاك الماء.

الجرعة الموصى بها هي 15 ملغ أموكسيسيلين تريهيدرات لكغم وزن جسم. فترة العلاج الاجمالية يجب أن تكون 3 أيام أو في حالات وخيمة 5 أيام متواصلة.

8. طريقة استعمال المستحضر

للإعطاء بمياه الشرب. يجب تحضير المحلول مع مياه الصنبور الطازجة مباشرة قبل الاستعمال. بعد فتح العبوة يجب استعمال محتوى العبوة فورًا. يجب التخلص من المياه التي تحتوي دواء لم يستهلك بعد 12 ساعة. للتأكد من استهلاك الماء مع الدواء، لا يجوز إتاحة ولوج لمصادر مياه أخرى خلال العلاج.

9. فترة الانتظار-

الدجاج المخصص للذبح للحم- يوم واحد

لا يجوز تقديم المستحضر للدجاج التي تضع البيض المخصص للأكل.

10. تحذيرات

تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يستعمل المستحضر في علاج الحيوانات

يجب تجنب استنشاق المسحوق.

يجب غسل اليدين بعد الاستعمال.

قد تسبب البنسيلينات والسيفالوبورينات رد فعل تحسسي (أرجي) بعد الحقن، الاستنشاق، البلع أو لمس الجلد. قد يؤدي فرط الحساسية للبنسلين إلى ردود فعل متصالية للسيفالوسبورين، وبالعكس.

قد تكون ردود الفعل التحسسية لهذه المواد وخيمة في بعض الحالات.

(1) لا يجوز استعمال المستحضر في حال حساسية معروفة لهذه المواد أو إذا قيل لك ان لا تعمل مع هذه المواد.

(2) يجب توخي الحذر في الاستعمال لتجنب التعرض. يجب استعمال وسائل الحماية الموصى بها.

(3) إذا طورت أعراض في أعقاب التعرض للمستحضر، مثل طفح جلدي، عليك التوجه لاستشارة طبية وأن تظهر هذه التحذيرات للطبيب. انتفاخ الوجه، الشفتين والعينين أو صعوبات في التنفس هي أعراض وخيمة أكثر توجب العلاج الطبي الطارىء.

استعمال خلال وضع البيض

لم تبين دراسات مختبر في الجرذان دليلاً على أثر تشوهي في النسل عقب إعطاء أموكسيسيلين.

جرعة مفرطة

لم يتم التبليغ عن مشاكل مع جرعة مفرطة. يجب ان يكون العلاج حسب الأعراض، لا يوجد مصل مضاد (دواء ضد)

11. تعليمات التخزين

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين : دون 25°C.

12. تعليمات بخصوص التخلص من المستحضر/بقايا المستحضر في نهاية الاستعمال

- أي مستحضر بيطري طبي لم يتم استعماله أو أي مادة متبقية من جراء استعمال منتج بيطري طبي يجب أن يتم التخلص منها كنفائات سامة، لا يجوز الرمي في مجاري الصرف الصحي.
- يجب التخلص من المياه التي تحتوي على دواء لم يستهلك بعد 12 ساعة.

13. معلومات إضافية

- لا يحتوي الدواء على مواد أخرى إضافة للمادة الفعالة
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة- مرطبان بلاستيك أو كيس صغير بلون أبيض إلى شبه أبيض
- أحجام العبوات: 250 أو 500 غرام.

المصنع وصاحب التسجيل: بيفاك م.ض، شارع هايلان 6، ص.ب 300 أور عكيفا، 30600

تمت مراجعته في: 01/2021

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 083-95-92412