

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה
אמוקסיגיל וטרינרי, אבקה להמסה במי שתיה

2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון
AMOXICILLIN TRIHYDRATE 100%
אמוקסיצילין טריהידראט 100%

3. למה מיועדת התרופה
לטיפול בזיהומים הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים לאמוקסיצילין בתרנגולות פיטום.
קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים הסמי-סינתטיים.

4. התוויות נגד
אין לתת את התכשיר לארנבות, אוגרים, גרבילים ושרקנים.
אין לטפל בבעלי חיים שידועה לגביהן רגישות לפניצילינים או בטא-לקטאמים.

5. תופעות לוואי
לא דווחו תופעות לוואי לתכשיר.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

6. חיות מטרה: תרנגולות פיטום.
אין להגיש התכשיר למטילות ביצי מאכל

7. מינון ואופן המתן
ניתן להשתמש בפורמולה הבאה על מנת לחשב את הכמות הנדרשת ליום של התכשיר (בגרמים):

מספר העופות x משקל חי ממוצע (ק"ג)
66 (עבור מינון של 15 מ"ג/ק"ג)

על מנת לוודא מינון נכון, יש לקבוע את משקל הגוף באופן מדויק ככל האפשר כדי להמנע ממתן מינון נמוך מדי. צריכת המים עם התרופה תלויה במצב הקליני של העופות. על מנת להגיע למינון הנכון הריכוז של האמוקסיצילין צריך להיות מותאם בהתחשב בצריכת המים.

המינון המומלץ הוא 15 מ"ג אמוקסיצילין טריהידראט לק"ג משקל גוף. תקופת הטיפול הכוללת צריכה להיות 3 ימים רצופים או במקרים חמורים 5 ימים רצופים.

8. אופן השימוש בתכשיר
למתן במי השתייה. יש להכין את התמיסה עם מי ברז טריים מיד לפני השימוש. לאחר פתיחת האריזה יש להשתמש בתכולת האריזה מיידית. יש להפטר ממים עם תרופה שלא נצרכו לאחר 12 שעות. על מנת לוודא צריכה של המים עם התרופה, אין לאפשר לחיות גישה למקורות מים אחרים במהלך הטיפול.

9. זמן המתנה-

פטמים לשחיטה לבשר- יום אחד

אין להגיש התכשיר למטילות ביצי מאכל.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
יש להימנע משאיפת האבקה.
יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.
פניצילינים וצפלוספורינים עשויים לגרום לתגובת רגישות יתר (אלרגיה) לאחר הזרקה, שאיפה, בליעה או מגע עם העור. רגישות יתר לפניצילינים עשויה להוביל לתגובות צולבות לצפלוספורינים, ולהיפך.
תגובות אלרגיות לחומרים אילו עשויות להיות חמורות לעיתים.
(1) אין להשתמש בתכשיר במקרה של רגישות ידועה לחומרים אילו או אם נאמר לך לא לעבוד עם חומרים אילו.
(2) יש להיזהר בשימוש כדי להימנע מחשיפה. יש לנקוט באמצעי ההגנה המומלצים.
(3) אם הנך מפתח תסמינים בעקבות חשיפה לתכשיר, כגון פריחה עורית, עליך לפנות ליעוץ רפואי ולהראות לרופא אזהרה זו. התנפחות הפנים, השפתיים והעיניים או קשיי נשימה הם תסמינים חמורים יותר הדורשים טיפול רפואי דחוף.
- שימוש בזמן הטלה
- מחקרי מעבדה בחולדות לא הראו עדות לאפקט טרטוגני עקב מתן של אמוקסיצילין.
- מינון יתר
- לא דווחו בעיות עם מינון יתר. הטיפול צריך להיות סימפטומטי, אין אנטידוט (תרופת נגד) ספציפי

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : מתחת ל 25°C.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

- כל תכשיר ווטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר ווטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.
- יש להפטר ממים עם תרופה שלא נצרכו לאחר 12 שעות.

13.מידע נוסף

- התרופה אינה מכילה חומרים אחרים בנוסף על החומר הפעיל
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה- צנצנת פלסטיק או שקית למינט
- המכילה אבקה בצבע לבן עד כמעט לבן
- גודלי האריזות : 250 או 500 גרם.

יצרן ובעל הרישום: ביוואק בע"מ, רחוב האילן 30, אזור תעשייה צפוני, אור עקיבא, 3060000

נערך ב: 1/2021

מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:

083-95-92412-00