

جلدة موضعية (مثل كونتاك دير ماتيبيس - التهاب الجلد التماسي) أو تجاعي العينين أو ألم العينين.
يجري ريت-أفيت جل على Lanolin anhydrous (E200)
رويد فول جلدية موضعية (مثل كونتاك دير ماتيبيس - التهاب الجلد التماسي).
يجري ريت-أفيت جل على propyl Methyl hydroxybenzoate و hydroxybenzoate (E218) (الذين قد يسببان ردود فعل حساسية (قد تكون متاخرة)).

3. كيف استعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر يوماً وفق تعليمات الطبيب.
عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متآكلة من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج المستحضر.
الجرعة الدوائية ونوعية العلاج سجدهما الطبيب فقط.
مساء قبل النوم كل من المنشطة المصابة. يوصى أصحاب البشرة الفاتحة أو الحساسة بالدورة مرة واحدة في اليوم أو مرة واحدة كل يومين وفراز ردود الفعل.
يمنع الجلوس الجرة الموصى بها.

لا يجوز بلعه، لاستعمال الخارجي فقط.
قبل العلاج يجب غسل اليدين بالماء والصابون الطيفي،
وتحقيق الجلد بخطاف دون فركه والانتظار 30-40 دقيقة قبل دهن الدواء. لا يجوز شطف منطقة العلاج أكثر من مرتين في اليوم. بعد الاستحمام يمكن غسل العلاج بغير الماء.

يجب دهن كمية صغيرة من ريت-أفيت وتغطية المناطق المصابة فقط بالمستحضر. يمكن استعمال القطن أو عيدان الأذن النظيف. يجب الانتباع عن ترکيز كثيرة أكبر من اللازم من ريت-أفيت قبل طلاء الجلد مثل المنطقة التي تصلب فيها الأنف بالوجه. لا يجوز دهن العلاج بأكثر من مرتين في اليوم.

إذا لامس ريت-أفيت هذه المناطق، فيجب غسل اليدين.

مدة العلاج - تتر وروي تناول الجلد بعد مرور 3-4 ساعات إلى ثلاثة، لكن للحصول على النتيجة القصوى قد يتطلب الأمر سنة إلى شهرين.

التجاهي: العلاج بعد الادم لمرة العلاج 3 أشهر.

بعد دهن ريت-أفيت، قد تشعر سخونة الجلد أو بعض الوخز في الجلد لمدة ما إذا استمرت هذه الأسباب أو تفاقمت، فاستشر الطبيب.

إذا دهنت خطأ جزء دوائية على العلاج بعد مرور 3-4 ساعات، فلينق فليكس مرخماً أن تصرك الجرة الدوائية إذا كانت أكبر من اللازم، ثم ذلك حاول دائماً تطهير العلاج واستعمال بخاخات هلام.

إذا دهنت جزء مفرطة أو إذا قام ولد بيلع الدواء خطأ، فتوقف فوراً عن العلاج أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واستحصل معك عبة الدواء.

إذا سببت استعمال ريت-أفيت في الوقت المحدد: فلا يجوز دهن ضعف الكثافة الطيفية. يجب استعمال ريت-أفيت في الوقت الإعتيادي.

يجرب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة - راجع المنشق وتأكد من الجرعة في كل تناولاتها في الدواء. وضع القرارات الطبية إذا كنت جائحة إليها.

إذا توفرت لديك أسلنة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

كنت استعمل مادة لتنقير الجلد - بيلنج، تزيل الطبقات العلوية من الجلد. يستخرج جلد إلى الوقت كي يتعافى قبل أن تبدأ باستعمال الدواء.

الدواء غير مخصص للأولاد دون سن الـ 10.

1. تدابير خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل الداء بالعلاج.
- قبل العلاج بريت-أفيت، أخير الطبيب إذا:
- كنت مرضاً، يجب استشارة الطبيب (انظر البند "الحمل، الإرضاع والخصوبة").
- يجب الامتناع عن العرض بكثرة لأشعة الشمس ولأشعة فوق البنفسجية خلال فترة استعمال ريت-أفيت، مثل: اسرة التسمير أو مصايب التسمير بالأشعة فوق البنفسجية. إذا لم يكن بإمكانك امتناع عن العرض لسوء الشعور (مثل: بسبب العمل في الهواء الطلق) فيجب حماية الجلد معالج بريت-أفيت.
- استعمل كريماً وأفيتاً من آلة الشعور ذات عامل وقاية (SPF 15 على الأقل).
- ارتد قميصاً عريضاً الأطراف.
- ارتد قميصاً طويلاً تغطي الجلد معالج بريت-أفيت وتحمي من أشعة الشمس.

قد يستحب الطقس البارد، والرياح تهيج الجلد المعالج بريت-أفيت.

يمكن استعمال كريم مائي ماء طبع الجلد لأن ريت-أفيت قد يجعل الجلد جافاً بعض الشيء.

يمكن مواصلة استعمال منتجات أخرى للجلد، مثل: المنتجات التجميلية، حالات الجلد، لكن يجب الحرص على تنظيف الجلد جيداً قبل استعمال ريت-أفيت.

نظراً لتركيز الكحول المرتفع في ريت-أفيت جل، فإن المستحضر قابل للاحتراق. لا يجوز إشعال سيجارة أو التعرض للنار حتى يجف الجل تماماً.

2. الأولاد والطفلون

الدواء غير مخصوص للأولاد دون سن الـ 10.

لا تتوفر معلومات بخصوص سلامة استعمال هذا المستحضر وفعاليته لدى الأولاد والأمهات.

التفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تستعمل الإن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لا يجوز استعمال منتجات تحملندة صلبة أو خشنة خلال فترة استعمال ريت-أفيت، مثل: مواد لتنقير الجلد (باليون).

إذا ثابتت مفعف قوي على العلاج (ملا، سجنخارات)، تجنب على كثافة كبيرة من الجلوكوز.

إذا استعملت منتجات حلقة أخرى لعلاج حب الشباب (ما في ذلك المنتجات التي تصرف بدون وصفة طبية) أو إذا استعملت منتجات لتنقير الجلد (بيلنج)، فيجب الانتظار حتى يتلاشى تأثيرها قبل استعمال ريت-أفيت.

استشر طبيباً قبل دهن أدوية أخرى مخصصة للجلد خلال فترة استعمال ريت-أفيت.

لا يجوز استعمال ريت-أفيت إذا كنت حاملاً، قد تكون حاملاً أو تحملندة للحمل، يجب استشارة الطبيب للحصول على معلومات إضافية.

إذا كنت مريضاً، فاغسل طبيبك قبل الداء بالعلاج بريت-أفيت قد تستطبغ عن أدوية أخرى (طبيبك أن هناك حاجة إلى ذلك).

3. معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يجري ريت-أفيت جل على Butylated hydroxytoluene (E321)

نشرة طبية للمستهلك بوجوب انتظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986
يُمْكِنُ هَذَا الدَّوَاءُ بِحَسْبِ وَصَفَةِ طَبِيبٍ فَقَطْ

ريت-أفيت كريم 0.025% - 0.05%
ريت-أفيت جل 0.025% - 0.05%
يجري ريت-أفيت على: تريتينون 0.025%، Tretinoin 0.05%， Tretinoin 0.05%， معايير قافية المادة غير الفاعلة ومستحبات الحساسية في المستحضر

- نظر البند 6 "معلومات إضافية" والبند "معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء".

اقرأ المنشة بياكله حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء، حتى هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلنة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

وقد وصف هذه الدواء من أجله. لا تطعمه الآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حاليتهم الطبية متابهة.

1. لأي غرض مخصوص هذا الدواء؟
Acne Vulgaris.

الفصيلة العلاجية: ينتهي إلى فصيلة الريتينيدات المستعملة لعلاج حب الشباب الموضعي (مفتوق في فيتامين A).

2. قبل استعمال الدواء
لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (رجيجاً) للمرة الفعلة أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء، إذا شاتاً ليك ر - فعل تحسسي على استعمال ريت-أفيت لأطول مدة، فلا تستعمله ثانية.

اصيبت أنت أو أصيبي أحد أفراد عائلتك بسرطان الجلد.

كنت تعاني من الريكتيزيا - جلد ملتهب، جاف، مثير للحكمة، مفترق ومفترض، إذا شعرت بأحد هذه الأعراض، فకلم الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

كنت تعاني من الغلوردي (acne rosacea) - مما قد يسبب الإحصار في الجبهة، الخدين، والذقن.

كنت تعاني من التهاب الجلد المحيط بالائم (perioral dermatitis).

كنت حماملاً أو تحملندة للحمل.

كنت تعاني من حرق مصمسي أو من جلد ممزوج، مثير للحكة ومتقرض - فلا يجوز استعمال ريت-أفيت في هذه المناطق إلى أن تتعافى بشكل تام.

4. الأعراض الجانبية:

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال ريت-أفيت إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تتعارى من أي واحد منها.

يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

- أعراض حادة.
- حروصات أو جب جانبيه.
- انتفاخ الجلد، شعور بالدالع فيه.
- أعراض جانبية أخرى
- أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر عند 10-15% من المستعملين من بين 100:
- أحمرار، تقرن، قصور جلدية وقد ينتفخ الجلد.
- جلد جاف، متغير للكحة.
- شعور بالسخونة أو شعور بالدالع في الجلد.
- مفعج جلدي.
- الم أو شعور بالوالع.
- تغيرات مؤقتة (إرداد أو انفاض) في تصبغ الجلد.
- أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر عند 1-10% من المستعملين من بين 1,000:
- تهيج في العين وانتفاخ.
- حروصات وجبل جانبيه.
- أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر عند أقل من 10.000 من المستعمل واحد من بين 10,000:
- يلغى على حساسية (ارجح) الجلد نتيجة لاملاسته لأدوية تحتوي على تريتينون.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم تذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية عن طريق الموقع الإلكتروني "www.health.gov.il" والذي يوجه إلى الاستئناف المتصلة للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امتنع تماماً عن تخزين أي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد / أو الأطفال الرضيع ومحال رؤيتيهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبّب التقيّد بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزينه في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

صالح للاستعمال لمدة شهرين كحد أقصى منذ يوم فتحه.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الكعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

ريت-أفيت كريم:

Oleic acid decylester, Cetostearyl alcohol, Glycerol monostearate SE, Sorbitol solution 70%, Cetomacrogol 1000, Lanolin anhydrous, Dimethicone 350, Sorbic acid, Butylated hydroxytoluene (BHT), Potassium sorbate, Purified water.

