

עלון לצרכן לפי תקנות הרווקים (תקנישרים) התקנים' 1986

androgin 50 מ"ג גל'

חומר פעיל ומונע: טסטוסטרון 1% (50 mg/5 g)

לרורידים מתומרים בעלי אנטו-טסטוסטרון - ראה סעיף 6.

קרב. בעין את העין עד סופו ברום תשמש

תפקידם. עלון זה מיל מיד תמצית על התווך.

אם שמי לא תאפשר עברון כוונת, פוחת כל-

התווך זו תרופה או לא הרקם.

התרופה זו נרשה עברון, אבל תעלת אורה לא-

התרופה אינה מיועדת לשימוש נשים.

ליג. 18.

התווך איןנה מיועדת לתינוקות ולילדים מותחת

1. **למה מיועדת התווך?**

חומר פעיל המושתת באנדרוגיל הולוי במרקם של

קבוצה רופשית: אנדרגנים.

2. **לפי שימוש בתווך**

אין להשתמש בתווך אם:

• דודעה והשאות להסתוטרין או כל אחד מהרכיבים הנוגדים אשר מכילה התווך
(ראה סעיף 6).

• קיימת אבחנה או קיים חד לסרטן העורוני או סרטן השד.

3. **לאומל' לשימוש בתווך באנדרוגיל 50 מ"ג:**

• בלבד, כיון שאין אליו ימיד קליני זמין בילדים

מתוחת גל' 18.

• בנשים, בשל הסיכון להתקפות סמנים

גרביון-טוטראידים (נוגד) דלקת).

4. **הארות נספנות**

• הנך סובל ממיוגינה או או אפליפסיה. יש

להשתמש בזיהירות כיון שהוא עלול להחמיר

מצבים אלו.

• הנך יכול מלחץ דם לחץ דם, כיון טסטוסטרון

ברחמות לזרועות לחץ דם, בכד או כליות חמורא.

• הנך יכול מלחץ דם לחץ דם, כיון טסטוסטרון

בלוטות העורונית לפיה תחולת טסטוסטרון

בדם ופירופת דם מוג'ה פפי היטול ובולול.

• טיפול חלוף ארך טוח בסטוטרין על גלים

לעתיה חרואה במספר או איז הדם האדרומים

ערוואות וזריפות מוג'ה, עכבר בזיהיר שירה של

העורונית או לסרין העורונית. בהTEAM

להלמת הרופא, שיבצע דלקות דרכות של

לגורום להתקפות סמנים ובאים בלתי רצויים

בעור המפתח. במרקם של מגע עם התכשיש,

כממליח עלה, יש לשופר בקדם הארש.

את האזר שבא ברגע עם הכהשר באחיזות

מים וובן, גם זוגון הרמה, חובה עליה להזג

בהתאמ לאירועים הקשורים למינית מעבר

טסטוסטרון גל.

5. **הנגן שימוש במוגנות**

אלנדרוגיל 50 מ"ג אין השפעה על היכולת לנונג או

להפעיל מוגנות.

6. **עלון לצרכן לפי השיעון**

אין להציג קבילה טסטוטרין או מילריה

בקבוצה ג' נספנותם של מילריה.

7. **עלון לצרכן לפי השיעון**

את החומר הפעיל טסטוטרין אשר עלול להציג

לא את המין.

הן סובל או סבל בעבר מבעיות בקשר

הדם.

טסטוטרין (אצב' של חומר תקינות בקשר

הדם, המעלת את הסיכון לטרומבויז'

(פקתקת) - קרישים בכל דם).

• גורמי המבקרים את הסיכון לרשליש

בורדים: קרישים בודדים בערב, עשוין,

צער (תחת לגיל 50) (ברגל, בריאה או בלב)

טסטוטרין) למריחה עם בום, בזמן קבע, רצוי

אחר אל אדם בשפחתו קרבבה, גל (כל

שמדנקין).

כיצד ליהז קריש דם: נפוחות כואבת באחת הרגליים

או שיבוי תאי תאים נפוחים כוחו, אולם

בליתו מושבר שעלול לווית דמי או כאב חזה פאומי,

חוותה שופר או חרומה מפוזרת בלבן,

אובדן איזה פטאטי. יש לנפוץ מיל' לקבילה טיפול

רפואים אם אתה כוחה אנד התחסמים הללו.

1. **לפני השימוש בתווך?**

לאראש את החרופים ההורמוניים ואנדראג'יל

מדידת רמת ההורמון טסטוטרין בדם באמצעות

2. **ב kidn'ת המתבצעת בזיהירות**

אם אתה לך, או אם לךת לאחרונה, תרופה

אחותות כל רופאות לא רופאות וטסוטרין,

שלהמתניתן לפחות 3-5 דקות עד שהגל' תיבש וצ'

ונתן להתלבש.

יש שיטות גדייה ובכובית צמיהת שיער בגוף וא'

פינים.

3. **ב kidn'ת המתבצעת בזיהירות**

רצוי להטמי להטמי תפה שעא את בי' זמן מריחת הגל'

לבין' כחזה באמבטיה או מחלת

4. **אנטוציאטיקות/גונוגון בין תרופה**

אם נסגה של איזה רופאות לא רופאות וטסוטרין,

מסות מוג'ה (מוחת פטה). צויהה או יפ'ות,

ירידה בחשך המין, חוכר' יכולת להגע לדיוקפה

או לשמרו על זקופה וכו').

5. **לאומל' לשימוש בתווך באנדרוגיל 50 מ"ג:**

• בלבד, כיון שאין אליו ימיד קליני זמין בילדים

מתוחת גל' 18.

• בנשים, בשל הסיכון להתקפות סמנים

גרביון-טוטראידים (נוגד) דלקת.

6. **הארות נספנות**

• הנך סובל ממיוגינה או או אפליפסיה. יש

להשתמש בזיהירות כיון שהוא עלול להחמיר

מצבים אלו.

• הנך יכול מלחץ דם לחץ דם, בכד או כליות חמורא.

• הנך יכול מלחץ דם לחץ דם, כיון טסטוטרון

בלוטות העורונית לפיה תחולת טסטוטרון

בדם ופירופת דם מוג'ה פפי היטול ובולול.

• טיפול חלוף ארך טוח בסטוטרין על גלים

לעתיה חרואה במספר או איז הדם האדרומים

ערוואות וזריפות מוג'ה, עכבר בזיהיר שירה של

העורונית או לסרין העורונית. בהTEAM

להלמת הרופא, שיבצע דלקות דרכות של

לגורום להתקפות סמנים ובאים בלתי רצויים

בעור המפתח. במרקם של מגע עם התכשיש,

כממליח עלה, יש לשופר בקדם הארש.

את האזר שבא ברגע עם הכהשר באחיזות

מים וובן, גם זוגון הרמה, חובה עליה להזג

בהתאמ לאירועים הקשורים למינית מעבר

טסטוטרון גל.

7. **הנגן שימוש במוגנות**

אלנדרוגיל 50 מ"ג אין השפעה על היכולת לנונג או

להפעיל מוגנות.

8. **עלון לצרכן לפי השיעון**

אין להציג קבילה טסטוטרין או מילריה

בקבוצה ג' נספנותם של מילריה.

9. **עלון לצרכן לפי השיעון**

את החומר הפעיל טסטוטרין אשר עלול להציג

לא את המין.

10. **הנך סובל או סבל בעבר מבעיות בקשר**

הדם.

טסטוטרין (אצב' של חומר תקינות בקשר

הדם, המעלת את הסיכון לטרומבויז'

(פקתקת) - קרישים בכל דם).

• גורמי המבקרים את הסיכון לרשליש

בורדים: קרישים בודדים בערב, עשוין,

צער (תחת לגיל 50) (ברגל, בריאה או בלב)

טסטוטרין) למריחה עם בום, בזמן קבע, רצוי

אחר אל אדם בשפחתו קרבבה, גל (כל

שמדנקין).

כיצד ליהז קריש דם: נפוחות כואבת באחת הרגליים

או שיבוי תאי תאים נפוחים כוחו, אולם

בליתו מושבר שעלול לווית דמי או כאב חזה פאומי,

חוותה שופר או חרומה מפוזרת בלבן,

אובדן איזה פטאטי. יש לנפוץ מיל' לקבילה טיפול

רפואים אם אתה כוחה אנד התחסמים הללו.

1. **למה מיועדת התווך?**

ואו כחון ההורמוניים אנדראג'יל הולוי במרקם של

קבוצה רופשית: אנדרגנים.

2. **לפי שימוש בתווך**

אין להשתמש בתווך אם:

• דודעה והשאות להסתוטרין או כל אחד מהרכיבים הנוגדים אשר מכילה התווך
(ראה סעיף 6).

• קיימת אבחנה או קיים חד לסרטן העורוני או סרטן השד.

3. **לאומל' לשימוש בתווך באנדרוגיל 50 מ"ג:**

• בלבד, כיון שאין אליו ימיד קליני זמין בילדים

מתוחת גל' 18.

• בנשים, בשל הסיכון להתקפות סמנים

גרביון-טוטראידים (נוגד) דלקת.

4. **הארות נספנות**

• הנך סובל ממיוגינה או או אפליפסיה. יש

להשתמש בזיהירות כיון שהוא עלול להחמיר

מצבים אלו.

• הנך יכול מלחץ דם לחץ דם, בכד או כליות חמורא.

• הנך יכול מלחץ דם לחץ דם, כיון טסטוטרון

בלוטות העורונית לפיה תחולת טסטוטרון

בדם ופירופת דם מוג'ה פפי היטול ובולול.

• טיפול חלוף ארך טוח בסטוטרין על גלים

לעתיה חרואה במספר או איז הדם האדרומים

ערוואות וזריפות מוג'ה, עכבר בזיהיר שירה של

העורונית או לסרין העורונית. בהTEAM

להלמת הרופא, שיבצע דלקות דרכות של

לגורום להתקפות סמנים ובאים בלתי רצויים

בעור המפתח. במרקם של מגע עם התכשיש,

כממליח עלה, יש לשופר בקדם הארש.

את האזר שבא ברגע עם הכהשר באחיזות

מים וובן, גם זוגון הרמה, חובה עליה להזג

בהתאמ לאירועים הקשורים למינית מעבר

טסטוטרון גל.

5. **הנגן שימוש במוגנות**

אלנדרוגיל 50 מ"ג אין השפעה על היכולת לנונג או

להפעיל מוגנות.

6. **עלון לצרכן לפי השיעון**

אין להציג קבילה טסטוטרין או מילריה

בקבוצה ג' נספנותם של מילריה.

7. **עלון לצרכן לפי השיעון**

את החומר הפעיל טסטוטרין אשר עלול להציג

לא את המין.

8. **הנך סובל או סבל בעבר מבעיות בקשר**

הדם.

טסטוטרין (אצב' של חומר תקינות בקשר

הדם, המעלת את הסיכון לטרומבויז'

(פקתקת) - קרישים בכל דם).

• גורמי המבקרים את הסיכון לרשליש

בורדים: קרישים בודדים בערב, עשוין,

צער (תחת לגיל 50) (ברגל, בריאה או בלב)

טסטוטרין) למריחה עם בום, בזמן קבע, רצוי

אחר אל אדם בשפחתו קרבבה, גל (כל

שמדנקין).

כיצד ליהז קריש דם: נפוחות כואבת באחת הרגליים

או שיבוי תאי תאים נפוחים כוחו, אולם

בליתו מושבר שעלול לווית דמי או כאב חזה פאומי,

חוותה שופר או חרומה מפוזרת בלבן,

אובדן איזה פטאטי. יש לנפוץ מיל' לקבילה טיפול

רפואים אם אתה כוחה אנד התחסמים הללו.

9. **הנך סובל או סבל בעבר מבעיות בקשר**

הדם.

טסטוטרין (אצב' של חומר תקינות בקשר

הדם, המעלת את הסיכון לטרומבויז'

(פקתקת) - קרישים בכל דם).

• גורמי המבקרים את הסיכון לרשליש

בורדים: קרישים בודדים בערב, עשוין,

צער (תחת לגיל 50) (ברגל, בריאה או בלב)

טסטוטרין) למריחה עם בום, בזמן קבע, רצוי

אחר אל אדם בשפחתו קרבבה, גל (כל

שמדנקין).

כיצד ליהז קריש דם: נפוחות כואבת באחת הרגליים

או שיבוי תאי תאים נפוחים כוחו, אולם

בליתו מושבר שעלול לווית דמי או כאב חזה פאומי,

חוותה שופר או חרומה מפוזרת בלבן,

אובדן איזה פטאטי. יש לנפוץ מיל' לקבילה טיפול

רפואים אם אתה כוחה אנד התחסמים הללו.

10. **הנך סובל או סבל בעבר מבעיות בקשר**

הדם.

טסטוטרין (אצב' של חומר תקינות בקשר

הדם, המעלת את הסיכון לטרומבויז'

(פקתקת) - קרישים בכל דם).

• גורמי המבקרים את הסיכון לרשליש

בורדים: קרישים בודדים בערב, עשוין,

צער (תחת לגיל 50) (ברגל, בריאה או בלב)

טסטוטרין) למריחה עם בום, בזמן קבע, רצוי

אחר אל אדם בשפחתו קרבבה, גל (כל

שמדנקין).

כיצד ליהז קריש דם: נפוחות כואבת באחת הרגליים

או שיבוי תאי תאים נפוחים כוחו, אולם

בליתו מושבר שעלול לווית דמי או כאב חזה פאומי,

חוותה שופר או חרומה מפוזרת בלבן,

אובדן איזה פטאטי. יש לנפוץ מיל' לקבילה טיפול

רפואים אם אתה כוחה אנד התחסמים הללו.

11. **הנך סובל או סבל בעבר מבעיות בקשר**

הדם.

טסטוטרין (אצב' של חומר תקינות בקשר

הדם, המעלת את הסיכון לטרומבויז'

(פקתקת) - קרישים בכל דם).

• גורמי המבקרים את הסיכון לרשליש

בורדים: קרישים בודדים בערב, עשוין,

צער (תחת לגיל 50) (ברגל, בריאה או בלב)

טסטוטרין) למריחה עם בום, בזמן קבע, רצוי

אחר אל אדם בשפחתו קרבבה, גל (כל

שמדנקין).

כיצד ליהז קריש דם: נפוחות כואבת באחת הרגליים

או שיבוי תאי תאים נפוחים כוח