

5) איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראיתם של ילדים / או תינוקות ועל-ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרמי להקה לאלה הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על-גביו האריזה.
- תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו החודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C .

6) מידע נוספת

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם חומרים בלתי פעילים.

כל טבליה כתומה מכילה את החומרים הבלווים הבאים:
Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Croscarmellose sodium, Hydroxypropylcellulose 5 cP, Magnesium stearate, Lacquer orange or alternatively: Hypromellose 5 cP, Macrogol 6000, Talc, Titanium dioxide, Ferric oxide yellow, Ferric oxide red

כל טבליה בצעב כתום בהיר מכילה את החומרים הבלווים הבאים:

Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Croscarmellose sodium, Hydroxypropylcellulose 5 cP, Magnesium stearate, Lacquer light orange or alternatively: Hypromellose 5 cP, Macrogol 6000, Talc, Titanium dioxide, Ferric oxide red, Ferric oxide yellow

כל טבליה כתומה מכילה 45.32 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כל טבליה בצעב כתום בהיר מכילה 48.35 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

• כיצד ניתן התרופה ומה תווך הארזיה:

כל חפיסת של סימן פלאס מכילה 21 טבליות כתומות ו-7 טבליות בצעב כתום בהיר.
הטבליות כתומות מצופות, עגולות וקモרות. על צידן האחיד מוטבע הסימן "+Y" בתווך משושה.
הטבליות שצבען כתום בהיר מצופות, עגולות וקモרות. על צידן האחיד מוטבע הסימן
"M+" בתווך משושה.

הטבליות משוקחות במגשיות (בליסטרים) באזיות של 1, 28X3, 28X6, 28X12 טבליות.
יתוך שלא כל גודלי האזיות משוקחים.

• בעל הרישום וכותבותו: באיר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 4527702.

• שם היצwan וכותבתו: באיר א.ג., ברלין, גרמניה.

• נערך באוגוסט 2020.

• מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 152-83-33906-00

- ocab ראש או מיגרנה
- שינויים במצב הרוח
- תסמנות קדם וסתות
- תופעות לוואי בפרק מל קלות וחולפות עם הזמן.
- אקנה
- רירידה בחשך המני
- נפיחות או אכזרית נזולים
- הופעת כתמים כהים על העור, בייחוד על הפנים
- רמות גבוהות של סוכר בدم, בייחוד במקרים הסובלים מסוכרת
- דיכאון, בייחוד אם סבלת בעבר מודיכאון. פוי לרופא מיד אם יש לך מחשבות כלשהן על פגעה עצמאית
- אי סובלות לעדשות מגע
- Shininim במשקל הגוף

מידע שנapeake לאחר התחלת השימוש:

תופעות הלואין שלhalbן, נצפו לאחר התחלת השימוש של גלולהஅחרת למניעת הירון המכילה את אותם הורמוניים כמו יסמין פלאס. לא ניתן להעיר את שכיחותן או לקבוע אם נובעת מנטילת התרופה:

תופעות הקשות בהפרעות בכלי הדם: קריישי דם בעורק או בוריד (כולל תסחיף ריאתי, פקקת ורידים عمוקה, פקקת תוך לבבית, פקקת תוך גולגולתיים או תוך מוחיים, חסימה בווריד הרשתית, התקף לב או שבץ מוחי), יתר לחץ דם

תופעות הקשות בהפרעות בכבד ובמערכת המרה: מחלה של כיס המרה

תופעות הקשות בהפרעות במינרלים החיסוניים: גבישות יתר

תופעות הקשות בהפרעות בחילוף החומרים ובתזונה: יתר אשلغן בדם (היפרקלאלמיה)

תופעות הקשות בהפרעות בעור וברקמות תע-עוריות: כלואדמה

זהו אינה רשימה מלאה של תופעות הלואין.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתיעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות

לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)

המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>