

چيلينيا® 0.5 ملغ

كبسولات قاسية

المادة الفعالة

تحتوي كل كبسولة على: فينوجوليمود (ـ هيدروكلوريد) 0.5 ملг
Fingolimod (as hydrochloride) 0.5 mg

المواد غير الفعالة:

أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

تناول الجرعة الدوائية الأولى:

بعد تناول الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا يتطلب الأمر الخضوع لمراقبة من قبل فرد من الطاقم الطبي لمدة ست ساعات على الأقل. هذه التوصية ملائمة أيضاً حتى في حال بدأت العلاج مجدداً بعد التوقف عن العلاج بـ چيلينيا.

التعليمات الكاملة حول تناول الجرعة الدوائية الأولى مفصلة في فقرة «تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء».

1) لأي غرض مخصوص الدواء؟

چيلينيا مخصوص لمعالجة الأشكال النوبية لمرض التصلب المتعدد، لتقليل عدد النوبات وإبطاء تطور مشاكل جسدية (اعاقة) ناجمة عن المرض.

الفصيلة العلاجية: مثبط إنتقائي لجهاز المناعة
منظم للمستقبل سفينپوزين 1- فوسفات**ما هو مرض التصلب المتعدد؟**

التصلب المتعدد هو عبارة عن مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والجبل الشوكي. إن المسيرة الإلتاهيبية في مرض التصلب المتعدد تختلف الفلاف الحامي (المسمى الناخعين) الموجود حول الأعصاب في الجهاز العصبي المركزي وتمنع النشاط العادي للأعصاب تماماً عند إنتهاء النوبة لكن مشاكل معينة قد تبقى.

كيف يعمل چيلينيا؟

يساعد چيلينيا على حماية الجهاز العصبي المركزي من مهاجمة جهاز المناعة في الجسم وذلك عن طريق خفض قدرة خلايا دم بيضاء مميزة (خلايا الليمفافية) من التحرك بحرية في الجسم ومنعها من الوصول إلى الدماغ والجبل الشوكي. هذا الأمر يهدى من الضرر الحاصل للأعصاب الناجم عن مرض التصلب المتعدد. تقلل چيلينيا أيضاً قسم من رد الفعل المناعي للجسم.

2) قبل إستعمال الدواء**لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**عانيت من نوبة قلبية، من ذبحة صدرية غير ثابتة (unstable angina).
من سكتة دماغية أو حادث دماغي عابر أو من أنواع معينة من قصور القلب في الأشهر الـ 6 الأخيرة.

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من أنواع معينة لنظم قلب غير منتظم أو غير إعتيادي (إضطرابات في نظم القلب)، بما في ذلك متعالجين لديهم مفعى قلبي بامساك إطاله مقطع QT الذي يمكن ملاحظته في التخطيط الكهربائي للقلب وذلك قبل بدء العلاج بـ چيلينيا.

وحدثت لديك مشكلة في نظم القلب التي تقتضي العلاج بأدوية معينة.
إذا كنت أثيرجي (دليك حساسية مفرطة) لفينوجوليمود أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، المفصلة في الفقرة 6 «معلومات إضافية». أعراض رد الفعل التحسسي قد تشمل: طفح، شرى حاك (hives) أو إنتفاخ الشفتين، اللسان أو الوجه.

تحدث مع طبيبك قبل أن تتناول چيلينيا إذا وجدت لديك إحدى تلك الحالات أو إذا لم تكن تعلم بوجودها لديك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

يمكن أن يؤدي چيلينيا إلى تباطؤ نظم القلب لديك، خاصة بعد تناولك للجرعة الدوائية الأولى. ستخضع لفحص يسمى التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) لفحص النشاط الكهربائي للقلب قبل تناول الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا.

يبقى كافة المتعالجين تحت إشراف فرد من الطاقم الطبي لمدة 6 ساعات على الأقل بعد تناول الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا.

بعد تناولك الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا:

ـ يجب فحص النبض وضغط الدم لديك كل ساعة

ـ عليك أن تكون تحت مراقبة فرد من الطاقم الطبي من أجل رؤية فيما إذا توجد لديك أي أعراض جانبية جديدة. إذا تباطأ نظم قلب أكثر مما ينبغي، فمن الجائز أن يكون لديك أعراضًا مثل:

- ٥ دوار
- ٥ إرهاق
- ٥ الشعور وكأن قلب ينبعض ببطء أو يُقصِّ نبضات
- ٥ آلم في الصدر

- إذا وجد لديك واحد أو أكثر من أعراض تباطؤ نظم القلب، فهي عادة تحدث خلال الـ 6 ساعات الأولى بعد تناول الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا. يمكن أن تحدث الأعراض حتى 24 ساعة بعد تناولك الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا.

- 6 ساعات بعد تناولك الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا، ستخضع لفحص تخطيط كهربائي إضافي للقلب إذا بين التخطيط الكهربائي للقلب آية مشاكل في القلب أو إذا ما زال نظم قلبك أخفقاً من اللازم أو مستمر في الإنخفاض، فستبقى تحت المراقبة.

- إذا وجدت لديك آية أعراض جانبية جديدة بعد تناول الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا، خاصة تلك التي تتطلب علاجاً بأدوية أخرى، فستمكث في المركز الطبي للمراقبة طوال الليل. بالإضافة، ستخضع للمراقبة لمدة 6 ساعات على الأقل بشأن آية أعراض جانبية جديدة وذلك بعد تناولك الجرعة الدوائية الثانية من چيلينيا في اليوم التالي.

- إذا وجدت لديك أنواع معينة من مشاكل القلب، أو إذا كنت تتناول أنواعاً معينة من الأدوية التي يمكن أن تؤثر على قلبك، فستبقى في المركز الطبي تحت مراقبة فرد من الطاقم الطبي طوال الليل بعد تناول الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا.

كفيوكوتازول - دواء لعلاج التلوثات الفطرية. متلاعج يستعمل چيلينيا وكيوكوتازول بالتزامن يجب أن يكون تحت متابعة حثيثة لأن خطرة حدوث أعراض جانبية تكون أكبر.

لقد احات - إذا كنت تتوى لتفقي لفاحاً، توجه أولاً للتقي إستشاراة من طبيبك. خلال العلاج وحتى شهرين بعد العلاج بـ چيلينيا، ان تستطيع تلفقي لحالات معينة تحتوى على ثيوروس حي (الحالات مضيفة حية) لأنها قد تؤدي إلى حدوث تلوث الذي من المفترض أن يمنعه اللقاح. أيضاً لحالات أخرى قد لا تتم إعطاؤها خلال هذه الفترة.

أدوية مضادة للأورام، أدوية كابحة أو منتظمة لجهاز المناعة (تشمل كورتيكosteroides) - من المتوقع أن تزيد من خطورة تثبيط جهاز المناعة ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار خطورة التأثير الإضافي على جهاز المناعة إذا أعطيت هذه الأدوية سوية مع چيلينيا. عندما يتم تبديل العلاج من أدوية ذات تأثير متواصل على جهاز المناعة مثل ناتاليزوماب، تيريفالونوميد أو ميتوكسانترون، يجب الأخذ بعين الاعتبار المادة الزمنية وطريقة عمل هذه الأدوية لتجنب حدوث تأثير إضافي وغير متعدد لتشبيط مناعي عند البدء بـ چيلينيا.

أدوية تبطئ نظم القلب والتوصيل الأذيني - البطيني مثل حاجيات-بيتا، ديجوكسين أو حاجيات قنوات الكالسيوم مثل ديلتيازم أو فيرياميل. قبل البدء العلاج بـ چيلينيا، يجب إستشارة الطبيب الذي وصف لك هذه الأدوية حول إمكانية تبديلها بأدوية لا تبطئ نظم القلب والتوصيل الأذيني-البطيني.

استعمال چيلينيا والطعام
بالإمكان تناول چيلينيا مع الطعام أو بدونه.

الحمل والإرضاع
يجب إبلاغ طبيبك قبل تناول چيلينيا، إذا كنت في فترة الحمل أو تخططين لحصول حمل.

قد يلحق چيلينيا ضرر بجنينك.
إحكى طبيبك حالاً إذا أصبحت حاملأً خلال فترة العلاج بـ چيلينيا أو إذا أصبحت حاملأً خلال شهرين منذ التوقف عن العلاج بـ چيلينيا.

- عليك التوقف عن تناول چيلينيا شهرين قبل محاولتك للحمل.
إذا كان بإمكانك أن تصبحي حاملة، فعليك إستعمال وسيلة منع الحمل ناجعة خلال فترة العلاج بـ چيلينيا ولمدة شهرين على الأقل بعد التوقف عن العلاج.

يجب إبلاغ طبيبك قبل تناول چيلينيا إذا كنت مرضعة أو إذا كنت تخططين للإرضاع.
لا يُعرف فيما إذا كان چيلينيا ينتقل إلى حليب الأم، إستشيري طبيبك بخصوص الطريقة الأفضل لإطعام رضيعك إذا كنت تتناولين چيلينيا.

السيادة وإستعمال الماكولات
يبلغ الطبيب إذا كان مرضك يسمح لك بسيادة المركبة، بما في ذلك ركوب الدراجات وإستعمال الماكولات بشكل آمن. من غير المتوقع أن يؤثر چيلينيا على قدرتك على السيادة وإستعمال الماكولات.

مع ذلك، بعد تناول الجرعة الدوائية الأولى من چيلينيا، عليك المكوث لمدة 6 ساعات على الأقل تحت مراقبة فرد من الطاقم الطبي. خلال هذا الوقت ومن الممكن حتى بعد ذلك، قد يكون هناك خلل في قدرتك على السيادة وإستعمال الماكولات.

3) كيفية إستعمال الدواء؟
يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.
عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية
الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:

ـ كبسولة واحدة في اليوم (0.5 ملغ فينوجوليمود).
ـ لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

