



ליפטופות מוקוליט 75 מ"ג/מ"ל

טיפות בליעה

החומר הפעיל וריכוזו:

קרבוציסטאין 75 mg/ml Carbocysteine
כל טיפה מכילה 5 מ"ג קרבוציסטאין.

חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר - ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך השתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המיון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.
טיפות מוקוליט מיועד במיוחד לילדים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה בהפרעות במערכת הנשימה המלוות בליחה מוגברת ו/או צמיחה.

קבוצה תרופית: מכיחים.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- הילד מתחת לגיל שנתיים.
- ידועה רגישות (אלרגיה) לקרבוציסטאין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- הסמינים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות נשימה או בליעה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון. במקרה של כוב בקיבה או במעי.

⚠ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בטיפות מוקוליט, ספר לרופא אם:

- הילד סבל בעבר מכיב בקיבה או במעי

⚠ אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם הילד לוקח, או אם לקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם הילד לוקח:

- תרופות אחרות שעלולות לגרום לדימום בקיבה

- הריגין, הנקה ופוריות:

טיפות מוקוליט מיועד במיוחד לילדים. אם הינך מבוגרת המשתמשת בתרופה, אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ

ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון, עשויה להיות בהריון, מתכנת להיכנס להריון, מניקה או מתכנת להניק.

השימוש במוקוליט אינו מומלץ בהריון ובהנקה.

⚠ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

כל 1 מ"ל תרופה מכיל 280 מ"ג סורביטול השווים ל-18.7 מ"ג סורביטול בכל טיפה. סורביטול הוא מקור לפרוקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיליד יש אי סבילות לסוכרים מסוימים או שאובחן עם אי סבילות תורשתית לפרוקטוז, הפרעה גנטית נדירה בה אדם אינו יכול לפרק לפרוקטוז, היוועץ ברופא לפני מתן התרופה.

סורביטול עלול לגרום לחוסר נוחות במערכת העיכול ולשלשול.

כל 1 מ"ל תרופה מכיל כ-15 מ"ג נתרן (סודיום) השווים ל 0.75% מהצריכה היומית המרבית המומלצת במבוגרים.

התכשיר מכיל פרבנים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית (אפילו לאחר זמן).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

גיל התופל	מנה בטיפות	מספר מנות מקסימלי
2-5 שנים	12-25 טיפות	4 פעמים ביממה
6-12 שנים	50 טיפות	3 פעמים ביממה

מינון מקובל לילדים ע"פ משקל:

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי. לכן מומלץ לקבוע את המינון לפי המשקל ע"פ התחשיב שלהלן.

4-5 טיפות (20-25 מ"ג) לק"ג משקל גוף ליום.

יש לחלק את המנה הכוללת לשלושה עד ארבעה מתנים ביום, בהתאם לגיל, כפי שמפורט בטבלת המינונים.

אין לעבור על המנה המומלצת

משך הטיפול:

אם לא חל שיפור במצב תוך 7 ימים יש לפנות לרופא. אולם במידה וחלה החמרה במהלך הטיפול יש לפנות לרופא לפני תום 7 ימי הטיפול.

שים לב: יש להקפיד על מדידת המנה הנכונה בטפטפת.

אופן השימוש:

1. אין לנער את התרופה לפני השימוש - הניעור מקשה על יציאת הטיפות דרך הטפטפת.
2. אין להחליף את הטפטפת המקורית באחרת מאחר והיא מכילה להוצאת כמות מדודה ומדויקת בכל שימוש.
3. פתח את הפקק על ידי לחיצה כלפי מטה וסיבוב נגד כיוון השעון בזמנית (ראה איור 1).
4. החזק את הבקבוק בצורה אנכית מעל הכפית וחכה לטפטוף (ראה איור 2).
5. אם הטיפול לא יוצאות, יש לטפוח בעדינות על תחתית הבקבוק (ראה איור 3).
6. ספור את הטיפות במדויק.

7. שפוך את תכולת הכפית המדודה לפה המטופל.
אין לטפטף את התרופה ישירות מהבקבוק לפה!

8. נגב את ראש הבקבוק (הטפטפת). הקפד לסגור היטב את הפקק מיד בתום השימוש על מנת למנוע סתימת הטפטפת.

אם הילד נטל בטעות מינון גבוה יותר הוא עלול לסבול מקלקול קיבה (הפרעות במערכת העיכול).

אם הילד נטל מנת יתר או אם בטעות בלע ידן מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לתת את התרופה בזמן הדרוש, אין לתת מנה כפולה. תן את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תהויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בטיפות מוקוליט עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות לוואי. ייתכן שהילד אי סובל מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים במקרים הבאים:

- תגובה אלרגית. הסימנים כוללים: פריחה, בעיות נשימה או בליעה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.
- שלפוחיות או דימום על העור, כולל סביב השפתיים, העיניים, הפה, האף ואיברי המין. ייתכן שתופעות אלו יהיו מלוות בתסמינים דמויי שפעת וחום - אלו עלולים להצביע על תסמונת סטיבנס ג'ונסון (Stevens-Johnson syndrome).
- הקאה דמית, צואה שחורה כזפת.

יש לידע את הרופא או הרוקח אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מחמירה או נמשכת מעבר למספר ימים:

- בחילה או הקאה
- שלשול
- כאב בטן

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס הדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש בטיפות מוקוליט במשך חודשיים.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Sorbitol Solution 70%, Sodium Carbonate Decahydrate, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Methyl Hydroxybenzoate, Cream Essence, Saccharin Sodium, Sodium Propyl Hydroxybenzoate, Disodium Edetate, Purified Water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוק זכוכית המכיל 15 מ"ל נוזל צבעו צהוב-חום בטעם קרמל. **שם היצרן/בעל הרישום וכתובתו:** כצטענעשיות כימיות בע"מ, רחוב הקדמה 3, קרית מלאכי.

עלון זה נערך בתאריך 01/2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1225430239

לשם הפשטות ולקלות הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

