

# تيبيتيلوت موكوليت

## 75 مل/مل

### قطرات للبلع



المادة الفعالة وتراكزها:

**Carbocysteine 75 mg قطرة على 5 مل كاربوبسيتين.**

تحتوي كل قطرة على 5 مل كاربوبسيتين.

العلمية الماء غير الفعالة ومسننات الأرجنة في المستحضر - انظر البند

اقرأ النشرة يامانع حتى نهايتها قبل استعماله للدواء. تحتوي هذه النشرة على

معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفر لديك أسلمة إضافية، فراجع الطبيب

أو الصيدلي.

الدواء غير مخصص للأولاد الذين عمرهم أقل من عامين. إذا كان العمر أقل

من ذلك فيجب التوجه إلى الطبيب. يتوجب عليك استعمال المستحضر وفقاً

لتوجيهات المذكورة في بدء الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا

كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يتوجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت

أعراض المرض أو لم تتحسن بعد أيام.

تبيتيلوت موكوليت مخصوص للأولاد بشكل خاص.

### 1. لأى غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصوص للتخفيف من اضطرابات الجهاز التنفسى المصحوبة بالبلغم

المترافق وأو الزلق.

الفصل العلاجية: المقصّعات

### 2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كان عمر الولد أقل من عامين.

• غم بوجود حساسية (ergicية) لكاربوبسيتين أو لأى من المركيبات

الأخرى التي تحتوي عليها الدواء (انظر البند 6). علامات ردة فعل

الحساسية تتضمن: طفحًا جلديًا، مشاكل في التنفس أو الابتلاع، انتفاخ

الشققين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

• في حال وجود فرحة في المعدة أو في الأمعاء.

### 3. تدابير خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج يتبيتيلوت موكوليت، آخر الطبيب إذا:

• على الولد في الماضي من فرحة في المعدة أو الأمعاء

### 4. المفاعلات بين الأدوية:

إذا كان الولد يستعمل الان، أو قد استعمل مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك

الدوية بدون وصفة طبيب وأصناف غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

خاصة إذا كان الولد يستعمل.

### 5. أدوية أخرى قد تسبب التزيف في المعدة

الحمل، الإرضاع والخصوصية:

تبيتيلوت موكوليت مخصوص للأولاد بشكل خاص. إذا كنت بالغة و تستعملين

الدواء، فلا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا

كنت حاملة، قد تكون حملاً، تقطعن للحمل، مرضيًّا أو تخطلين للإرضاع.

لا يوصى باستعمال موكوليت خلال فترة الحمل والإرضاع.

**٤. معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء:**

يحتوي الدواء على 280 ملغم من السوربيتول في كل 1 مل، الكثافة التي تعادل 18 ملغم من السوربيتول في كل قطرة. السوربيتول عبارة عن مصدر للفروكتوز. إذا أخذت الكثافة من العلامة التجارية معيينة أو بأنه شخص لديه ميول تحمل وراثي للفروكتوز، وهو اضطراب جيني نادر يجعل الشخص غير قادر على تحويل الفروكتوز، واستشر الطبيب جينيًّا قبل إعطاء الدواء. قد يسبب السوربيتول الانزعاج في الجهاز الهضمي والإسهال.

يحتوي الدواء على ما يقارب 15 ملغم من الصوديوم في كل 1 مل، الكثافة التي تعادل 0.75% من الاستهلاك اليومي للأقصى الموصى به للبالغين.

يحتوي المستحضر على بيكربونات التي قد تسبب رد فعل تحسسيًّا حتى بعد فتره (ما).

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متاكداً من الجرعة الدوائية ومن

كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية المنشورة عادة هي:

عدد الجرعات الأقصى	الجرعة بالقطارات	عدد قطرات المثلث العلاج
4 مرات خلال 24 ساعة	5-2 قطرة	5-2 سنوات
3 مرات خلال 24 ساعة	50 قطرة	12-6 سنة

الجرعة الدوائية المنشورة للأولاد بحسب الوزن:

قد تختلف أوزان الأولاد - من نفس السن - بشكل ملحوظ، لذلك يوصى بتحديد

الجرعة الدوائية بحسب الوزن وفق الحساب المبين أدناه.

5-4 قطرات (25-20 ملغم) لكل كغم من وزن الجسم في اليوم.

يجب تقييم الجرعة الكافية إلى ما بين ثالث إلى أربع مرات من الإعطاء في

اليوم، وفقاً للنوع، كما هو مفصل في جدول الجرعات الدوائية.

يمكن تجاوز الجرعة الموصى بها

هذه العلاج:

إذا لم يطرأ تحسن على الوضع خلال 7 أيام فيجب مراجعة الطبيب، لكن إذا

طرأ تدهور أثناء فترة العلاج فيجب مراجعة الطبيب قبل مضي أيام العلاج

الـ 7-8.

**كيفية الاستعمال:**

انتبه: يجب الحرص على قياس الجرعة بالقطارة.

1. لا يجوز خزن الدواء قبل الاستعمال - إذ أن الخزن يصعب خروج

القطارات من العصارة.

2. لا يجوز استبدال المطارة الأصلية بأخرى لأنها معانرة لآخر كثافة مقاسة

و دققة عند كل استعمال.

3. افتح السداد بواسطة الصبغة إلى الأسلق والتثوير بعكس اتجاه عقارب

ال الساعة في نفس الوقت (انظر الرسم التوضيحي 1).

4. أمسك القنية بشكل عمودي فوق الملعقة الصغيرة وانتظر التقشير (انظر الرسم التوضيحي 2).

5. إذا لم تخرج قطرات، فاغلى الفنر بلطف على قاعدة القنية (انظر الرسم التوضيحي 3).

6. عذر قطرات بيضاء.

7. امسك محتوى الملعقة الصغيرة الذي تم قياسه داخل فم مثلثي العلاج.

لا يجوز تقطير الدواء مباهلة من القنية إلى الفم!

8. امسك رأس القنية (القطارة). احرص على إغلاق السداد جيداً فور الانتهاء

من الاستعمال من أجل منع اندثار قطرات.

## ٦. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضًا على:


Sorbitol Solution 70%, Sodium Carbonate Decahydrate, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Methyl Hydroxybenzoate, Cream Essence, Saccharin Sodium, Sodium Propyl Hydroxybenzoate, Disodium Edetate, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قنينة زجاجية تحتوي على 15 مل من السائل الأصفر-البني طعم الكراميل. اسم المصنعة/صاحب الامتياز و عنوانه: ك. صن ط للصناعات الكيميائية، مصر، شارع هكيمها 3، كريات السلام.

تم تحرير هذه النشرة في 01/2021 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.  
رقم تحضير الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:  
1225430239

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.



إذا تناول الولد خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم فقد يعاني من غسر المضم (اضطرابات في الجهاز الهضمي).

إذا تناول الولد جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فنوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عينة الدواء.

إذا نسيت إعطاء الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز إعطاء جرعة مضاعفة. أخطئ الجرعةقادمة في الوقت العادي ولكن لا يجوز تناول الأدوية في كل مرة.

لا تتناول الأدوية في المائة رابع المليصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء، ضد النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أستنة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

## ٤. الأعراض الجانبية:

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال تبقيع موكوليت إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفاقم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا يعاني الولد من أي واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى في الحالات التالية:

• ردة فعل حساسية، تشمل العلامات: فحخاً جلدياً، مشاكل في التنفس أو الابتلاع، انتفاخ الشفرين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

• وضيق أو تزيف على الحلق، شمل منطقة ما حول الشفرين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية. قد تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض شبيهة بالإلتهاف والحمى - قد يشير ذلك إلى شوء متازمة ستيفينز جونسون (Stevens-Johnson syndrome).

• تقيؤ دموي، براز أسود اللون كالقرطران.

• يجب إعالم الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية التالية أو استمر لأكثر من عدة أيام:

• غثيان أو تقيؤ  
• اسهال  
• ألم في البطن

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التالي عن الأعراض الجانبية:  
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط

"التبلغ عن أعراض جانبية بغير العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](https://www.health.gov.il)) والذي يوجه إلى الاستماراة المخصصة للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

## ٥. كيف يجب تخزين الدواء؟

امتنع عن التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عنتناول أيدي الأطفال وأدوات المرض ومحال رؤيتها، وبذلك ستحمّل النسمم. لا تسبّب التفّق بدوره بدوره تعلميات صرحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء الصلاحية (exp.) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

بعد فتح تبقيع موكوليت لأول مرة يمكن استعماله لمدة شهرين.