

טוקוליט 375 mg
טבליות מיצעה בטעם דבש-לימון

החוור הפעיל וכמות:
כל טבליית מיצעה מכילה: קרבוציטיאן בתכשיר ורף. 6

קרא בעין את העלון עד סופו ברום תשמש בתורופה. עלון זה מכיל מדע המרכיבים של התורופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התורופה אינה מיועדת לילדים. עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף הימין בעלון זה. הייעוץ ברוקח אם הנך ذוקם למדע נסוף. עליך לפנות לרופא בשידרה ותוכמי המחלה (סימפטומים) המכרים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיעדרת התורופה?
התורופה מחייבת את צמיגות הליהча ומחייבת. התורופה מיועדת להקלה בהפרעות במערכת הנשימה המליחת בליהча מגברת או צמיגאה.
קבוצה תרופוטית: מכיחסים.

2. לפני שימוש בתורופה:
אין להשתמש בתורופה אם:

- אתה ריש (אלרגי) לקרבוציטיאן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התורופה (ראה פרק 6). הסימנים של תגבור אלרגיות כוללים: פריחה, בעיות נשימה או בליעה, נפיחות של השפתיים, הנ�ים, האגרן או הלשון.
- הנך סובל מפני בקייה או בمعنى.

3. אזהרה מיוחדת הנוגעת לשימוש בתורופה:
לפני היטול במוקוליט, ספר לרופא אם:

- הן מוגבר סבלת בבר מיל בקייה או בمعنى.
- אינטראקטיות/תגובהות בין תרופות:
אם אתה לוקחת אל מרשם ווסמי תזונה, ספר על כך לרופא או תרופות ללא מרשם ווסמי תזונה, ספר על כך לרופא או תרופה אחרת:

במיוחד אם אתה לוקחת:
תרופות אחרות שמשות להקלת קיביה
השימוש במוקוליט ימושך מומלץ בהרionario ובהנחה.

אין להשתמש בתורופה מבלי הייעוץ רפואי לפני התחלת הטיפול אם הנך ברוריין, ושיה יהיה חיון בהרionario, מתכונת להיכנס להרionario, מניקה או מתכוננת להרionario.

4. תופעות לוואי:
כל בצלת התורופה, השימוש במוקוליט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מההשתמשים. לא ניתן למקרה ראשית תופעות הלואין. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

- תגובה אלרגית, הסימנים כוללים: פריחה, בעיות נשימה או בליעה, נפיחות של השפתיים, הנ�ים, הגרון או הלשון,
- שלפוחיות או דם מום על השיניים, נול סכבי השפתיים, העיניים, הפה,
- ה אף וabbyי המין. יתכן שתופעות אלו יהיו מלווה בתסמים דמוני שפעת וחום - אלו עלולים להציג עליון תסמונת הנקרתת המוגברת (Stevens-Johnson syndrome).

5. איך לאחסן את התורופה?
עליך לבדוק עם הרופא או המרחק אם אין ברוחם בגונן ולפניהם מתקובל דבר כלל הוא:
2 טבליות מיצעה אחת, 4 פעמים ביום.
התורופה אינה מיועדת לילדים. ישן צורת מתן אחרות לילדים, לדוגמא: מוקוליט תמייסה למנתן דרך הפה, טיפיפות מוקוליט. אין לעבור על המנה המומולצת.

6. מידע נוספים:
אם אלך שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא. אולם במידה גבוהה חומרה במצבך במהלך הטיפול יש לפנות לרופא לפני תום 7 ימי הטיפול.
אזור הנטילה: את טבליות המיצעה יש למצוץ או לולען.
אם נתלת בעיטה מינון גבוה יותר, אתה עלול לסבול ממלוקול לחם (הפרעות בערכת העיכול).
אם נתלת מנת יתר או אם בעיטה על ילך מן התורופה, פנה מיד לופוף או לחדר מון שב בית חולים והבא אריזת התורופה איתה. אם שכח ליתול את התורופה בין הדושן, אין לטל מונה פולחה. רק את המנה הבאה בין הדושן והוועץ ברופא. אין ליתול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהן גועלות. הרוכב משקפיים אם הנך ذוקם להן.
ונטל התורפה. אם ש לאלו נסופות בגונע לשימוש בתורופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

7. מידע על החומר הפעיל התורופה מכילה גם:
Xylitol, Sodium Starch Glycolate, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Aspartame, Lemon Flavour, Honey Flavour, Quinoline Yellow 70-E104, Sunset Yellow FCF E110.

- כיצד נראית התורופה ומה תוקן אරיזה:
האריזה מכילה מגשיות המכילות 12, 18, 24, 36 טבליות מציצה. כל טבליית מציצה הינה עצולה, שטוחה, בצבע כתום דבש-לימון. יתכן שלא כל דגל האזרחות משוקם.
- שם הייצור/בצלם הרישום וcottobuto: ג'ט תעשיית כימיות בע"מ, רחוב הקדמה 3, קריית מלאכי.
- עלון זו ערך בתאריך 01/2021 בהתחלה להנחיות משרד הבריאות: מס' רישום התורופה בפקוק התורופה הממלכתי משרד הבריאות: 142022973601
- לשם הפשתות והקלת הקראיה, עלון זו נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התורופה מיועדת לבני שנימין.

- הacaktır דמית, צואה שחורה צפתה.
- יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה מטופעת הלואין הבאות מהחרירה או ממשת מעבר למספר ימיים:
 - בחיליה או הקאה
 - שלשול
 - כאב בטן
 - אם הופעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלואין מהחרירה או אשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתיעץ עם הרופא.
- דיזון על תופעות לוואי:
ניתן לדוחה על תופעות לוואי לראיון מהשרד הרפואיים באירוע החישוב ד"ה יוזם על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" (www.health.gov.il/) המפנה לטופס הביהת של אמר משרד הבריאות המבונא בדף המקיים לדוחה על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

- 5. איך לאחסן את התורופה?**
מנע הרעלת התורפה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקום סגור מחוץ להשיג ידם וטוחו או ריאימים של ידים / ואו תינוקות ועל ידך המגע המגען הבלתי הנעה. אל תטרוף להקה לאלה הרואתם פרושות מהרופה. אין להשתמש בתורופה אחרי תאריך התגופה (exp.) המופיע על גבי הארזה. תאריך התגופה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.
- 6. מידע נוספים:**
קסוף על החומר הפעיל התורופה מכילה גם:

Xylitol, Sodium Starch Glycolate, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Aspartame, Lemon Flavour, Honey Flavour, Quinoline Yellow 70-E104, Sunset Yellow FCF E110.

- כיצד נראית התורופה ומה תוקן אריזה:
האריזה מכילה מגשיות המכילות 12, 18, 24, 36 טבליות מציצה. כל טבליית מציצה הינה עצולה, שטוחה, בצבע כתום דבש-לימון. יתכן שלא כל דגל האזרחות משוקם.
- שם הייצור/בצלם הרישום וcottobuto: ג'ט תעשיית כימיות בע"מ, רחוב הקדמה 3, קריית מלאכי.
- עלון זו ערך בתאריך 01/2021 בהתחלה להנחיות משרד הבריאות: מס' רישום התורופה בפקוק התורופה הממלכתי משרד הבריאות: 142022973601
- לשם הפשתות והקלת הקראיה, עלון זו נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התורופה מיועדת לבני שנימין.

