

نشرة طبيّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالمة (مستحضرات) 1986

يُسمّى هذا الدواء بدون وصفة طبيعى

موكوليت 375 كبسولات Mucolit 375 capsules

المادة الفعّالة وكميّتها:

تحتوي كلّ كبسولة على:

كاربوسيسيتين 375 ملغ

Carbocysteine 375 mg

ولمعالجة المواد غير الفعّالة ومسيّبات الأرجيّة في المستحضر - انظر الفصل 6. اقرأ النشرة بامعان حتّى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا توقّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء غير مخصّص للولّاد الذين عمرهم أقلّ من عامين. إذا كان العمر أقلّ من ذلك فيجب التوجّه إلى الطبيب.

يتوجّب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يتوجّب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقم أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 7 أيام.

1. لأيّ غرض مخصّص هذا الدواء؟

الدواء يخفف من لزوجة البلغم ويسبّب التفتّح. الدواء مخصّص للتخفيف من اضطرابات الجهاز التنفّسيّ المصحوبة بفرزاز البلغم المزّايد و/أو الزج.

الفصيلة العلاجية: المقتضات

2. قبل استعمال الدواء:

❗ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجيّة) لكاربوسيسيتين أو لأيّ من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6). علامات ردّ الفعل التحسّسيّ تشمل: طفحاً جلديّاً، مشاكل في التنفّس أو الإبتلاع، انتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.
- كنت تعاني من قرحة المعدة أو الأمعاء.

❗ تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء

قبل العلاج بموكوليت، أخبر الطبيب إذا:

• كنت بالغا

• عانيت في الماضي من قرحة المعدة أو الأمعاء

❗ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيعى وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدليّ بذلك. خاصّة إذا كنت تستعمل:

• أدوية أخرى قد تسبّب النزيف في المعدة

❗ الحمل، الإرضاع والحوصية

لا يوصى باستعمال موكوليت خلال فترة الحمل والإرضاع.

لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كنت حاملاً، قد تكونين حاملاً، تحططين للحمل، مرضعاً أو تحططين للإرضاع.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية المتبّعة عادةً هي:

كبسولتان 3 مرّات في اليوم. عند الشعور بالتحمّس يمكن تقليل الجرعة الدوائية إلى

كبسولة واحدة 4 مرّات في اليوم.

لا يوصى باستعمال موكوليت كبسولات لدى الولّاد. توجد أشكال إعطاء أخرى للولّاد، على سبيل المثال: موكوليت محلول للإعطاء عن طريق الفم، نيتيبوت موكوليت.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج:

إذا لم يطرأ تحمّس على حالتك خلال 7 أيّام فيجب مراجعة الطبيب. مع ذلك، إذا طرأ تدهور على حالتك أثناء فترة العلاج فيجب مراجعة الطبيب قبل مضيّ أيّام

العلاج 7.

كيفية تناول: يجب ابتلاع الدواء مع الماء.

لا تتوقّف عن تناول الدواء خصوصاً فتح الكبسولة ونثر محتواها.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم، فقد تعاني من عسر الهضم

(اضطرابات في الجهاز الهضمي).

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطحب معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتياديّ واستشر الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كلّ مرّة

تتناول فيها دواءً. ضع النظارات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توقّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية:

مثل كلّ دواء، قد يؤدّي استعمال موكوليت إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أيّ واحد

منها.

يجب التوقّف عن الاستعمال والتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في

المستشفى في الحالات التالية:

• ردّ فعل تحسّسيّ. تشمل العلامات: طفحاً جلديّاً، مشاكل في التنفّس أو الإبتلاع،

انتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

• حوصلات أو نزيف على الجلد، يشمل منطقة ما حول الشفتين، العينين، الفم،

الأنف والأعضاء التناسليّة. قد تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض شبيهة

بالإفولوزا والحمى - قد يتغير ذلك إلى نشوء متلازمة تسمى متلازمة ستيفنسون

جونسون (Stevens-Johnson syndrome).

• تقيؤ دمويّ، براز أسود اللون كالقطران.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدليّ إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية التالية أو استمرّ

لأكثر من عدة أيّام:

• غثيان أو تقيؤ

• إسهال

• ألم في البطن

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.
التبليغ عن الأعراض الجانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمّم! هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمّم. لا تسبّب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
يجب التخزين في درجة حرارة أقلّ من 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضًا على:

Microcrystalline Cellulose, Polyethylene Glycol 10000,
Magnesium Stearate.

تركيبة الكبسولة:

Titanium Dioxide, Iron Yellow Oxide, Brilliant Blue FCF,
Gelatin.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

تحتوي العبوة على 2 أو 3 لويحات تحتوي كلّ واحدة منها على 10 كبسولات. تتكوّن كلّ كبسولة من جزأين باللونين الأزرق والأصفر وتحتوي على مسحوق باللون الأبيض الكريمي (الضارب إلى الصفرة) وهو عديم الرائحة. قد لا تُسوّق جميع أحجام العبوات.

اسم المصنّع/صاحب الامتياز وعنوانه: ك ص ط للصناعات الكيمائية م.ض.، شارع هكيدما 3، كريات مלאخي.

تمّ تحرير هذه النشرة في 01/2021 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 633525396
من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.