

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

מוקוליס 375 כמוסות Mucolet 375 capsules

החומר הפעיל וכמותו:

כל כמוסה מכילה:

קרבוסיסטאין 375 מ"ג Carbocysteine 375 mg

חומרים בלתי פעילים ואולרגניים בתכשיר - ראה פרק 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע ממציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא.

עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מפחיתה את צמיגות הליחה ומכייחת. התרופה מיועדת להקלה בהפרעות במערכת הנשימה המלוות בהפרשת ליחה מוגברת ו/או צמיגה.

קצבצה תרופיתית: מכייחים

2. לפני השימוש בתרופה:

❗ אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לקרבוסיסטאין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6). הסימנים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות נשימה או בליעה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.
- הנך סובל מכיב בקיבה או במעי.

❗ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול במוקוליס, ספר לרופא אם:

• הנך מבוגר

• סבלת בעבר מכיב בקיבה או במעי

❗ אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל

תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה לוקח:

• תרופות אחרות שעלולות לגרום לדימום בקיבה

❗ הריון, הנקה ופוריות

השימוש במוקוליס אינו מומלץ בהריון ובהנקה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון, עשוייה להיות בהריון, מתכננת להיכנס להריון, מניקה או מתכננת להניק.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

2 כמוסות 3 פעמים ביום. כאשר חל שיפור, ניתן להפחית לכמוסה

אחת 4 פעמים ביום.

מוקוליס כמוסות אינו מומלץ לילדים. ישנן צורות מתן אחרות לילדים, לדוגמא: מוקוליס תמיסה למתן דרך הפה, טיפטיפות מוקוליס.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול:

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא. אולם במידה וחלה החמרה במצבך במהלך הטיפול יש לפנות לרופא לפני תום 7 ימי הטיפול.

צורת הנטילה: יש בלוע את התרופה עם מים.

אין מידע לגבי פתיחה ופיזור הכמוסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, אתה עלול לסבול מקלקול קיבה (הפרעות במערכת העיכול).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק הנותיות והמנה בכל פעם שהנך

נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש במוקוליס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים במקרים הבאים:

• תגובה אלרגית. הסימנים כוללים: פריחה, בעיות נשימה או בליעה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.

• שלפוחיות או דימום על העור, כולל סביב השפתיים, העיניים, הפה, האף ואיברי המין. ייתכן שתופעות אלו יהיו מלוות בתסמינים דמויי שפעת וחום - אלו עלולים להצביע על תסמונת הנקראת תסמונת סטיבנס ג'ונסון (Stevens-Johnson syndrome).

• הקאה דמית, צואה שחורה כזפת.

יש לידע את הרופא או הרוקח אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מחמירה או נמשכת מעבר למספר ימים:

• בחילה או הקאה

• שלשול

• כאב בטן

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בתמפרטורה המנוכה מ-C-25.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline Cellulose, Polyethylene Glycol 10000,

Magnesium Stearate.

הרכב הכמוסה:

Titanium Dioxide, Iron Yellow Oxide, Brilliant Blue FCF,

Gelatin.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אריזה המכילה 2 או 3 מגשיות המכילות 10 כמוסות בכל מגשית. כל כמוסה מורכבת משני חלקים בצבעים כחול וצהוב ומכילה אבקה בצבע לבן-קורס חסרת ריח. ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

שם היצרן/בעל הרישום וכתובתו: כצט תעשיות כימיות בע"מ, רחוב הקדמה 3, קרית מלאכי.

עלון זה נערך בתאריך 01/2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 633525396

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.



LFL 961 01/21