

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

מוקוליס תמיסה למתן דרך הפה 250 מ"ג/5 מ"ל
החומר הפעיל וריכוזו:

קרבוציסטאין 250 מ"ג/5 מ"ל Carbocysteine 250 mg/5 ml
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף "מידע חשוב
על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה
מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה
אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים. על-יך ליטול את
התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח
אם הנך זקוק למידע נוסף. על-יך לפנות לרופא במידה ותסמיני
המחלה (ספטמיים) מתחמרים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מפחיתה את צמיגות הלילה ומכייתה. התרופה מיועדת
להקלה הפרעות במערכת השלמה המלוות בליחה מוגברת
ו/או מימה.

קבוצה תרופטית: מכיחים.

2. לפני שימוש בתרופה:

✘ אין להשתמש בתרופה אם:

- הנך רגיש (אלרגי) לקרבוציסטאין או לכל אחד מהמרכיבים
הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6). הסימנים של
תגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות נשימה או בליעה,
נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.
- הנך סובל ממיב בקיבה או במעי.

⚠ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
**לפני השימוש במוקוליס 250 תמיסה למתן דרך הפה, ספר
לרופא אם:**

- הנך מבוגר
- סבלת בעבר ממיב בקיבה או במעי
- ⚠ **אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות:**
**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או
לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:
 - תרופות אחרות שעלולות לגרום לדימום בקיבה
 - ⚠ **ההיקף הפוריות:**
השימוש במוקוליס אינו מומלץ בהריון ובהנקה.

אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
אם הנך בהריון, עשויה להיות בהריון, מתכננת להיכנס להריון,
מניקה או מתכננת להניק.

⚠ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
התמיסה מכילה מלטטול. אם נאמר לך ע"י הרופא שיש לך אי
סבילות לסוכרים מומינים, היוועץ ברופא נטילת התרופה.

ל 5 מ"ל תמיסה מכילים כ-38 מ"ג נתרן (סודיום) השווים ל-1.9%
מהצריכה היומית המרבית המומלצת במבוגרים.
ל 5 מ"ל תמיסה מכילים 32.5 מ"ג פרופיל גליקול.
התכשיר מכיל פרבנים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית (אפילו
לאחר זמן).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון
ולאופן הטיפול בתכשיר.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:

גיל המטופל	מנה במיליליטרים	מספר מנות מקסימלי
2-5 שנים	1.25-2.5 מ"ל	4 פעמים ביממה
6-12 שנים	5 מ"ל	3 פעמים ביממה
מבוגרים וילדים מעל גיל 12	15 מ"ל וכאשר חל שיפור ניתן להפחית את המינון ל-10 מ"ל	3 פעמים ביממה

מינון מקובל לילדים ע"פ משקל:

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן
משמעותי. לכן מומלץ לקבוע את המינון לפי המשקל ע"פ התחשיב
שלהלן.

0.4-0.5 מ"ל (20-25 מ"ג) לק"ג משקל גוף ליום.

יש לחלק את המינון הכולל שלושיה עד ארבעה מתנים ביום,
בהתאם לגיל, כפי שמפורט בטבלת המינונים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול:

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא. אולם
במידה וחלה החמרה במצבך במהלך הטיפול יש לפנות לרופא
לפני תום 7 ימי הטיפול.

צורת הטילה: ממוקוליס לבלעיה.

יש לשתוף את כוסית המדידה לפני כל שימוש.

עליך להשתמש בכפית מדידה או מזרק המיועד למדידת הכמות
המנונה של התרופה. באם לא צורפה כפית או אמצעי מדידה אחר
לאריזה, היוועץ ברוקח. אין להשתמש בכפית ביתית לצורך מדידת
כמות התרופה. הפניות הביתיות שונות בגודלן ויתכן שלא התקבל
כמות התרופה הנכונה.

במידה ונדרש מינון נמוך מ-2.5 מ"ל יש להשתמש באמצעי מדידה
מתאים (מזרק וכדו') שניתן לרכישה בבית המרקחת או לחילופין
להשתמש בתכשיר טיפטיפות מוקוליס.

פסקים העמידים לפתיחה על ידי ילדים הורידו משמעותית את
מספר מקרי הרעלה הנגרמים על ידי תרופות בכל שנה. אולם,
אם אתה מתקשה בפתיחת האריזה, באפשרותך לפנות לרוקח
בבקשה להסיר את מנגנון הבטיחות של הפקק ולהפוך לפקק רגיל,
קל לפתיחה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עלול לסבול מקקול
קיבה (הפרעות במערכת העיכול).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד
לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
**אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה
כפולה.** קח את המנה הבאה בזמן הרגיל היוועץ ברופא.

**אין ליטול את התרופה בחושן! בדוק תהוית והמנה בכל פעם שהנך
נוטל תרופה. הרכב משקפים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ
ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש במוקוליס עלול לגרום לתופעות לוואי
בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.
יתכנן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא או לחדר מיון של
בית חולים במקרים הבאים:**

- תגובה אלרגית. הסימנים כוללים: פריחה, בעיות נשימה או
בליעה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.
- שלשול ו/או אידימום על דמון של העור, כולל סביב השפתיים, העיניים,
הפה, האף ואיברי המין. ייתכן שתופעות אלו יהיו מלוות
בתסמינים דמויי שפעת וחום - אלו עלולים להצביע על תסמונת
סטיבנס ג'ונסון (Stevens-Johnson syndrome).

• הקאה שמירת, צואה שחורה כפז.

יש לידע את הרופא או הרוקח אם אחת מתופעות הלוואי הבאות

מחמירה או נאשכת מעבר למספר ימים:

• בחילה או הקאה

• שלשול

• כאב בטן

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה,

**או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך
להתייעץ עם הרופא.**

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על
הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף
הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה
לסופס המוקוליס לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מזון הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור
מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך
תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.) המופיע על
גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C, באריזה המקורית. אין
להקפיא.

לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש בתמיסה במשך
6 חודשים.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Maltitol Solution, Sodium Hydroxide, Sodium Citrate
Dihydrate, Polypropylene Glycol, Hydroxyethyl Cellulose,
Sodium Methyl Hydroxybenzoate, Strawberry Flavor,
Citric Acid, Saccharin Sodium, Sodium Propyl
Hydroxybenzoate, Purified Water.

כיכד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוק זכוכית המכיל 110 מ"ל של תמיסה צלולה, מעט צמיגה,
חסרת צבע עד צהבהבה בניחוח תות.

**שם היצרן/בעל התרופה/רישום והמנה בכל פעם שהנך
רוחב הקדמה 3, קרית מלאכי.**

עלון זה נערך בתאריך 01/2021 בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד
הבריאות: 157-41-34597.

שלש הפטנט וההקלת הריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף
זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

⚠ **נشرة טיפית למוקוליס מוכיח את מועילותה (מסתמרות) 1986**

יטוץ הדוא בדון ודפעה טיפית

מוקוליס מחולל ליעצאען ען טריק הגם 250 מל/5 מל

המאעה הפעאלה וטרקישוה:

קארבוסיסטיין 250 מל/5 מל Carbocysteine 250 mg/5 ml

למעאנה המואד גייר הפעאלה ומסיבאט האריעה פי המסחחער - אנפר הבנד

"מעלומאט האמה ען בעצ מרכיבאט הדוא" והפסל 6.

אפרא הנשרה באימעאן חחן נהאיהא קיבל אסמעאלק לדואו. תחנוי זהה הנשרה על

מעלומאט מלחשה ען הדואו. אדא נופרת לדיק אסנה אדפאעה, פראעג הטיפית

או הטיפילי.

הדואו גייר מלחשה ללואל דון הנשנין מן העמר. יתויב עליק אסמעאל

המסחחער ופא לתעלימאט המזכורה פי בנד הגרעה הדואיטה פי זהה הנשרה.

אסנשר הטיפילי אדא כנא בחאעה אלה מעלומאט אדפאעה. יתויב עליק מראעה

הטיפית אדא תפאמת עלאמאט המרז (האעראז) או למ תחחנן בעד 7 אים.

⚠ **לאי גרז מלחשה זהה הדואו?**

הדואו יחפף מן לזרעה הליגע ויסבב הנשע. הדואו מלחשה ללחחפ מן

אדפראבאט הגזאז הנשע המסחורה באלבעג המזאיד ו/או הזרע.

הפסילה העלאעה: המשחחער.

