

فيناستيرайд تيقع أقراص مطالية

التركيب:

كل قرص مطالي يحتوي على:

فيناستيرайд 1 ملغم

لمعلومات حول المركبات غير الفعالة ومواد التسخين المستخدمة في المستحضر أنتهز الفرصة
2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفرقة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة
إضافية، توجه الطبيب أو الصيدلي.

وصحف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى
وإذا كان ذلك لأن قائمتهم الطبية مشابهة لحانتك.

الدواء مخصص للاستخدام لدى الرجال فقط وهو غير مخصص للاستخدام
لدى النساء أو الأطفال.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

فيناستيرайд تيقع مخصصاً لزيادة نمو شعر الرأس ولمنع تساقط الشعر
لدى الرجال المصابة بالصلع (androgenetic alopecia).

الفصيلة العلاجية: من مثبطات 5 - آلفا ريدوكوتار.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت إمراة لأن هذا الدواء مخصص للرجال. أظهرت أبحاث سريرية أن فيناستيرайд غير ناجع للعلاج لدى النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر.
- كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعالة أو أي واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية").
- كنت تتناول حالياً فيناستيرайд أو دوتاستيريد، المستعملين لمشكلة في البروستات المنسنة ضد ضخم البروستات الحميد (BPH).

لا تتناول فيناستيرайд تيقع إذا كان أي من الموصوف أعلاه ينطبق عليك. إذا لم تكن واثقاً، احدث تغيير طفيف أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- كنت مثلياً على إجراء فحص لم سرطان البروستات باسم PSA على نتيجة هذا الشخص. ذلك لأن فيناستيرайд تيقع قد يؤثر

سرطان الثدي:

انظر الفقرة 4 - "الأعراض الجانبية".

تغيرات في الحالة المزاجية وإكتئاب:

تغيرات في الحالة المزاجية مثل حالة مزاجية إكتئاب، ونشوب أكثر اضطراباً، أذكار انتحارية، بلغ عنها لدى متاعجين الذين تم علاجهم بـ فيناستيرайд تيقع. إذا كنت تقاضي من كل واحد من هذه الأعراض توقف عن تناول فيناستيرайд تيقع، إحدى الأعراض التي ينافي إستشارة طبية إضافية بأسرع ما يمكن.

الأطفال والمهماقون:

لا يجوز إستعمال فيناستيرайд تيقع لدى الأطفال. لا توفر معلومات التي ظهرت
نجاعة أو سلامة فيناستيرайд لدىأطفال دون عمر 18 سنة.

التدابير/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون
وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى الطبيب أو الصيدلي عن ذلك، من أجل
تجنب المخاطر أو عدم النجاعة الناجمة عن التفاعلات بين الأدوية.

فيناستيرайд لا يؤثر عادة على أدوية أخرى.

- لا تتناول فيناستيرайд تيقع إذا كنت تتناول حالياً فيناستيرайд أو دوتاستيرайд، المستعملين لمشكلة في البروستات المنسنة ضد ضخم البروستات الحميد (BPH).
- لا تتوفر معلومات بخصوص إستعمال فيناستيرайд مع مينوكسيديد، نوع أضافي من الأدوية للصلع الذكري الذي يهدى على الرأس.

استعمال الدواء والطعام:
بالإمكان تناول فيناستيرайд تيقع مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

فيناستيرайд تيقع غير مخصص لعلاج الصلع الذكري لدى الرجال فقط.

- يُمنع على النساء اللواتي في سن الخصوبة إستعمال فيناستيرайд تيقع. لا تطبيقي الأقراص المنسنة المنسنة أو مكوسورة أو تخطيطين للحمل (الأقراص الكاملة مطلقة من أجل منع مامسة الدواء أثناء الاستعمال الآمن). ذلك لأن هذه الدواء قد يؤثر على الأعضاء التناسلية لدى المرأة.
- إذا لامست إمرأة حامل أقراص منسنة أو مكوسورة من فيناستيرайд تيقع، تحدث مع طبيبك.

تأثيرات على الخصوبة:

تم الت bliغ عن قدمي الرجال الذين تناولوا فيناستيرайд لمدة طويلة وكانت لديهم عامل خطورة أخرى في الدواء قد يؤثر على الخصوبة. تم الت bliغ عن عودة المحيوانات المنوية لطريقها وتحسين درجتها بعد التوقف عن تناول فيناستيرайд. لم تجري أي بحث سريري طولية الأبد بخصوص تأثيرات فيناستيرайд على الخصوبة لدى الرجال.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يمتني فيناستيرайд تيقع على الكثور. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكرات ممتعة، استشر الطبيب قبل تناول الدواء.

يمتني فيناستيرайд تيقع على أقل من 1 مليلمول صوديوم (23 ملغم) في القرص، وذلك يغير تأثيره على الصوديوم".

السيادة واستعمال الماكولات:

من غير المرجح أن يؤثر فيناستيرайд تيقع على قدرتك على السيادة، على إستعمال الأدوية أو الماكولات.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من طبلك أو الصيدلي إذا لم تكن وأثناً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة: قرص واحد عن طريق الفم، كل يوم.

طريقة الاستعمال:

يجب بلع القرص مع القليل من الماء، مع أو بدون طعام.

لا يجوز شرب القرص بعد توفره في الشرط.

لا توجد معلومات بخصوص سحق/مضخ الأقراص.

أنظر أيضاً الفقرة 2 - "الحمل، الإرضاع والخصوبة".

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

لن يعلم فيناستيرайд تيقع أسرع أو أفضل إذا تناولته أكثر من مرة في اليوم.

قد يتوجب عليك تناول فيناستيرайд تيقع بشكل يومي لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر قبل أن تلاحظ الفائدة من تناول فيناستيرайд تيقع. يمكن لـ فيناستيرайд تيقع أن يعمل على المدى الطويل فقط إذا واصلت تناوله. إذا لم يؤثر عليك الدواء خلال 12 شهراً، فمن غير المحمتن أن مواصلة العلاج مستحب الفائدة.

فيناستيرайд تيقع غير ناجع لعلاج الصلع لدى النساء (alopecia) (androgenetic

alopecia) (bad) (androgenetic

alopecia).

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر:

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة، أو إذا طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخبر مunk عليه الدواء.

يتبغ

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا تناول فيناستيرайд تيقع، فلا تتناول قرصاً إضافياً. يجب تناول القرص التالي كالمعتاد.

يجب عليك المواطنة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة طبيبك، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

إذا توقفت عن تناول فيناستيرайд تيقع، فمن المرجح أن تفقد الشعر الذي تما

خلال 12 شهراً من التوقف عن العلاج.

عليك مراجعة ذلك مع طبيبك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من

الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية

إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب

أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فيناستيرайд تيقع قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض

المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تتعانى آيا منها.

يجب التوقف عن تناول فيناستيرайд تيقع والتحدث مع طبيبك إذا كنت

تقاسى من:

• أعراض لرد فعل تحسسي: انتفاخ الشفتين، الوجه، اللسان والحنجرة لديك:

صعوبة في التنفس؛ كثرة الحلق (شري) وسعوبات في التنفس. توقف عن

تناول فيناستيرайд تيقع وتحدث مع طبيبك بشكل فوري.

• إكتئاب (شعور عميق بالحزن وإنعدام الفقير).

عليك تبليغ طبيبك فوراً عن تغيرات آيا كانت في نسيج الثدي لديك مثل كتل،

ألم، تضخم أو إفراز من الحلمات، لأن ذلك قد تكون هذه علامات لوضع خطير،

مثل سرطان الثدي.

أعراض جانبية شيوها غير معروفة (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10

مستعملين من بين 1,000:

• من الجائز أن لا تستطيع تحقيق انتصاف العضو الذكري (عجز جنسي).

• من الجائز أن يحدث لديك اختفاض في الرغبة الجنسية.

• قد تحدث لديك مشاكل في القذف، مثلاً اختفاض في كمية السائل المنوي

المقدوف أثناء ممارسة العلاقة الجنسية. لا يدري أن للانخفاض في كمية

السائل المنوي تأثير على الأداء الوظيفي الجنسي الطبيعي.

أعراض جانبية شيوها غير معروفة (أعراض شيوها لم يحدد بعد):

• تضخم أو انسدادية الشفرين.

• ضربات قلب (الاشدوار بقات قلبي).

• تغيرات في الطريقة التي يعمل بها كبدك، التي يمكن رؤيتها في فحص الدم.

• ألم في الخصيتين.

• وجود دم في السائل المنوي.

• صعوبة تحقيق انتصاف العضو الذكري الأمر الذي يستمر أيضاً بعد التوقف

عن إستعمال الدواء.

• اختفاض في الرغبة الجنسية الذي يستمر أيضاً بعد التوقف عن إستعمال

الدواء.

• مشاكل في قذف السائل المنوي التي تستمر أيضاً بعد إيقاف إستعمال الدواء.

• عدم لدري الرجال و/أو جودة متدينة للسائل المنوي.

• فقل.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما

تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة طبيبك.

هل يؤثر إستعمال فيناستيرайд تيقع على الشعر في أجزاء أخرى من الجسم؟ لا يؤثر فيناستيرайд تيقع على الشعر في أجزاء أخرى من الجسم.

ماذا

يجب عليك أن تعرف أيضاً عن فيناستيرайд؟ يمكن إستعمال فيناستيرайд أيضاً لمكافحة في البروستات من نوع يسمى "تضخم البروستات المهدى" أو BPH. معلومات التي تم جمعها من بحث سيريري لدى رجال تناولوا 5 ملغم فيناستيرайд (جرعة دوائية أعلى بـ 5 مرات من فيناستيرайд تيقع 1 غرام) لمدة 7 سنوات أظهرت:

• عدد الرجال الذين تناولوا لديهم سرطان البروستات كان أقل لدى الرجال الذين

تناولوا شيئاً.

• عدد الرجال الذين كان لديهم درجة أعلى في سُلم تصنيف الأورام كان أعلى

لدى قسم من الذين تناولوا فيناستيرайд مقارنة بالذين لم تتناولوا شيئاً.

• تأثير إستعمال طول الأمد لـ فيناستيرайд على الأورام من هذا النوع غير

معروف.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات عن سُلم تصنيف الأورام

أو عن هذا البحث، يرجى ملئ التحدث مع طبيبك.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج المباشر للتبليغ عن اعراض جانبية. أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5 كيفية تخزين الدواء

تخزين النسمة هذا الدواء، مثل دواء آخر، يجب حفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول أئم و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس.

لا تنسَب تقطيع دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة لمادة الفعالة أيضًا:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, pregelatinized starch, povidone, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, hypromellose, titanium dioxide (E171), macrogol, iron oxide red (E172), iron oxide yellow (E172).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

قرص مطلي مستدير بلون بنبي، على جانب واحد من القرص مطبوع "FNT 1" والجانب الآخر أملس.

الكمية الموجودة في العلبة: 28. 30 أو 100 قرص مطلي.

من الجائز لا شنوق كافة أحجام العلب.

اسم صاحب الإمتياز وعنوانه:

أبيك للتسويق، م.ض، صندوق بريد 8077، نتانيا، إسرائيل.

اسم المنتج وعنوانه:

تبليغ للأدوية والمستحضرات الطبية، م.ض، ص.ب. 3190، بيتح - تكفا.

تم إعداد الشرطة في تشرين الأول 2020.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

140.59.31427