



ינואר 2021

רופא/ה נכבד/ה,  
רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון:  
**Bepanthen Plus**  
**בפנטן פלוס**  
Cream  
Dexpanthenol 5%  
Chlorhexidine 0.5%

אנו מבקשים להודיעכם שהעלון לצרכן של התכשיר עודכן ושאוּמץ עלון לרופא כלשוננו.

התוויות מאושרות:

Antiseptic healing treatment of wounds of any kind with an infection risk, such as slight skin irritations, wounds, cuts, burns and skin inflammation.

בהודעה זו כלולים העידכונים המהותיים בלבד. בפירוט שלהלן מופיע, מתוך כל פרק ששונה בעלוני, רק המידע שהתעדכן. תוספת טקסט מסומנת בקו תחתון. מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.

### העדכונים בעלון לרופא

אומץ עלון לרופא כלשוננו.

### העדכונים בעלון לצרכן

#### 1. למה מיועדת התרופה?

לחיסוי וריפוי פצעים עם חשש לזיהום כגון גירויים קלים בעור, פצעים, חתכים, כוויות קלות ודלקות עור.

#### קבוצה תרפויטית:

דקספנטנול – פרו ויטמין B5

כלורהקסידין דיהידרוכלוריד – מחטא (אנטיספטי)

בפנטן פלוס מכיל כלורהקסידין שקוטל חיידקים על העור או מאט את קצב גידולם וכך מונע או ממתן זיהום חיידקי בפצעים שהתלכלכו. התכשיר מכיל גם דקספנטנול, שבעור נהפך לחומצה פנטוטנית מה שתומך בחידוש תאי העור מבפנים בקצב מואץ וכך גורם לזירוז ריפוי הפצע. העור שנוצר הינו גמיש יותר. הקרם קל למריחה והסרה בשטיפה ואינו שומני או דביק.

#### 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- הנך נוטל תרופות אחרות (כולל תרופות ללא מרשם) או עושה שימוש במשחות אחרות.
- אין להשתמש בתכשיר לטיפול בגירויים אשר הסיכון שיזדהמו נמוך (לדוגמא: כוויות שמש). במקרה כזה, מומלץ לעשות שימוש בתכשיר שאינו מכיל חומר מחטא.

#### הריון, והנקה

הנתונים הקיימים בחיות לא הראו שהשימוש בתכשיר מסב נזק לעובר, אך אין מחקרים מבוקרים בנשים הרות ועל כן אם הנך בהריון או מניקה היוועצי ברופא או ברוקח לפני הטיפול בבפנטן® פלוס. ניתן להשתמש בבפנטן פלוס במשך תקופת ההנקה. יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.



### נהיגה ושימוש במכונות

לא ידועה השפעה שלילית על יכולת הנהיגה או שימוש במכונות.

### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:**

תרופה זו מכילה צטיל אלכוהול, סטאריל אלכוהול ולנולין, אשר עלולים לגרום לתגובה עורית מקומית (כגון דלקת עור אטופית ממגע).

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. במידה ובלעת בטעות כמות גדולה של התכשיר, יש להיוועץ ברופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולה להופיע עלייה באנזימי כבד (אמינוטרנזפראז).

### **4. תופעות לוואי**

#### יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים:

- במקרים נדירים עלולות להופיע תגובות אלרגיות כגון דלקת עור הקשורה למגע עם חומר, דלקת עור אלרגית, גרד, אודם, אקזמה, פריחה, חרלת (אורטיקריה), גירוי העור, תחושת בעירה או שלפוחיות.

העלון לרופא והעלון לצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug>

ניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לחברת באייר ישראל, רח' החרש 36 הוד השרון, טלפון: 09-7626700.

בברכה,

באייר ישראל