

## سيلدنافيل تيقاع 25 ملغ

أقراص مطلية الترکب

يحتوي كل قرص مطلي على:

سيلدنافيل (كسيترات) 25 ملغ (Sildenafil (as citrate) 25 mg)

## سيلدنافيل تيقاع 50 ملغ

أقراص مطلية الترکب

يحتوي كل قرص مطلي على:

سيلدنافيل (كسيترات) 50 ملغ (Sildenafil (as citrate) 50 mg)

## سيلدنافيل تيقاع 100 ملغ

أقراص مطلية الترکب

يحتوي كل قرص مطلي على:

سيلدنافيل (كسيترات) 100 ملغ (Sildenafil (as citrate) 100 mg)

معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسبيات المساعدة انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" ، والبند 3 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للأخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك شابه بين حالتك الطبيعية وحاتهم.

هذه الدواء معد للبالغين فوق سن 18 عاماً ولكنه ليس معداً للنساء.

### 1. لم أعد هذا التوازن؟

علاج العجز الجنسي - اضطرابات الانتصاب.

### المجموعة العلاجية:

مثبط لازيريز PDE5، يسبب توسيع الأوعية الدموية، وبذلك يحسن تدفق الدم إلى العضو التناسلي أثناء الإثارة الجنسية.

### 2. قبل استعمال الدواء إذا:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (ارجحية) لل المادة الفعالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء.
- كنت تتناول بانتظام أو بشكل منتظم مستحضرات التنشيط العشوائية، الترتيب العضوية أو المانحة لأكسيد النيتروز مثل نتريت الأميل، باي شكل كان (مثل بعض الأدوية العلاجية للذمة الصدرية).
- كنت تتناول بالتزامن دواء من مجموعة مشتقات الإنزيم guanylate cyclase، مثل ريوسيجوارات (riociguat)، لعلاج فرط ضغط الدم المرتفع أو لعلاج متضخم غدة البروستات - خوفاً من انخفاض ضغط الدم. قد يؤدي دمك هذا الدواء مع سيلدنافيل تيقاع إلى الشعور ببارد أو الدوار، الذي يحدث نتيجة ضغط دم منخفض عند الجلوس أو الوقوف سريعاً. قد يحدث هذا الشعور غالباً خلال الساعات الـ 4 بعد تناول سيلدنافيل تيقاع. قد يصف لك الطبيب الجرعة الدوائية الأكثر انخفاضاً.
- ادوية من مجموعة حاصرات ألفا مثل دوكسازوسين (العلاج ضغط الدم المرتفع أو لعلاج تضخم غدة البروستات) - خوفاً من انخفاض ضغط الدم. قد يؤدي دمك هذا الدواء مع سيلدنافيل تيقاع إلى الشعور ببارد أو الدوار، الذي يحدث نتيجة ضغط دم منخفض عند الجلوس أو الوقوف سريعاً. قد يحدث هذا الشعور غالباً خلال الساعات الـ 4 بعد تناول سيلدنافيل تيقاع. قد يصف لك الطبيب الجرعة الدوائية الأقل انخفاضاً.
- استعمال الدواء والغذاء يمكن تناول الدواء مع أو من دون طعام، ولكن قد يتأخر به تأثير الدواء بعد تناولوجبة دسمة.
- استعمال الدواء واستهلاك الكحول قد يسبب استهلاك الكحول اضطراباً مؤقتاً في الانتصاب، للحصول على تأثير الدواء بعد اقصى، يوصى بعدم استهلاك كمية كبيرة من الكحول قبل تناول الدواء.
- الحمل والإرضاع هذا الدواء ليس معداً لاستعمال لدى النساء.
- السياقة أو تشغيل الماكينات قد يسبب سيلدنافيل تيقاع دوخة وقد يؤثر على الرؤية. يجب عليك الانتباه إلى كيف تستجيب للدواي، قبل السياقة أو تشغيل الماكينات.
- معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الفرض، ولذلك يعتبر خال من الصوديوم.
- **3. كيف تستعمل الدواء؟**

يجب استعمال المستحضر دائمًا حتى تعلمه الطبيب. عليك الحصول على تأثير الدواء بعد المصيدلي إذا لم يكن متancockاً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج.

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة هي: قرص واحد قبل ساعه تقويرها من إقامة العلاقات الجنسية.

لا يجوز لك تناول أكثر من قرص واحد يومياً. لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

لا يجوز المضي. يجب ابتلاع الدواء بالكامل مع الماء.

يمنع شطر القرص في حالة عدم وجود خط شطر.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلت من الدواء عن طريق الخطأ، توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى متصلجها على الفور.

الجرعة التي يزيد مقدارها عن 100 ملغ، لا تزيد من نجاعة الدواء.

إذا تناولت جرعة مفرطة، فقد تتعذر من تناقق الأعراض الجانبية، وزياة حدتها. لن تزيد جرعات مقدارها أعلى من 100 ملغ من نجاعة الدواء.

يمنع تناول الأدوية في الظل! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كنت لديك أسلنة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، يمكن أن يسبّب استعمال سيلدنافيل تيقاع أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فقد لا تتعذر من أي منها.

كانت الأعراض الجانبية التي تم الإبلاغ عنها عند استعمال سيلدنافيل تيقاع طفيفة حتى معتدلة غالباً واستمرت قصيرة.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب في حال حدوث:

• رد فعل تحسسي - غير شائع قد يؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص؛ تتضمن الأعراض على صفيح مفاجئ لانف التنسج، صعوبة في التنفس أو دوخة، توصر الحنين، الوجه، الشفتين، أو الحنجرة.

### تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

قبل بدء العلاج سيلدنافيل تيقاع أخير الطبيب إذا:

• كنت تعاني من فقر الدم المنجل (sickle cell anemia)، مرض يصيب خلايا الدم

المarrow)، ورم قوي يعتقد بسرطان نخاع العظم، (multiple myeloma) أو من

البياضن الدم - لوكيبيما (سرطان خلايا الدم).

• كنت تعاني من اضطراب في القصو التناسلي الذكري (القضيب) أو من مرض بيروني (انحناء القضيب).

• كنت تعاني من مشاكل في قلبه، سوف يفحص الطبيب إذا كان قلبك قادرًا على تحمل

العبء الإضافي المنوط بكمية علاقات جنسية.

• كنت تعاني من قرحة في المعدة (peptic ulcer)، أو من مشكلة متعلقة بالنزيف (مثل البيهقيه).

• كنت تعترض لانخفاض في الرؤية أو فقدان الرؤية المفاجئ، توقف عن تناول العلاج

وتوجه فوراً إلى الطبيب.

• لا يجوز تناول سيلدنافيل تيقاع إذا كنت تعاني من العجز الجنسي (ضعف الانتصاب).

• لا يجوز تناول سيلدنافيل تيقاع إذا كنت امراة.

### مرضى الكلى أو الكبد

إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو الكبد، فقد يوصي لك الطبيب بجرعة منخفضة أكثر.

### الأطفال والمرأة

الدواء ليس معداً لاستعمال لمن عمره أقل من 18 سنة.

### الفحوصات والمتابعة

قبل تناول الدواء، على المتعالج أن يختار خصائص طبياً شاملة، للتأكد من أن العلاج ملائم له،

وأنه لا يتعذر من مشاكل قلبية وعائية (في القلب والأوعية الدموية)، لأن الشفاط الجنسي

أيضاً منوط إلى حد ما بجهد القلب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية  
يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالاعتراضات الجانبية عبر الضغط على الرابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسيب الموجو" في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر الدخول إلى الرابط:  
<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تحت التسمى! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي وآمنة الأطفال والأولاد، وهذا تجنب التسمى. لا تُشبع التقوير دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يتغير إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزينه في مكان جاف، تحت درجة حرارة 25°C.

## 6. معلومات إضافية:

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Microcrystalline cellulose (Avicel PH-102), Dibasic calcium phosphate anhydrous, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Opadry II White 85F18422

Opadry II White 85F18422 contains: Polyvinyl alcohol-part hydrolyzed, Titanium dioxide, Macrogol/PEG 3350, Talc.

### كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة؟

- سيلادنافيل تباع 25 ملг: قرص بيضوي أبيض، مطلي، على جهة واحدة من القرص مطبوع S25 أما الجهة الثانية من القرص ملمسه.
- سيلادنافيل تباع 50 ملг: قرص بيضوي أبيض، مطلي، على جهة واحدة من القرص مطبوع S50 أما الجهة الثانية من القرص ملمسه.
- سيلادنافيل تباع 100 ملг: قرص بيضوي أبيض اللون، مطلي، على جهة واحدة من القرص مطبوع S100 أما الجهة الثانية من القرص ملمسه.

احجام العينات: 2، 4، 8 او 12 قرصاً مطلياً، مزرومة في بليسترات (شرانط). قد لا تُشود كل أحجام العينات.

### أين للتسويق وعنوانه:

أيك للتسويق. م.ض. (من مجموعة تباع)، ص.ب. 8077، نتانيا.

### اسم المنتج وعنوانه:

تباع صناعات مستحضرات دوائية م.ض.، ص.ب. 3190، بيتح - تكفا.

تم تحرير النشرة في أيلول 2020.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

سيلادنافيل تباع 25 ملگ: 147.84.33479

سيلادنافيل تباع 50 ملگ: 147.85.33480

سيلادنافيل تباع 100 ملگ: 147.86.33474

الم في الصدر أثناء أو بعد إقامة علاقات جنسية - غير شائع؛ إذا حدثت هذه الحالة أثناء أو بعد إقامة علاقات جنسية، يجب الطميس بوضعية تصف جلوس ومحاولة الهدوء. لا يجوز تناول الانتصارات لعلاج الألم في الصدر.

تم الإبلاغ عن الانتصارات المترافق مع الألم في الصدر التي كان مصوبراً أحياناً بالألام بعد استعمال سيلادنافيل تباع بوتيرة نادرة. إذا عانيت من الانتصار متواصل لأكثر من 4 ساعات، يجب عليك التوجه فوراً إلى الطبيب.

· انخفاض مفاجئ في الرؤية أو فقدان الرؤية، نادرة (قد يؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص)، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب.

· رد فعل جلدي حاد (اعتراض نادر) - قد تضمن الأعراض تقرّح حاد وتورم الجلد، بثرات في القلب، في الأعضاء التناسلية، حول العينين وارتفاع حرارة الجسم.

· نوبات أو اختلالات (اعتراض نادر).

## أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):  
صداع.

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):  
دوخة، احمرار الوجه، اضطرابات في الجهاز الهضمي، احتقان الأنف، رؤية الوان، تتشوش الرؤية، اضطرابات في القلب، عثيان، موجات حرارة (شعور مفاجئ من الحرارة في القسم العلوي من الجسم).

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):  
تقويات، طفح، تهيج/الم في العينين، عيون حمراء، حساسية للضوء، وضمات ضوء، سطوط بصرى، عيون دامعة، ضربات قلب سريعة أو قوية، ارتفاع ضغط الدم، انخفاض ضغط الدم، الم في المصاlets، تهاب في الطبلة الداخلية في الأذنين، تهافت في القلب، احتقان أو انسداد في الجيوب الأنفية، التهاب في البطن العلوي، من الأنف (تشمل الأعراض على نزلة، سعال، وأحتقان الأنف)، الم في البطن العلوي، ارتجاع (تشمل الأعراض على حرقة في المعدة)، شعور بالتعب، وجود الم في البول، الم في الأطراف، تزيف من الأنف، شعور بالحرارة.

أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص):  
أعمااء، سكتة دماغية، توسيع قلبية، اضطرابات في نظم القلب، انخفاض مفاجئ في السمع أو فقدان السمع، انخفاض مستوى في تدفق الدم إلى أجزاء في الدماغ، شعور بتعب في الظهر، نقص الإحساس في المثلث تزفيق في الجهة الخلفية من العين، رؤية ممزوجة، انخفاض حدة الرؤية، شعور استثنائي في العين، تورم العين أو الجفن، رؤية أجسام صفراء أو نقاط، رؤية هالة حول الأشياء، توسيع البواب، تزيف لون بياض العينين، تزيف من الضصبي، ظهور دم في مجرى الماء، جفاف الأنف، تورم داخل الأنف، عصبية.

أعراض جانبية أخرى تم الإبلاغ عنها بعد التسويق:  
تم الإبلاغ عن نوبة صدرية غير متوقعة، ووفاة مفاجئة في أحيان نادرة. معظم الرجال، ولكن ليس جميعهم، الذين عانوا من هذه الأعراض، كانوا يعانون أيضاً من مشكل في القلب قبل تناول هذا الدواء. لا يمكن أن تحدث إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين هذه الأعراض واستعمال الدواء.

إذا ظهر عارض جانبية، إذا تفاقم أيٌ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبية لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.