

ماء أوكسجيني ٣٪ لايف

محلول

Life

التركيب وتركيز المادة الفعالة:

ماء أوكسجيني 3% w/w 3% HYDROGEN PEROXIDE

لقائمة المواد غير الفعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية"

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه

النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية،

توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عليك استخدام المستحضر بشكل صحيح. استشر صيدلياً إذا كنت بحاجة

إلى معلومات إضافية.

١ لماذا معدّ الدواء؟

الدواء معدّ للتطهير.

الصيدلة العلاجية مستحضرات مطهرة.

٢ قبل استخدام الدواء

يُمنع استخدام الدواء:

❑ إذا كانت لديك حساسية للمواد الفعالة أو لأي من المكونات

الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة المواد غير الفعالة:

انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

• على جلد سليم وفي العينين.

• في فراغات مغلقة من الجسم وفي جروح ناتجة عن

عمليات جراحية.

• للاستخدام بحقنة.

• لتطهير أدوات العملية الجراحية.

• يجب الامتناع عن ملامسة العينين.

في حال الملامسة، يجب الغسل باستحمام الكثير من الماء.

• إذا كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أيًا كان، عليك إبلاغ الطبيب

بذلك قبل تناول الدواء.

❑ إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما

فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر

الطبيب أو الصيدلي بذلك.

❑ معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء

• يمكن أن ينتج بقعة بياض مؤقتة لدى ملامسة الجلد

• يمكن أن تبيض مادة الماء الأوكسجيني لون الثياب

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، يجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

طريقة الاستعمال:

الجرعة الموصى بها عادة هي: يجب تنظيف المنطقة المُعدّة للتطهير بقطن طبي

منقوع بالماء. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها لمنع الانتعاش. الدواء معدّ

للاستخدام الخارجي فقط. إذا أفرطت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا ابتلع

الولد خطأ من الدواء، توجهَ حالا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة

للمستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.

كيف تستطيعين أن تساهمي في نجاح العلاج؟

لا تتناول الأدوية في الظلمة! افحص الأضواء والجرعة في كل مرة تتناول فيها

الدواء. استخدم النظارات إذا كنت تتكاهلي.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق باستخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. أعراض الجائنية:

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استخدام الماء الأوكسجيني ٣٪ أعراضًا

جائنية لدى بعض المستخدمين.

لا تفرّج لدى قراءة قائمة الأعراض الجائنية: فقد لا تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن الاستخدام والتوجه للطبيب:

• في حال حدوث تهيج أو طمخ (لم يكنوا موجرين قبل استعمال المستحضر).

• أعراض جائنية أخرى شتّى على الجلد تتحول إلى مساحات

بيضاء لتصبح ممت. يزول الألم المرافق لذلك بعد نحو ساعة

إذا ظهر أحد الأعراض الجائنية، أو إذا تفاقم أي من الأعراض الجائنية، أو

حين تعاني من عرض جانبي لم يذكر أعلاه، عليك استشارة الطبيب.

يمكن الإبلاغ ووزارة الصحة عن الأعراض الجائنية عبر الاستشارة

الإلكترونية للتعلم عن أعراض جانبيه الموجودة في الصفحة الرئيسية

لموقع وزارة الصحة: www.health.gov.il

٥. كيف تحزّن الدواء؟

• امنه التسمية يجب حفظ هذا الدواء وأيّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي

الأطفال وإز الوضع، وتلك لقنادي التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp date) الظاهر على ظهر العبوة.

• تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المشار إليه.

• خزن في مكان بارد، في درجة حرارة أقل من 25°C.

• أغلق بإحكام، وامنع تسرب الهواء والرطوبة.

• احفظه في العبوة الأصلية. • يمكن استخدام المنتج بعد فتحه، حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. معلومات إضافية

فضلاً عن المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على

Purified water, Dibasic Sodium Phosphate, Phosphoric acid

كيف يبدو الدواء، ومادًا تحوي العبوة

الدواء هو محلول صاف وغير اللون يقطن بلاستيكية بنية 100 مليلتر.

مصنع في ومسقون بواسطة: سوبر فايم إسرائيل م.ض.ص. 2171، هرتسليا 4672616

المنتج ومصاحب السبيلين • يشعرون فيريش مرض، المنطقة الصناعية مستغف، يريد

متجول مستغف ٢٠١٧٤٠٠

تحرير هذه النشرة بـ 14.01.21 وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة 1627335768

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من

ذلك، الدواء معدّ لإبادة كلا الجنسين.