

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקמים (כתשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

מי חמצן 3% לייף

תמיסה



הרכב: וריכוזו של החומר הפעיל

מי חמצן 3% w/w 3% HYDROGEN PEROXIDE

לרשימת החומרים הבלתי פעילים:

ראה סעיף 6 "מידע נוסף". קרא בעיון את העלון

עוד סופו בטוים שתשמם בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים ומבוגרים. מליץ להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק במידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיסוי.

קבוצה תרופית - כתשירים אנטיספטיים. (מחטאים)

2. לפני שימוש בתרופה



אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה גישי (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד ממרכיביו הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- על עור בריא ובעיניים
- בחללי גוף סגורים ובפצעים מניתוחים
- שימוש בחוקן
- לחיסוי כלי ניתוח

יש להמנע ממגע עם העיניים.

במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים.

אם הנך גישי למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אם אתה לוקה, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לחובב או לרוקח.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

- במגע עם העור עלול להיות כתם לבן זמני
- חומר מי חמצן הנמצא בתכשיר עלול להבזיר את צבע הבגד

הריון והנקה:

אם הנך בהריון או מניקה, יש להתייעץ עם הרופא, לפני השימוש.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

אופן השימוש: המיון המקובל בדרך כלל הוא:

יש לנוג את האזור המיועד לחיסוי בצמר גפן ספוג חומר.

• אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע. התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תהוית והמנה בכל פעם שהנך נטלת תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה השימוש במי חמצן 3% עלול לגרום לתופעות לוואי בולק מומשטתשים. אל תיבהל למקרה רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מואף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש מואף לתופעות לרואי:

• במקרה של גירוי או פריחה (שלא הו קיימים לפני השימוש בתכשיר).

תופעות לוואי נוספות

היווצרות כוויות על העור שהופכות לאזורים לבנים של רקמה מתה. הכאב המתלווה לכך יחלוף לאחר כשעה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא ברף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il

5. אין לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן במקום קריר, מתחת ל - 25°C.

• סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות.

• אחסן באריזה המקורית.

• ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה, עד שפג תוקפו.

6. מידע נוסף: נוסף על החומרים הפעילים התרופה

מכילה גם: Purified water,

Dibasic Sodium Phosphate, Phosphoric acid

כיצד נגיאת התרופה ומה תוכן האריזה:

התרופה היא תמיסה צלולה וחסרת צבע בבקבוק פלסטיק חום. גודל: 100 מ"ל

מויצר עבור ומשווק ע"י: סופר פארם ישראל בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516

היצרן ובעל רישום: בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשיה משגב, ד.ת. 2017400

עלון זה נערך ב-21.10.2014. בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בכניסה התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות: 1627335768.

לשם הפסטות וההלקת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.

על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.