

סולודנט

תמיסה לשיטפת הפה



החומר הפעיל: כלורהקסידין דיגלוקונאט
Chlorhexidine Digluconate 0.2 % w/v
לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגיים
בתרופה ראה פרק 6.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם
שתמשם בתרופה.**
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל
הרוקח. התרופה מיועדת לשימוש במטופלים
מעל לגיל 12 שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות
לרופא לפני השימוש.

עליון להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף
המינון בעלון זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק
למידע נוסף. עליון לפנות לרופא במידה ותסמיני
המחלה (סימפטומים) מחמירים אם אינם
משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

- לעיכוב מיעודת פלטה.
- כעור לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים
(גינגיביטיס).
- כעור במחמירה על היגיינת הפה.
- לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים
דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים.
- לשימוש בכיבים, בלדקוּת בעקבות
שיניים תותבות ובפסרת בפה.

2. קבוצה תרופתית: אנטיספטי.

3. לפני שימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם אתה רגיש (אלרגי)
לחומר הפעיל כלורהקסידין דיגלוקונאט או לכל
אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה
(מפורטים בפרק 6 "מידע נוסף").**

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
**אין להשתמש בלידים מתחת לגיל 12 שנים
אלא בהמלצת רופא.**

יש להשתמש בתרופה בהתאם ליעודה.
אין לבלוע. במקרה של מגע של התמיסה עם
העיניים או האוזניים, יש לשטוף אותן ביסודיות
עם מים.

• **במקרה של תגובה אלרגית קשה, עליון
להפסיק השימוש ולגשת מיד לקבלת עזרה
רפואית.** ראה בפרק 4 "תופעות לוואי".

• **אין להשתמש מיד לאחר צחצוח השיניים
שלך.** ראה בפרק 3 "כיצד שתמשם בתרופה"
למידע נוסף.
• **אין להלבין בדים שהיו במגע עם שטיפת הפה.
עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים
והלשון.** ראה בפרק 4 "תופעות לוואי".
• **ייתכן ויחול שינוי בתחושת הטעם, או שתורגש
תחושת צריבה.** ראה בפרק 4 "תופעות לוואי".

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה,
ספר על כך לרופא או לרוקח.**

הריון והנקה: אין מניעה משימוש בתרופה אם
הגן בהריון או מניקה.
התרופה רפואית עם מופיעה אצלך **פריחה,
מידע חשוב על חלק מהרכיבים של
התרופה:** • חומר העזר
"PEG 40 Hydrogenated Castor Oil" עלול
לגרום לתגובות בעור.
• התכשיר מכיל אלוהול.

3. כיצד שתמשם בתרופה?

עליון לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך
בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
**השתמש רק אם הסוגר על הפקק נמצא
ובשלמותו לפני הפתיחה.** הקפד לסגור את
הבקבוק מיד אחרי השימוש. אין לעבור על
המנה המומלצת. אין לבלוע.

משחות שיניים עלולות לפגום בעילות של
שטיפת הפה. לאחר צחצוח השיניים שלך, שטוף את
פיון ביסודיות עם מים והמתן 5 דקות לפני
השימוש בסולודנט. לחלופין, אתה יכול
להשתמש בשטיפת הפה עם בומן אחר של היום.

**המינון המקובל בדרך כלל הוא שימוש בתרופה
פעמיים ביום.** יש למלא את כוסית המדידה עד
לקו 10 מ"ל, לשטוף את הפה ביסודיות עם
התרופה למשך דקה אחת ולאחר מכן לירוק את
התרופה.

- **דלקת חניכיים:** מומלץ להשתמש במשך חודש.
- **כיבים בפה ופסרת פה:** יש להמשיך להשתמש
במשך 2 ימים לאחר החלמה.
- **דלקות פה בעקבות שיניים תותבות:**
יש לנקות ולהשרות את התותבות שלך בשטיפת
הפה למשך 15 דקות פעמיים ביום.
- **לאחר ניתוחים דנטליים:** יש לפעול
בהתאם להוראות רופא השיניים שלך.
אם התסמינים נמשכים, פנה לרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן
התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית
החולים והבא ארזית התרופה ארך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה
בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים
אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש
בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסולודנט עלול לגרום
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל
למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול
מאף אחת מהן.

הפסק להשתמש בשטיפת הפה **פונה מיד
לעזרה רפואית** אם מופיעה אצלך **פריחה,
נפיחות בפה או בפנים או אם יש לך קשיי
נשימה.** תופעות אלה עלולות להיות תסמינים
של תגובה אלרגית חמורה שהיא נדירה מאוד.
הפסק להשתמש בשטיפת הפה **פונה לרופא**
אם מופיע אצלך גירוי בפה, כאב או נפיחות של
פניו החליים.

תופעות לוואי שכיחות מאד
(very common) – תופעות שמופיעות ביתר
משתמש אחד מעשרה: **הכתמה זמנית של
הלשון.** זו נעלמת עם הפסקת הטיפול.
תופעות לוואי שכיחות (common)
– תופעות שמופיעות ב- 10-1
משתמשים מתוך 100: יובש בפה.
ייתכן שתבחין בשנינו **בחוש הטעם,
בתחושת צריבה, נימול, או דקירה בלשון** כאשר
אתה משתמש בשטיפת הפה לראשונה. זה בדרך
כלל חולף עם המשך הטיפול. אם התופעות
ממשיכות – יש לפנות לרופא.

תופעות לוואי נוספות:

הכתמה זמנית של השיניים. זו בדרך כלל ניתנת
להסרה על ידי צחצוח. ניתן למנוע הכתמה זאת
באמצעות מניעות משתיית תה, קפה או יין
אדום – בימחת שעה לאחר השימוש, וכן על ידי
צחצוח יומיומי במשחת שיניים (ראה בפרק 3
"כיצד שתמשם בתרופה"). אם ההכתמה
נותרת היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי
ולישוש אצל רופא השיניים או השינינית.

ניתן לנקות את התותבות שלך באמצעות חומר
לניקוי תותבות. **התנפחות בלוטות הרוק.**
אם מתרחש **קילוח של העור** בתוך הפה, יש ללדל
את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מתופעות
הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת
לוואי שלא צוינה בעלון, עליון להתייעץ עם הרופא,
רופא השיניים או הרוקח. ניתן לדווח על תופעות
לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על
הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב
טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר
משרד הבריאות www.health.gov.il
המנחה לטיפול המקוון לדיווח על תופעות לוואי,
או ע"י כניסה לקישור:

[https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/
getsequence.aspx?formType=AdversEffect
@medic@moh.gov.il](https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffect@medic@moh.gov.il)

5. איך לאחסן את התרופה?

• **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש
לשמור במקום סגור מחוץ לשהר ראייתם והישג
ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע
הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת
מהרופא.

• **אין להשתמש** בתרופה אחרי תאריך התפוגה
(Exp. Date) הכתוב על גבי האריזה / בקבוק /
קרטון / תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום
האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.
יש לשמור באריזה המקורית על מנת להגן מפני
אור. לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן
להשתמש במשך 6 חודשים.

6. מידע נוסף:

**נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את
החומרים הלא פעילים הבאים:**

Purified Water, Sorbitol Solution,
Ethanol 95% (Alcohol 95%), PEG 40
Hydrogenated Castor Oil, Peppermint Oil.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
התרופה נראית כתמיסה שקופה, בעלת טעם
מנטה מתוקתק, ובעלת ריח אופייני בע"מנטה.

התמיסה ארוזה בבקבוק פלסטיק בנפח של 300
מ"ל עם פקק הברגה, אשר ארוזים בקופסת קרטון.
האריזה כוללת כוסית מדידה.

גודל האריזה: התרופה מסוקפת באריזה, כמפורט
למטה בבקבוק פלסטיק עם 300 מ"ל תמיסה.

מיצוג עברו משוקק ע"י: סופר פארם ישראל
בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516

יצרן ובעל הרישום: בן שמעון פלוריש בע"מ,
פ.ד. 511126831, פארק תעשייה משגב,
ד.ד. 2017400.

עלון זה נערך ב- 01.21. בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מספר רישום התרופה בפקק התרופות המסומן במשרד
הבריאות: 00-36040-01-163

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.
על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.