

# הקסידיל ללא אלכוהול שטיפת פה

## תמיסה לשטיפת הפה

FLORIS

**החומר הפעיל:** כלורוקסידין דיגלוקונאט  
Chlorhexidine Digluconate 0.2 % w/v  
לרשימת חומרים הבלתי פעילים וארגוניים  
בתרופה - ראה פרק 6.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם  
תשתמש בתרופה.**

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.  
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל  
הרוקח. התרופה מיועדת לשימוש במטופלים  
מעל לגיל 12 שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות  
לרופא לפני השימוש.

עלִין להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף  
המינון בעלון זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק  
למידע נוסף. עלִין לפנות לרופא במידה ותסמיני  
המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם  
משתפרים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

- לעיכוב היווצרות פלאק.
- כעוז לטיפול ומניעה של דלקת הניכיים  
(גינינגיביטיס).
- כעוז בשמירה על הגייגית הפה.
- לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים  
דנטליים, לקידום ריפוי הניכיים.
- לשימוש לאחר כביבים, בדלקות בעקבות  
שיניים תותבות ובפסרת בפה.

### קבוצה תרופית: אנטיספטי.

### 2. לפני שימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם אתה רגיש (אלרגי)  
לחומר הפעיל כלורוקסידין דיגלוקונאט או לכל  
אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה  
(מפורטים בפרק 6 "מידע נוסף").**

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 שנים  
אוכל בהמלצת רופא.
- יש להשתמש בתרופה בהתאם ליעודה.  
אין לבלוע. במקרה של מגע של התמיסה עם  
העיניים או האוזניים, יש לטשף אותן ביסודיות  
עם מים.

• **במקרה של תגובה אלרגית קשה, עלִין  
להפסיק השימוש ולגשת מיד לקבלת עזרה  
רפואית.** ראה פרק 4 "תופעות לוואי".

• **אין להשתמש מיד לאחר צמצוח השיניים  
שלך.** ראה פרק 3 "כיצד תשתמש בתרופה"  
למידע נוסף.

• **אין להלביץ בדים** שהיו במגע עם שטיפת הפה.  
• **עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים  
והלשון.** ראה פרק 4 "תופעות לוואי".

• **ייתכן ויחול שינוי בתחושת הטעם, או שתורגש  
תחושת צריבה.** ראה פרק 4 "תופעות לוואי".

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות  
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה,  
ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**הריון והנקה:** אין מניעה משימוש בתרופה אם  
הנך בהריון או מניקה.

**מידע חשוב על חלק מהרכיבים של  
התרופה:** • חומר העזר  
"PEG 40 Hydrogenated Castor Oil"  
עלול לגרום לתגובות בעור.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלִין לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך  
בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

**תשתמש רק אם הסוגר על הפה נמצא  
ובשלמותו לפני הפתיחה. הקפד לסגור את  
הבקבוק מיד אחרי השימוש. אין לעבור על  
המנה המומלצת. אין לבלוע.**

משחות שיניים עלולות לפגום בפעילות של  
שטיפת הפה. לאחר צמצוח השיניים שלך, שטוף את  
פיך ביסודיות עם מים והמתן 5 דקות לפני  
השימוש ב- הקסידיל ללא אלכוהול שטיפת פה.  
לחילופין, אתה יכול להשתמש בשטיפת הפה גם  
בזמן אחר של היום.

**המינון המוקבל בדרך כלל הוא שימוש בתרופה  
פעמיים ביום.** יש למלא את כוסית המדידה עד  
לקו 10 מ"ל, לטשף את הפה ביסודיות עם  
התרופה למשך דקה אחת ולאחר מכן לריוק את  
התרופה.

• **דלקת הניכיים:** מומלץ להשתמש במשך חודש.

• **כיבים בפה ופסרת פה:** יש להמשיך להשתמש  
במשך 2 ימים לאחר החלמה.

• **דלקות פה בעקבות שיניים תותבות:**  
יש לנקות ולהשרות את התותבות שלך בשטיפת  
הפה למשך 15 דקות פעמיים ביום.

• **לאחר ניתוחים דנטליים:** יש לפעול  
בהתאם להוראות רופא השיניים שלך.

• **אם התסמינים שלך ממשיכים, פנה לרופא.**

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן  
התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית  
החולים והבא אריות התרופה אתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בודק תתוית והמנה  
**בכל פעם** שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים  
אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש  
בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב- **הקסידיל ללא  
אלכוהול שטיפת פה** עלול לגרום לתופעות לוואי  
בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת  
תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**הפסק להשתמש** בשטיפת הפה ופנה מיד  
לעזרה רפואית אם מופיעה אצלך פריחה,  
נפיחות בפה או בכפיים או אם יש לך קשיי

**נשימה.** תופעות אלה עלולות להיות תסמינים  
של תגובה אלרגית חמורה שהיא נדירה מאוד.  
**הפסק להשתמש** בשטיפת הפה ופנה לרופא  
אם מופיע אצלך גירוי בפה, כאב או נפיחות של  
פנים הלחיים.

**תופעות לוואי** שכיחות מאד  
(very common) - תופעות שמופיעות ביותר  
ממשתמש אחד מעשרה: **הכתמה זמנית של  
הלשון.** זו נעלמת עם הפסקת הטיפול.

**תופעות לוואי** שכיחות (common)  
- תופעות שמופיעות ב- 10% - 1  
ממשתמשים מתוך 100: יובש בפה.

ייתכן שתבחין בשינוי בחוש הטעם,  
**בתחושת צריבה, נימול, או דקירה בלשון** כאשר  
אתה משתמש בשטיפת הפה לראשונה. זה בדרך  
כלל חוזף עם המשך הטיפול. אם התופעות  
ממשיכות - יש לפנות לרופא.

תופעות לוואי נוספות:  
**הכתמה זמנית של השיניים.** זו בדרך כלל ניתנת  
להסרה על ידי צחצוח. ניתן למנוע הכתמה זאת

באמצעות הימנעות משתיית תה, קפה או יין  
אדום - במיוחד שעה לאחר השימוש, וכן על ידי  
צחצוח יומיומי במשחת שיניים (ראה פרק 3  
"כיצד תשתמש בתרופה"). אם ההכתמה  
נוותרת היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי  
וליטוש אצל רופא השיניים או השיגייגית.

ניתן לנקות את התותבות שלך באמצעות חומר  
לניקוי התותבות. **התנפחות בלוטות הרוק.**  
אם מתרחש קילוח של העור בתוך הפה, יש לדלל  
את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות  
הלוואי מממירה או כאשר אתה סובל מתופעת  
לוואי שלא צוינה בעלון, עלִין להתייעץ עם הרופא,  
רופא השיניים או הרוקח. ניתן לדווח על תופעות  
לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על  
הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב  
טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר  
משרד הבריאות [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)  
המפנה לרשימת המקוון לדיווח על תופעות לוואי,  
או ע"י כניסה לקישור:

[https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/  
getsequence.aspx?formType=AdverseEffect  
iMedic@moh.gov.il](https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/formType=AdverseEffect&getsequence.aspx?formType=AdverseEffect&iMedic@moh.gov.il)

### 5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש  
לשמור במקום סגור מחוץ לטווח ילדים והישג  
ידים של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע  
הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת  
מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה  
(Exp. Date) המופיע על גבי האריזה / בקבוק /  
קרטון / תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום  
האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.  
יש לטשף באריזה המקורית על מנת להגן מפני  
אור. **לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן  
להשתמש לפניהם 6 חודשים.**

### 6. מידע נוסף:

**נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את  
החומרים הלא פעילים הבאים:**

Purified water, Sorbitol solution, Glycerin  
(Glycerol), PEG 40 Hydrogenated castor oil,  
Pineapple Flavor, Peppermint Oil, Sucralose

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**  
התרופה נראית כתמיסה שקופה, בעלת טעם  
מנטה, אגנס מתקתק, ובעלת ריח אופייני של  
מנטה.

התמיסה ארוזה בבקבוק פלסטיק בבפח של 300  
מ"ל עם פקק פלסטיק עם 300 מ"ל תמיסה.  
האריזה כוללת כוסית מדויגה.

**גודל האריזה:** התרופה מסופקת באריזה, כמפורט  
בבקבוק פלסטיק עם 300 מ"ל תמיסה.

**יצרן ובעל הרישום:** בן שמעון פלוריש בע"מ,  
פ.נ. 511126831, פארק תעשייה משגב,  
ד.ת. 2017400.

עלון זה נערך ב-01.21 בהתאם להנחיות משרד  
הבריאות.

מספר רישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי  
ממשרד הבריאות: 00-35103-78-161

לשם הפטנט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון  
זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.