

نشرة للمستهلك وفقاً لأنظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام 1986
يُستوفى هذا الدواء بدون وصفة طبيب

هيكسيديل غسول للفم

محلول لشطف الفم

FLORIS

المادة الفعالة: كلور هيكسيدين دي غلوكونات 0.2 % w/v
(Chlorhexidine Digluconate)
لمعالجة قائمة المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية،
رجاءً انظر البند 6.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا
وُجدت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
هذا الدواء مخصص للاستعمال للمعالجين الذين يزيد
عمرهم عن 12 سنة. تحت هذا العمر يجب التوجه إلى
الطبيب قبل الاستعمال.

يتوجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات
المذكورة في بند الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي
إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يتعين عليك التوجه
إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

- لتثبيت تشكل الترسبات السنية (البلاك).
- المساهمة في علاج التهاب اللثة والوقاية منه.
- المساهمة في الحفاظ على نظافة الفم.
- لاستعمال بعد العمليات الجراحية أو علاجات الأسنان
وللمساهمة في شفاء اللثة.
- لاستعمال لعلاج التقرحات وحالات التهاب المسببة
عن الأسنان الاصطناعية ولعلاج الفطار القموي.

المجموعة العلاجية: مظهر

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا كانت لديك حساسية (أرجية)
للمادة الفعالة كلور هيكسيدين دي غلوكونات أو لأي من
المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء
(ترد بالتفصيل في الفصل 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- لا يجوز الاستعمال لدى الأطفال دون 12 سنة من
العمر إلا إذا أوصى الطبيب بذلك.
- يجب استعمال الدواء للقائية التي خصص لها لا يجوز
البيع في حالة تزامن المحلول مع العينين أو الأذنين،
يجب شطفهما جيداً بالماء.

- إذا حصلت حالة حساسية حادة، فيتوجب عليك التوقف
عن الاستعمال والتوجه إلى جهة طبية في الحال لتلقي
المساعدة. انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية".
- لا يجوز الاستعمال فور الانتهاء من تنظيف الأسنان
بالفرشاة. انظر الفصل 3 "كيف تستعمل الدواء"
للمحصول على مزيد من المعلومات.
- لا يجوز تبيض الأقمشة التي لامست غسول الفم.
- قد ينشأ تقيح مؤقت للأسنان واللسان. انظر الفصل 4
"الأعراض الجانبية".
- قد يطرأ تغيير على حاسة التذوق، أو قد ينشأ الإحساس
بالحرق. انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية".

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في
ذلك الأدوية المصرفة بدون وصفة طبيب والإضافات
الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع: لا مانع من استعمال هذا الدواء إذا كنت
حاملاً أو مرضعاً.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

- قد تسبب المادة المساعدة
"PEG 40 Hydrogenated Castor Oil" ردود الفعل
الجديدة.
- يحتوي المستحضر على الكحول.

3. كيف تستعمل هذا الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من
الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.
استعمله فقط إذا كان غطاء الحماية فوق السداد سليماً
قبل الاستعمال. تحقق من إغلاق القنينة فور الانتهاء من
الاستعمال.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها. لا يجوز البيع.

قد تسبب معاجين الأسنان خلا في فعالية غسول الفم.
بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، اشطف فمك جيداً بالماء
وانتظر 5 دقائق قبل استعمال هيكسيديل غسول للفم. بدلاً
من ذلك، بإمكانك أيضاً استعمال غسول الفم في وقت آخر
من اليوم.

الجرعة المتبعة هو عادة استعمال الدواء مرتين في
اليوم. يجب تعبئة كأس المعايرة إلى خط 10 ملل ثم
شطف الفم جيداً بالدواء لمدة دقيقة واحدة ثم بصق الدواء.
• التهاب اللثة؛ يوصى بالاستعمال لفترة شهر.
• التقرحات القموية والفطار القموي؛ يتوجب متابعة
الاستعمال لفترة يومين بعد الشفاء.• حالات التهاب الفم الناتجة من الأسنان الاصطناعية؛
يتعين تنظيف أسنانك الاصطناعية وتقعها في غسول الفم
لمدة 15 دقيقة مرتين في اليوم.• بعد العمليات الجراحية في الأسنان؛ يتوجب اتباع
تعليمات طبيب الأسنان.إذا استمرت الأعراض لديك، فتوجه إلى الطبيب.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل ببلع الدواء خطأً،
فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في
المستشفى مصطحباً معك علبة الدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! راجع الملصق
والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات
الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا وُجدت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء،
فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء آخر، قد يؤدي استعمال هيكسيديل غسول
للفم إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا
تتعلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من
أي واحد منها.

توقف عن استعمال غسول الفم وتوجه حالاً إلى جهة
طبية لتلقي المساعدة إذا نشأ لديك طفح جلدي، انتفاخ الفم
أو الوجه أو إذا عانيت من صعوبات التنفس. قد تكون هذه
الظواهر أعراض رد الفعل الأرجي الخطير، الذي يعتبر
تأزراً جاداً.

توقف عن استعمال غسول الفم وتوجه إلى الطبيب إذا
نشأ لديك تهيج الفم، الألم أو انتفاخ الجهة الداخلية من
الخدين.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض
تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة؛
تتلخح اللسان المؤقت، إنه يتلاشى عند التوقف عن
الاستعمال.

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر عند
10-1 مستعملين من بين 100؛
جفاف الفم.

قد تلاحظ تغير بحاسة التذوق أو تشعر بالحرق، التميل،
أو الوخز باللسان عند استعمالك غسول الفم
لأول مرة. ويتلاشى ذلك عادة عند الاستمرار بالعلاج. إذا
استمرت الأعراض فتوجه إلى الطبيب.

أعراض جانبية أخرى:

- يتبع الأسنان المؤقت. يمكن إزالته عادة بالتنظيف
بالفرشاة. يمكن منع هذا التبع من خلال الامتناع عن
شرب الشاي، القهوة، أو النبيذ الأحمر، وبخاصة خلال
ساعة بعد الاستعمال، وكذلك بالتنظيف اليومي بالفرشاة
ومعجون الأسنان (انظر الفصل 3 "كيف تستعمل
الدواء").
- وإذا بقي التبع فيمكن إزالته بالتنظيف والتلميع
من قبل طبيب الأسنان أو أخصائية صحة الأسنان واللثة.
- يمكن تنظيف الأسنان الاصطناعية الخاصة بك بمادة
لتنظيف الأسنان الاصطناعية.

انتفاخ الغدد اللعابية.

إذا تقصّر الجلد داخل الفم، فيجب تخفيف غسول الفم بكمية
متساوية من الماء.

إذا ظهر لديك أحد الأعراض الجانبية، أو زاد أحد
الأعراض الجانبية سوءاً أو في حال عانيت من عرض
جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فيجب عليك مراجعة
الطبيب، طبيب الأسنان أو الصيدلي.

بالإضافة للتبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة
بالضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب
العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع
وزارة الصحة www.health.gov.au

عن يوجبه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو
عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://forms.gov.au/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@mo.gov.au>

5. كيف يخزن هذا الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء وكل دواء آخر يجب أن يحفظ
في مكان مغلق بعيداً عن مرأى ومتناول أيدي الأطفال
و/أو الرضع وبذلك مستبعد التسمم. لا تسبب القيء بدون
تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية
(Exp.Date) على العبوة/القنينة/العبوة
الكرتونية/المصفاة، ويشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى
اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزينه في درجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية.
يجب الاحتفاظ به في العبوة الأصلية لحمايته من الضوء.
بعد فتح القنينة لأول مرة يمكن استعماله لمدة 6 أشهر.

6. معلومات إضافية:

إلى جانب المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على المواد
غير الفعالة التالية:

Purified Water, Sorbitol Solution, Ethanol 95%
(Alcohol 95%), PEG 40 Hydrogenated Castor
Oil, Peppermint Oil

• كيف يبدو الدواء وما هو محتواه الطبي:

يتوفر الدواء على هيئة محلول صافٍ بطعم النعناع
الحلو ونكهة النعناع المعتدلة.
المحلول معبأ في قنينة بلاستيكية بحجم 300 ملل ذات
سدادة متولب يتم تعبئتها في عبوة كرتونية. تتضمن العبوة
كأس قياس.

حجم العبوة: يتوفر الدواء في العبوة الوارد وصفها
بالتفصيل - قنينة بلاستيكية تحتوي على 300 ملل من
المحلول.

المنتج وصاحب التسجيل: بن شمعون فلوريش م.ض،
شركة خاصة 511126831 البراك الصناعي في مسعاف،
البريد الممثل 2017400.

تسجيل الدواء ب - 01.21 وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة/تسجيل
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة
الصحة: 00-35102-161-77-167

من أجل التبسيط ولتسهيل الفراء، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة
المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.