

הקסידיל פה

תמיסה לשיטפת הפה

FLORIS

החומר הפעיל: כלורהקסידין דיגלוקונט
Chlorhexidine Digluconate 0.2 % w/v
לרשימת חומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה פרק 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. התרופה מיועדת לשימוש בטמפולים מעל לגיל 12 שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא לפני השימוש.

עליון השתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המיניון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליון לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

- לעיכוב היווצרות פלוק.
- כעוז לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים (ג'ינג'יטיס).
- כעוז בשמירה על היגיינת הפה.
- לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים.
- לשימוש בכיבים, בדלקות ענקיות שיניים ותותבות ובפסטרת כפה.

קבוצה תרופוטי: אנטיספטית.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל כלורהקסידין דיגלוקונט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בפרק 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 שנים
אלא בהמלצת רופא.

יש להשתמש בתרופה בהתאם ליעודה.
אין לבלוע. במקרה של מגע של התמיסה עם העיניים או האוזניים, יש לשתוף אותן ביסודיות עם מים.

• במקרה של תגובה אלרגית קשה, עליון להפסיק השימוש ולגשת מיד לקבלת עזרה רפואית. ראה בפרק 4 "תופעות לוואי".

• אין להשתמש מיד לאחר צמצוח השיניים שלך. ראה בפרק 3 "כיצד תשתמש בתרופה" למידע נוסף.

• אין להלבין בדים שהיו במגע עם שטיפת הפה. עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים ולהלשון. ראה בפרק 4 "תופעות לוואי".

• ייתכן יחולל שינוי בתחושת הטעם, או שחורגת תחושת צריבה. ראה בפרק 4 "תופעות לוואי".

• אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה: אין מניעה משימוש בתרופה אם הנך בהריון או מניקה.

מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה: חומר העזר "PEG 40 Hydrogenated Castor Oil" עלול לגרום לתגובות בעור.
• התכשיר מכיל אלכוהול.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליון לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. **השתמש רק אם הסוגר על הפקק נמצא ובשלמותו לפני הפתיחה.** הקפד לסגור את הבקבוק מיד אחרי השימוש. אל לעבור על המנה המומלצת. אין לבלוע.

משחות שיניים עלולות לפגום בפעילות של שטיפת הפה. לאחר צמצוח השיניים שלך, שטוף את פוך ביסודיות עם מים והמתן 5 דקות לפני השימוש ב- הקסידיל שטיפת פה. לחילופין, אתה יכול להשתמש בשטיפת הפה גם בזמן אחר של היום.

המינון המוקבל בדרך כלל הוא שימוש בתרופה פעמיים ביום. יש למלא את כוסית המדידה עד לקו 10 מ"ל, לשתוף את הפה ביסודיות עם התרופה למשך דקה אחת ולאחר מכן לירוק את התרופה.

דלקת חניכיים: מומלץ להשתמש במשך חודש. **כיבים בפה ופסטר פה:** יש להמשיך להשתמש במשך 2 ימים לאחר החלמה.

• **דלקות פה בעקבות שיניים תותבות:** יש לנקות ולהשרות את התותבות שלך בשטיפת הפה למשך 15 דקות פעמיים ביום.

• **לאחר ניתוחים דנטליים:** יש לפעול בהתאם להוראות רופא השיניים שלך. אם התסמינים שלך נמשכים, פנה לרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריות התרופה אתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תוויות והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב- הקסידיל שטיפת פה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהיל למוקד רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק להשתמש בשטיפת הפה ופנה מיד לעזרה רפואית אם מופיעה אצלך פריחה, נפיחות בפה או בפנים או אם יש לך קשיי נשימה. תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה שהיא נדירה מאוד. **הפסק להשתמש** בשטיפת הפה ופנה לרופא אם מופיע אצלך גירוי בפה, כאב או נפיחות של פנים הלחיים.

תופעות לוואי שכיחות מאד (very common) - תופעות שמפועות ביותר משתמש אחד מעשרה: **הכתמה זמנית של הלשון.** זו נעלמת עם הפסקת הטיפול. תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמפועות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100: יובש בפה.

ייתכן שתבחין בשינוי בחוש הטעם, בתחושת צריבה, נימול, או דקירה בלשון כאשר אתה משתמש בתרופה. נימול, אשר דקירה בלשון בדרך כלל חולף עם המשך הטיפול. אם התופעות ממשיכות - יש לפנות לרופא.

תופעות לוואי נוספות:

הכתמה זמנית של השיניים. זו בדרך כלל ניתנת להסרה על ידי צמצוח. ניתן למנוע הכתמה זאת באמצעות הימנעות משתיית תה, קפה או יין אדום - במיוחד שעה לאחר השימוש, וכן על ידי צמצוח יומיומי במשחת שיניים (ראה בפרק 3 "כיצד תשתמש בתרופה"). אם הכתמה נותרת היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי וליסוח אצל רופא השיניים או השינינית.

ניתן לנקות את התותבות שלך באמצעות חומר לניקוי תותבות. התפוחות בליטות הרוק, אם מתרחש קילוף של העור בתוך הפה, יש לדלל את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליון להתייעץ עם הרופא, רופא השיניים או הרוקח. ניתן לרדוד על תופעות הקישור "לדיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il המפנה לטיפול המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על "כניסה לקישור".

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/?sequence=AdversEffectType&formType=AdversEffectType&formType=AdversEffectType&formType=AdversEffectType>

5. אין לאחסן את התרופה?

• מנע רעלוח! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשהדה ילדיהם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע מהרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה / בקבוק / קרטון / תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.
יש לשמור באריזה המקורית על מנת להגן מפני אור. לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש למשך 6 חודשים.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את החומרים הלא פעילים הבאים:
Purified Water, Sorbitol Solution, Ethanol 95% (Alcohol 95%), PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Peppermint Oil.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
• התרופה נראית כתמיסה שקופה, בעלת טעם מננה מתקתק, ובעלת ריח אופייני של מנטה.
התמיסה ארזהה בבקבוק פלסטיק בנפח של 300 מ"ל עם פקק הברגה, אשר ארוזים בקופסת קרטון. האריזה כוללת כוסית מדידה.

גודל האריזה: התרופה מסופקת באריזה, כמפורט - בבקבוק פלסטיק עם 300 מ"ל תמיסה.
ת.פ. 511126831, פאראק תעשייה משגב, 2017400.

עלון זה נערך ב- 01.21 בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-35102-77-161
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לגבי שני המינים.