

אוזוד ג'ל

חומרם פעולם

- Hydroquinone 4% w/w.
1 ג'ם במכוסר מכל 40 מ'ל הידרוקווינון.
6 חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף "מידע נסוף".

- קדא בעין את העין עד סופו בטוטם
תשמש בהרופאה. עלון זה מכיל ייעוד
תמצית על ההרופה. אם יש לך שאלות
בخصوص, פנה לנו הרופא או אל הרופא.
וזו גישתנו בדור, אל עברנו זהה לאחרים.
היא עוללה להזקק להם אפסי לאם גראה לך
מצבם רפואי דומה.

1. למما מיועדת התרופה?

- התרופה מיועדת להברחת כתמי עור.
কোচাৰ প্ৰফিটি: চকিৰি বেল ফুলো
কমুমতি লিপিল বাফিৰ ফিগনেটিচা.

- אוזונ הפוללה של איזמד ג'ל
הידרוקווינון פוחתת את יציר המלני, החומר
ההידרוקווינון גישתנו של העור.

2. לפנ' השימוש בתרופה

- אין להשתמש בתרופה:
• אתנה גרש (אלרג) לחומר הפעיל או לפחות אחד מהמרכיבים הניסיים אשר מכיל התרופה.
• אין להשתמש בליטול פיג'מנטנזה כחומר
מאכונוטיס (chemical ochronosis), וכן קולואידיל (colloid milium), שנגרמו
מיסיבה איסותית או תעוקתית.
• התרופה איזמד ג'ל לאdest מתחת גיל 12.
• בוגרים.

3. כיצד תשמש בתרופה?

- תמיד יש להשתמש לפני הוראות הרופא. עלין
בלבד עוקם השופך את הוראות הרופא.
המנין ואופן השימוש יקבעו על ידי הרופא
בלבד. המינון מקובל בדרך כלל הוא:
יש להרשות שכבה גל דקה באזורי קרניות
בשם ק'מת היפיג'מנטנזה של העור בלבד.
මונוליט התהחל במרחץ אחות ל'ום במשך
10 עד 15'ים, ולמהדר שיטופו עם
מיהרויות בימים, אחות בבור ואחות בערך.
אם אל לישר לאור 2 וחודש טיפול,

- במשך טപול המומלץ הוא 90' יומ. ובמשך
משך קרה אין לחתוטה תכשיש רופאי זה
שלא מונע מגע עם העיניים והקרניים הריריים.

- בברק מהלך טיפול בהידרוקווינון, יש לשלוט
בכמות מוגע מוקרי עם העיניים, ויש להרשות
אשפרית על מגע עמו ויריות, שער
שמש או קרה.

- לא למלוט לישוש חיצוני בלבד. לא לשימוש
אין להלען לישוש חיצוני בלבד. לא לשימוש
ב unin.

- אם נטלת בטעות מינון גבoga יורה או
אם משוחה אחר מן תרופה, הגו מזגדה
משוו ב��ת חמל וגהב עלולה להוביל לתגובה
איך. בילעה בשוגג עלולה להוביל לתגובה
אימונית. אין כרחות לרעלעה בשימוש חיצוני.

- אם שכתת ליטול את התרופה במן
הדרושים, מורה את המנה מידי שמכתת ואית
המנה הבחנה בהרבה. אין לזרוק מנה
כפולין, כייפוי מנה מנה נשכחיה.
של התהמם בטיבול כפ' ששהומלץ על ידי הרופא.

- יש ליטול תרופה בחושן! בדוק את התוויות
אתן המלני וכן ג'רין להם. האוזור שב
ומולץ להשתמש במקין קרייה בעל מוקם
הגהנה בבהם בהרבה.

- של הרוחן את האידיים בסבן לאחר מריחת ההתשרות
אתה הידוקווינון ליל' לרופאים היפר-ויריאנטים.

- ההתשרות עליל' רוחה כוותה פוחתת.
בכאנשים כליל' רוחה כוותה פוחתת.

- בחולק מהאנשים, בעיר אלו עם עיר גרש,
עליל' רוחה כוותה ג'רין רוחה כוותה מותן
האל על החלק הפיני של הרוזן קווטה קטעה
24 שניות. בדורש ג'רין קרש, ש להיפסיק

- ללא תרילה שטוף או ג'רין רוחה כוותה
במקירם מוסמיים, עליל' רוחה כוותה זמינות
ג'רין זמי בשע' און רוחה כוותה זמינות.

- ההיפסיק את הטיטול.
ד-היפיג'מנטנזה (הברחת העור) אינה מידה.
אתה אוחר שירודירוקווינון משבץ אך
את יציר שאל מלני יורה, ש ג'רין ג'רין זמינות
ויציר המלני מופעל מחדש עם היפסיק
הטיטול. ד-היפיג'מנטנזה עשויה להישמר

בנ' 2-6 חודשים לאחר סיום הטיפול. כל
שהגענו כה'ם יורה, ר'ר' היפיג'מנטנזה החזרה
תתרחש בשלב מוקדם יותר.

ילד'ם ומותרגים

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12.

4. תופעות לוואי נסופות

במיד פע'ם: חמימות צירבה, פריחה, ריגושים,
של העור, או מדיטטיים. מוגע שפה אלה אין
לחולות תוך שבע, עלילה להרשות הדרגתית.

טבילה רחיק טוחן של מוגע דוחות מרם
היפיג'מנטנזה. בטבילה רוחק ג'רין זמינות
בדוחם של איזמד ג'ל (ארכומטיד קוסטונט).

אם ג'רין זמינות לאו'י, אמ' אחת
תופעות לוואי נסופות

טבילה רחיק טוחן של מוגע דוחות מרם
היפיג'מנטנזה. בטבילה רוחק ג'רין זמינות
בדוחם של איזמד ג'ל (ארכומטיד קוסטונט).

ושפעת איזמד המרימה בסבן עדי'.

שימוש בתרופה ומודון

לא רצוני'.

הריון, נגקה ושורות

אוזמד ג'ל אסור לשימוש בההחל ההיון מכון
שאי מידע מספק לגבי השימוש בהידרוקווינון
בנשימה הרות.

היראה שימוש במוכנות.

והפכים, השפתים והפה, קשי' נשימה
בכל השם, פרירה מרדה, ג'רין זמינות
מ-6 חודשים, שימוש מוגע מוגע מוגע מוגע
בגולגולת צרך, על אף זאת, התרופה מוגע מוגע
בקען המינים.

בערך אגנסים עם גו' שער שער שער שער שער

ו-13.9.20