

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (בתכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

דואודופה

גל להזלפה מתמשכת ישירות לתוך מערכת העיכול בעזרת מכשיר ייעודי

חומרים פעילים:

Levodopa 20 mg/ml - לבודופה 20 מ"ג למ"ל
Carbidopa (as monohydrate) 5 mg/ml - קרבידופה (כמונוהידראט) 5 מ"ג למ"ל

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 'מידע נוסף'.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקם.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. את תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18.

בנוסף לעלון, להכשיר דואודופה קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליו ללמוד לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בדואודופה ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

דואודופה מיועדת לטיפול במחלת פרקינסון בשלב מתקדם, המגיבה לטיפול בלבדופה, המלווה בתנועתיות יתר חריגה וחומרה והפרעות תנועה לא רצוניות כאשר שילובים קיימים של תכשירים רפואיים לטיפול בפרקינסון לא היו יעילים.

קבוצה תרפויטית: מרכיבים נוגדי פרקינסון

לבדופה - נגזרת דופאמין

קרבידופה (כמונוהידראט) - מעכב האנזים דופה-דקרבוקסילאז

דואודופה שיכת לבקבוצת תרופות המשמשות לטיפול במחלת פרקינסון. זהו גל העובר במשאבה וזימירת אשר נכנסת לתוך המעיים (מעיי הדק). דואודופה מכילה שני מרכיבים פעילים: לבדופזה וקרבידופה (כמונוהידראט).

אופן פעולת התרופה:

levodopa הופך בגוף לדופאמין, המתווסף לדופאמין שכבר נמצא במוח ובחוט השדרה. הדופאמין עוזר בהעברת אותות בין תאי עצב.

מעט מדי דופאמין גורם לתסמינים של מחלת פרקינסון, כגון: רעד, תחושת נוקשות, תנועה איטית, ובעיות בשמירה על שיווי המשקל.

הטיפול בלבדופה מעלה את רמת הדופאמין בגוף שלך ובכך מפחית את התסמינים הללו.

תפקידו של קרבידופה (כמונוהידראט) לשפר את ההשפעה של לבדופה ולהפחית את תופעות הלוואי של לבדופה.

2. לפני השימוש בתרופה

2.1 אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) ללבדופה, קרבידופה או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 'מידע נוסף').
- אתה סובל מבעיה בעין הנקראת 'גלאוקומה צרת זווית'.
- אתה סובל מבעיות חמורות בלב.
- אתה סובל מהפרעות חמורות בקצב הלב (אריתמיה).
- עברת אירוע (שבץ) מוחי חריף.
- אתה נוטל תרופות מסוימות לטיפול בדיכאון [תכשירים מקבוצת מעכבי MAO (monoamineoxidase) לא סלקטיביים או מעכבי MAO-A סלקטיביים, כגון: מוקלובמיד או פנלזין].
- יש לך גידול בבלטות יותרת הכליה (פאכרומוציטומה).
- יש לך בעיות הורמונליות כגון ייצור יתר של ההורמון קורטיזול (תסמונת קושינג), או של ההורמון בלוטת התריס (היפרתירואידיזם).
- סבלת בעבר מסרטן ריאות או יש לך שמומת חריגות או סימנים על העור אשר לא נבדקו על ידי הרופא.

אין להשתמש בדואודופה אם אחד מממקרים מעלה רלוונטיים לך. אם אינך בטוח, פנה לרופא לפני השימוש בתרופה.

2.2 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

⚠ לפני הטיפול בתרופה דואודופה, ספר לרופא אם:

- עברת אי פעם התקף כול, חסימה בכלי הדם בלב שלך או סבלת מבעיות לב אחרות בלשון, לול הפרעת קצב (אריטמיה).
- אתה סובל מבעיה בריאות - כגון אסתמה.
- סבלת אי פעם מבעיה הורמונלית.
- סבלת אי פעם מדיכאון עם נטיות אובדניות או מכל בעיה נפשית אחרת.
- אתה סובל ממחלה בעין הנקראת 'גלאוקומה רחבת זווית'.
- היה לך אי פעם אולקוס (כיב) בקיבה.
- סבלת אי פעם מפרכוסים (עוויתות).
- עברת אי פעם ניתוח באזור הבטן העליונה.
- חולשה אשר מחמירה עם הזמן, כאב, נימול או אובדן תחושה באצבעות או בכף הרגל [דלקת ריב-עצבית (פולינורופתיה)] דווחו במטופלים המטופלים בלבדופה/קרבידופה גל הניתן ישירות למעי. הרופא שלך יבדוק אם יש סימנים ותסמינים של מחלות של מערכת העצבים ההקפית (ניורופתיה) לפני שאתה מתחיל טיפול בלבדופה/קרבידופה גל הניתן ישירות למעי ולאחר מכן באופן תקופתי. ידע לרופא במידה ויש לך כבר מחלות של מערכת העצבים ההקפית או מצב רפואי הקשור במחלות של מערכת העצבים ההקפית.

אם אחד מממקרים מעלה רלוונטיים לך (או אינך בטוח), היוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

⚠ חשוב שתהיה מודע למידע הבא ולתופעות הלוואי אשר עלולות להתפתח בשימוש בדואודופה:

תסמונת ניורולפטית ממאירה:

אל תפסיק את הטיפול או תוריד את המינון של דואודופה אלא אם הרופא אמר לך, היות והפסקה או חמירה פתאומית של מינון הדואודופה שלך עלול לגרום במהירות לתופעה חמורה הנקראת: "תסמונת ניורולפטית ממאירה" (Neuroleptic Malignant Syndrome) (ראה סעיף 3 'כיצד תשתמש בתרופה?' וסעיף 4 'תופעות לוואי').

תחושת ישונויות סחרחורת:

אם אתה נרדם בפתאומיות (התקפי שינה), או אתה מרגיש ישוני מאוד, או אם אתה מרגיש מסחרר:

- אל תנהג ואל תשתמש בכלים או מכונות עד אשר אתה שוב מרגיש עירני לגמרי או שאיך מרגיש יותר מסוחרר (ראה סעיף 'נהיגה ושימוש במכונות').

שינויים בעור:

ספר לרופא, אם אתה מבחין בסימנים חריגים או שמות על העור אשר מופיעות או מחמירות (ראה סעיף 4 'תופעות לוואי').

הפרעות שליטה בדחפים – שינויים בהתנהגותך:

ספר לרופא אם אתה, משפחתך או מטפליך מבחינים אצלך בהתפתחות דחפים או תשוקות להתנהג באופן חריג או שאיך מסוגל לשלוט בדחף, רצון או בפיתוי להתנהג באופן אשר עלול לפגוע בך או באחרים. התנהגויות אלה נקראות "הפרעות שליטה בדחפים" ויכולות לכלול:

- התמכרות להימורים
- אכילה או בזבזנות מוגזמת
- יצר מיני מוגבר או עלייה במחשבות או בתחושות מיניות
- ייתכן והרופא שלך יצטרך לבחון מחדש את הטיפולים שהינך מקבל. הרופא ידון עמך בדרכים לשליטה או הפחתה של תסמינים אלו (ראה סעיף 4 'תופעות לוואי').

תסמונת חוסר איזון הדופמין (Dopamine Dysregulation Syndrome):

ספר לרופא שלך אם אתה, משפחתך או מטפליך מבחינים אצלך בהתפתחות של תסמינים דמויי התמכרות, המובילים להשתוקקות למינון גבוה של דואודופה ותרופות אחרות לטיפול במחלת פרקינסון.

קשיים בשימוש במשאבה או בצניורית:

ייתכן ויהיו לך קשיים מסוימים הקשורים בשימוש במשאבה והצניורית:

- אתה חווה ירידה ביכולת לתפעל את המשאבה והצניורית, חלה החמרה בתסמינים של מחלת הפרקינסון שלך או שיותר קשה לך לזוז (ברדיקניה) - תופעות אלה עשויות להצביע על כך שהמשאבה והצניורית אינן עובדות כראוי.

- במידה ואתה חש בכאב באזור הבטן, בחילה ומקיא - פנה מיד לרופא (ראה סעיף 4 'תופעות לוואי').

ייתכן ויהיו לך תופעות לוואי אחרות אשר משפיעות על המעיים ועל אזור הכניסה של הצניורית למעי (ראה סעיף 4 'תופעות לוואי').

דואודופה וסרטן:

קרבידופה (אחד החומרים הפעילים בדואודופה) מתפרק בגוף לחומר שנקרא הידרזין. חומר זה עלול לגרום נזק לחומר הגנטי שלך אשר עשוי להוביל לסרטן. עם זאת, לא ידוע אם ממות ההידרזין אשר נוצרת במינונים המומלצים של דואודופה יכולה לגרום לכך.

ילדים ומתבגרים:

אין לתת דואודופה לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

בדיקות ומעקב:

ייתכן והרופא שלך יערוך לך בדיקות דם במידה ואתה מקבל תרופה זו.

ניתוחים:

לפני שאתה עובר ניתוח (כולל ניתוח הקשור בשיניים), ספר לרופא (או לרופא השיניים) שאתה נוטל דואודופה.

2.3 אינטראקציות בין תרופותיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר לכל כך לרופא או לרוקם.

אין לטויל דואודופה אם הינך נוטל תרופות לטיפול בדיכאון מסוג מעכביס סלקטיביים של האנזים MAO-A או מעכבי MAO לא סלקטיביים, כגון מוקלובמיד או פנלזין.

לפני תחילת הטיפול בדואודופה, יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח תרופות נוספות לטיפול ב:

- אנמיה - כגון: טבלייות ברזל.
- שפית - כגון: איזוניאזיד.
- חדרה - כגון: בנזודיאפינים.
- בחילה - כגון: מטוקלוראמיד.
- לחץ דם גבוה - כגון: נוגדי יתר לחץ דם.
- התכווצויות בכלי הדם - כגון: פאפאורין.
- פרכוסים (עוויתות) או אפילפסיה - כגון: פניטואין.
- מחלת פרקינסון - כגון: סולקאפא, אנטקאפאן, אמנטאדין.
- הפרעות פשויות - כגון אנטי-פסיכטיים, כולל: פנוטיאזים, בוטירופנונים וריסרידון.

רגישות לאלרגיות חמורות, אסתמה, דלקת כרונית של הסמפונות, מחלות לב ולחץ דם נמוך - כגון תרופות אנטיכולרגיות וסימפטומימטיות.

הגל נוטל תרופה אשר עלולה לגרום ללחץ דם נמוך. זה עלול לגרום לתופעה הנקראת "orthostatic hypotension" (נפילת לחץ דם תנוחתית) - בעת הקומה מהמיטה או מכיסא אתה עלול לחוש סחרחורת. דואודופה עלולה להחמיר מצב זה. יש לעבור תמיד מתנוחה לננוחה באיטיות.

2.4 שימוש בדואודופה עם מזון ושתייה:

במטופלים מסוימים, ייתכן שדואודופה לא תעבוד היטב במידה וניטלת עם, או זמן קצר לאחר אכילת מזון עשיר בחלבונים - כגון: בשר, ידגים, מוצרי חלב, זרעים ואגוזים. אם אתה חושב שנושא זה רלוונטי לך, יש להיוועץ ברופא שלך.

2.5 הריזון והנקה:

במידה ואת בהריון או מניקה, חושבת שאתה עלולה להיות בהריון או מתכננת להיכנס להריון היועצי ברופא שלך לפני תחילת הטיפול בדואודופה.

- אל תשתמשי בדואודופה אם הינך מניקה.

2.6 נהיגה ושימוש במכוונות:

אין לנהוג או להשתמש בכלים או מכונות לפני שאתה יודע כיצד דואודופה משפיעה עליך.

- דואודופה עלולה לגרום לך להיות ישוני מאוד, או שלעיתים, אתה עלול להירדם באופן פתאומי (התקפי שינה).
- דואודופה עלולה להוריד את לחץ הדם שלך ובעקבות כך לגרום לסחרחורת.

אין לנהוג או להשתמש במכוונות או כלים עד אשר אתה שוב מרגיש עירני לגמרי או עד שהסחרחורת חולפת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- יש להשתמש בתרופה תמיד לפי הוראות הרופא.
- המינון והטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
- עליך לבדוק עם הרופא או הרוקם אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

מידע לגבי דואודופה ג'ל והמשאבה

- דואודופה הוא גל אשר נכנס באמצעות המשאבה והצניורית לתוך המעיים (המעיי הדק) שלך.
- הג'ל מאוחסן בתוך קסטת מפלסטיק. הקסטת מחוברת למשאבה.
- המשאבה מחוברת לצניורית המאוחסנת במעיים (המעיי הדק) שלך.
- במהלך שעות היום אתה מקבל ממשקעים רציפים מינון נמוך של התרופה. המשמעות היא שרמת התרופה בדם שלך נשארת קבועה וחלק מתופעות הלוואי הקשורות לתנועה מתמעטות.

מינון דואודופה שניתן

- הרופא שלך יקבע את המינון ומשך זמן הטיפול בדואודופה.
- בדרך כלל, בבוקר ניתנת מנה גדולה יותר (מנת העמסה). זה מאפשר לך להגיע במהירות לרמת התרופה הרצויה בדם שלך. לאחר מנה זו, ניתן מינון מתמשך של התרופה (מנת אחזקה).
- במידת הצורך, ייתכן ותקבל מנות נוספות. הדבר יוחלט על ידי הרופא שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת מינון גבוה יותר

אם נטלת בטעות דואודופה במינון גבוה מדי או נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל יד נול התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

במקרים אלו עלולות להופיע התופעות הבאות:

- קושי בנרתיחות העיניים.
- התכווצויות שרירים בלתי נשלטות המשפיעות על העיניים, הראש, הצוואר והגוף (דיסטוניה).
- תנועות בלתי רצוניות (דיסקיניזיה).
- פעילות לב מהירות, איטיות או לא סדירות באופן יוצא דופן (הפרעת קצב).

אם הפסקת לקחת דואודופה או תוריד את המינון

אל תפסיק את הטיפול או תוריד את המינון של דואודופה אלא אם הרופא אומר לך לעשות זאת, היות והפסקה פתאומית או הורדה מהירה של מינון דואודופה עלולה לגרום לתופעה חמורה הנקראת: "תסמונת ניורולפטית ממאירה" (Neuroleptic Malignant Syndrome).

הסבירות להתרחשות תופעה זו עולה אם אתה נוטל גם תרופה אנטי-פסיכוטית (ראה סעיף 4 'תופעות לוואי חמורות').

אין להמדיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אין לטויל תרופות בחושרך בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקם.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדואודופה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות משימוש בדואודופה:

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות – ייתכן ותזדקק לטיפול רפואי דחוף:

- כאב חמור בעיניים, כאב ראש, ראייה מטושטשת, בחילה והקאה. אלו יכולים להיות סימנים לגלאוקומה צרת זווית. תופעה זו אינה שכיחה (תופעה שמופיעה ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000).
- חום, כאב בגרון או בפה או קושי במתן שתן, אלה עשויים להיות סימנים לבעיה בתאי הדם הלבנים הנקראת 'אגרנוולוציטוזיס'. הרופא שלך יערוך לך בדיקת דם על מנת לבדוק זאת. שכיחות תופעה זו הינה נדירה מאוד (תופעה שמופיעה בחלות ממשתמש אחד מתוך 10,000 אנשים).
- נפיחות דם בפה, נפיחה בעור מסוג סרפדת. אלה עשויים להוות סימנים בנשימה, או פריחה בשורף. תופעה זו נדירה (תופעה שמופיעה ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000).
- תופעה אלרגית חמורה (תגובה אנפילקטית). שכיחות תופעה זו אינה ידועה מהמידע הקיים.

פנה מיד לרופא שלך במידה ואתה מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

- 'תסמונת ניורולפטית ממאירה' (Neuroleptic Malignant Syndrome) - הסימנים לתופעה זו יכולים לכלול:
 - קצב לב מהיר, שינוי בלחץ הדם והזעה המלווים בחום.
 - נשימה מואצת, נוקשות שרירים, הכרה ירודה ותדרמות.
 - סימות גבוהות יותר של חלבון בדם שלך (אנזים הנקרא 'קראטין פוספוקינאז'). זה נמדד על ידי הרופא שלך.
- שכיחות תופעה זו נדירה (תופעה שמופיעה ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000).
- ראה סעיף 3 'כיצד תשתמש בתרופה?' וסעיף 2.2 'אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה':

תופעות לוואי נוספות משימוש בדואודופה:

ספר לרופא אם הינך מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) (תופעות שמופיעות ביותר משתמש אחד מעשרה):

- נפילה
- ירידה במשקל
- בחילה, עצירות
- חרדה, דיכאון, נודי שינה
- תנועות בלתי רצוניות (דיסקיניזיה), החמרה בתסמיני מחלת הפרקינסון
- תחושת סחרחורת כאשר נעמדים או משנים תנוחה ('orthostatic hypotension') הנובעת מלחץ דם נמוך. שנה תמיד תנוחות באיטיות - אל תעמוד מהר.

תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100):

- עלייה במשקל
- קצב לב לא סדיר
- איבוד תאבון
- תחושת עייפות, חולשה
- לחץ דם גבוה או נמוך
- אנמיה, רמות נמוכות של ברזל בדם
- כאב, כאב צוואר, התכווצויות שרירים, חולשת שרירים
- הירדמות פתאומית (התקפי שינה), ישונויות יתר, הפרעות שינה
- עלייה ברמת חומצות אמינו או הומוציסטאין בדם, רמות נמוכות מדי של ויטמין B6 - B12
- תחושת סחרחורת/תחושת עלפון, או התעלפות
- קושי בבלעיה או יובש בפה, שינוי בחוש הטעם (טעם מר בפה)
- כאב ראש
- תחושה מתקדמת של חולשה או כאב או קהות או איבוד תחושה באצבעות או בכפות הרגליים (פולינורופתיה)
- פריחות, גרד, זיעה מוגברת, נפיחות כתוצאה מעודף נוזלים (בצקת)
- קושי במתן שתן (אצירת שתן) או חוסר שליטה במתן שתן (ברירת שתן)
- ראייה, שמעיה או תחושה של דברים שאינם קיימים (הזיות), בלבול, חלומות לא רגילים, אי-שקט, התנהגות אימפולסבית, הפרעה פסיכוטית
- נפיחות בקיבה, שלשול, נפיחות (גזים בבטן), קושי עיכול (דיספפסיה), הקאה
- תסמינים של מחלת פרקינסון אשר חוזרים במהירות או כאשר הם לא צפויים - נקרא 'on-off effect'
- ירידה בחוש המישוש, התכווצויות שרירים בלתי נשלטות - המשפיעות על העיניים, הראש, הצוואר והגוף (דיסטוניה), רעד

הפרעות שליטה בדחפים – שינויים בהתנהגות שלך. אלו תופעות שכיחות, העלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 אנשים.

ישנם אנשים אשר אין ביכולתם לעמוד בפני דחף לבצע פעילות אשר עלולה להיות מזיקה לעצמם או לאחרים. זה יכול לכלול:

דחף חזק להלר מצורה מוגזמת למרות ההשלכות החמורות עליך או על משפחתך.

שינוי או עלייה במחשבות ובהתנהגויות מנייות, המדאיג אותך או את הסובבים אותך באופן משמעותי, עלול לכלול עלייה בדחף המיני.

בזבזנות או קנייית יתר, בצורה בלתי נשלטת.

אכילה מוגזמת או אכילה כמות גדולה של מזון בזמן קצר, או אכילה כפייתית

אכילה של יתר מאכל מותר ממנה שנוחץ לגוף שלך.

ספר לרופא אם אתה, משפחתך או מטפליך מבחינים באחת מההתנהגויות הללו. ייתכן והרופא שלך יבחן מחדש את הטיפול שלך, וידון איתך בדרכים לטפל או להפחית את התסמינים.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- שתן כהה
- צרירות, כאב בחזה
- נשירת שיער, אודם בעור, חרלת (hives)
- רוק מוגבר
- נפיחות בורידים (דלקת ורידים)
- שינוי בצורת ההליכה שלך
- ניסיון להתאבדות
- תחושת עייפות או תחושה כללית רעה
- דפיקות לב מהירות ולא סדירות (פלפלטיות)
- ספירת תאי דם לבנים נמוכה או שינויים בספירת תאי הדם, אשר עלולה לגרום לדימום
- בלבול, הרגשת אפוריה (התרוממות רוח יוצאת דופן), עלייה בחשק המיני, סיטוי חלקי, שיטיון (דמנציה), תחושת פחד
- קושי בשליטה בתנועות, ופעילות של תנועות חזקות שאתה לא יכול לשלוט עליהן
- קושי בפתירת העיניים שלך, ראייה כפולה, ראייה מטושטשת, נזק לעצב הראייה (אוסט עצב הראייה = optic ischaemic neuropathy)

תופעות לוואי נדירות (rare) (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- מחשבות חריגות
- דפוס נשימה לא סדיר
- זקפה ממושכת וכואבת
- סימנים או שמות חריגות על עורך שהופיעו או החמירו, או גידול בעור (מלנומה ממאירה)
- רוק או זיעה כהה, תחושת צריבה בלשון, חריקת שיניים, שיהוקים

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- השתוקקות למינון גבוה של דואודופה מעבר למינון הדרוש לשליטה בתסמינים המוטוריים, הידועה כתסמונת חוסר איזון הדופמין (dopamine dysregulation syndrome) חלק מהמטופלים חווים תנועות בלתי רצוניות חמורות (דיסקיניזיה), שינויים במצב הרוח או תופעות לוואי אחרות לאחר לקחה של מנה גדולה של דואודופה.

ספר לרופא אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי המוזכרות מעלה.

תופעות לוואי משימוש במשאבה או בצניורית:

תופעות הלוואי הבאות דווחו עבור המשאבה והצניורית. פנה לרופא או לאחות אם אתה חווה אחת מתופעות אלו.