

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

سريتايد ديسكوس 50/100 مكغ، مسحوق للإستنشاق

يحتوي كل مقدار دوائي على 50 ميكروغرام سالميتيرول (على شكل كسينافوات) (salmeterol as Xinafoate) / 100 ميكروغرام فلوتيكازون بروبيونات fluticasone propionate من مسحوق للإستنشاق.

سريتايد ديسكوس 50/250 مكغ، مسحوق للإستنشاق

يحتوي كل مقدار دوائي على 50 ميكروغرام سالميتيرول (على شكل كسينافوات) (salmeterol as Xinafoate) / 250 ميكروغرام فلوتيكازون بروبيونات fluticasone propionate من مسحوق للإستنشاق.

سريتايد ديسكوس 50/500 مكغ، مسحوق للإستنشاق

يحتوي كل مقدار دوائي على 50 ميكروغرام سالميتيرول (على شكل كسينافوات) (salmeterol as Xinafoate) / 500 ميكروغرام فلوتيكازون بروبيونات fluticasone propionate من مسحوق للإستنشاق.

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية أنظر الفقرة 2 - «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» والفقرة 6 - «معلومات إضافية».

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

- يحتوي سريتايد ديسكوس على مادتين فعالتين: سالميتيرول وفلوتيكازون بروبيونات:
- سالميتيرول عبارة عن موسع للقصبات الهوائية، ذو تأثير طويل المدى. موسعات القصبات الهوائية تساعد على بقاء الطرق التنفسية في الرئتين مفتوحة. هذا الأمر يسهل من دخول وخروج الهواء. يستمر التأثير 12 ساعة على الأقل.
 - فلوتيكازون بروبيونات عبارة عن كورتيكوستيروئيد الذي يقلل من إنتفاخ وتهيج في الرئتين. وصف الطبيب هذا الدواء للمساعدة على منع المشاكل التنفسية مثل:
 - الربو
 - COPD - سريتايد ديسكوس، بمقدار دوائي ذو 50/250 و- 50/500 ميكروغرام مخصص أيضاً لمعالجة المرض الرئوي الإنسدادي المزمن (COPD). الدواء يقلل عدد هبات أعراض COPD.

عليك استعمال سريتايد ديسكوس كل يوم كما أوصاك الطبيب. هذا يضمن بأن يعمل كما ينبغي في السيطرة على الربو أو COPD لديك.

سريتايد ديسكوس يساعد في منع ضيق التنفس والصفير مستقبلاً. مع ذلك، لا يجوز إستعمال سريتايد ديسكوس للتخفيف من نوبة مفاجئة لضيق في التنفس أو صفير. إذا حدث ذلك، عليك إستعمال منشقة للتخفيف السريع، مثل سالبوتامول. عليك دائماً أن تحمل معك منشقة للتخفيف السريع.

الفصيلة العلاجية

سالميتيرول هو مقلد للمستقبل بيتا-2. فلوتيكازون بروبيونات هو كورتيكوستيروئيد.

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:
إذا كنت حساساً (أليرجي) لسالميتيرول، فلوتيكازون، فلوتيكازون، فلوبيونات أو للمركب غير الفعال لكتوز مونوهيدرات الذي يحتويه الدواء كما هو مفصل في الفقرة 6.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بـ سريتايد ديسكوس، إحك لطبيبك إذا وجد لديك:

- مرض قلبي، يشمل نظم قلب غير منتظم أو سريع
- فرط نشاط الغدة الدرقية
- ارتفاع ضغط الدم
- السكري (سريتايد ديسكوس قد يرفع السكر في دمك)
- انخفاض البوتاسيوم في دمك
- السل (TB) حالياً أو في الماضي، أو تلوثات أخرى في الرئتين
- إتصل بطبيبك إذا قاسيت من تشوش في الرؤية أو من اضطرابات أخرى في الرؤية.

الأطفال والمراهقون

- لا يوصى باستعمال سريتايد ديسكوس لدى أطفال دون عمر 4 سنوات.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية للربو، أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. نظراً لأن سريتايد ديسكوس قد لا يكون مناسباً للإستعمال سوية مع بعض الأدوية الأخرى.

قبل بدء استعمال سريتايد ديسكوس، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

- حاجبات بيتا (مثل: أتينولول، بروبيرانولول، سوتالول). تستعمل حاجبات بيتا بالأخص لمعالجة ارتفاع ضغط الدم أو لمعالجة حالات قلبية أخرى.
- أدوية لعلاج التلوثات (مثل: كيتوكونازول، إيتراكونازول وإيريترومييسين)، بما في ذلك أدوية معينة لعلاج تلوث الـ HIV (مثل: ريتونافير وأدوية تحتوي على كوبيسيسينات). بعض هذه الأدوية قد تزيد كمية فلوتيكازون و بروبيونات أو سالميتيرول في جسمك. هذا الأمر قد يزيد الخطورة لديك للمعاناة من الأعراض الجانبية لـ سريتايد ديسكوس، يشمل ذلك عدم إنتظام نظم القلب، أو قد يفاقم الأعراض الجانبية. إذا كنت تستعمل هذه الأدوية، فمن الجائز أن يرغب طبيبك في إجراء متابعة ومراقبة بشكل دقيق لحالتك.
- كورتيكوستيرويدات (عن طريق الفم أو بالحقن). إذا تناولت هذه الأدوية مؤخراً، فهذا قد يزيد خطورة تأثير هذا الدواء على الغدة الكظرية لديك.
- مدرات بولية، التي تستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
- موسعات أخرى للقصبات الهوائية (مثل سالبوتامول).
- أدوية من نوع كسانتينات، تستعمل هذه الأدوية في أحيان متقاربة لعلاج الربو.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنك قد تكونين حاملاً أو أنك تخططين للحمل، إستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

السياقة واستعمال الماكينات

من غير المحتمل أن يؤثر سريتايد ديسكوس على قدرتك على السياقة أو استعمال الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي سريتايد ديسكوس حتى 12.5 ميلليغرام لكتوز مونوهيدرات بكل مقدار دوائي. إن كمية اللكتوز في هذا الدواء لا تسبب عادة مشاكل لدى الأشخاص الذين لديهم عدم تحمل للكتوز. إن المركب غير الفعال لكتوز مونوهيدرات يحتوي على كميات قليلة من بروتينات الحليب، التي قد تسبب ردود فعل تحسسية.

(3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. إستعمل سريتايد ديسكوس خاصتك في كل يوم، إلى أن يرشدك طبيبك بالتوقف. لا تستعمل أكثر من المقدار الدوائي الموصى به.

لا تتوقف عن إستعمال سريتايد ديسكوس أو تخفض المقدار الدوائي، من دون التحدث مع طبيبك قبل ذلك.

يجب إستنشاق سريتايد ديسكوس عبر الفم إلى داخل الرئتين.

من الجائز ألا تشعر بملس المسحوق أو طعمه على لسانك، حتى ولو إستعملت منشقة ديسكوس بشكل صحيح.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

للربو

الكبار والمراهقين بعمر 12 سنة وما فوق

- سريتايد ديسكوس 50/100 مكغ - نشقة واحدة مرتين في اليوم.
- سريتايد ديسكوس 50/250 مكغ - نشقة واحدة مرتين في اليوم.
- سريتايد ديسكوس 50/500 مكغ - نشقة واحدة مرتين في اليوم.

الأطفال بعمر 4 حتى 12 سنة

- سريتايد ديسكوس 50/100 مكغ - نشقة واحدة مرتين في اليوم.
- لا يوصى بإستعمال سريتايد ديسكوس لدى أطفال دون عمر 4 سنين.

لكبار لديهم مرض رئوي إنسدادي مزمن (COPD)

- سريتايد ديسكوس 50/250 مكغ - نشقة واحدة مرتين في اليوم.
- سريتايد ديسكوس 50/500 مكغ - نشقة واحدة مرتين في اليوم.

من الجائز السيطرة على الأعراض لديك بشكل جيد أثناء إستعمال سريتايد ديسكوس مرتين في اليوم. إذا حصل ذلك، فمن الجائز أن يقرر طبيبك على تقليل مقدارك الدوائي إلى مرة في اليوم. المقدار الدوائي يمكن أن يتغير إلى:

- مرة واحدة في الليل - إذا كانت لديك أعراض في ساعات الليل.
- مرة واحدة في الصباح - إذا كانت لديك أعراض في ساعات اليوم.

مهم جداً التصرف حسب تعليمات طبيبك بالنسبة لكمية النشقات الواجب استعمالها والوتيرة التي يجب بها إستعمال دوائك.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا كنت تستعمل سريتايد ديسكوس لعلاج الربو، سوف يرغب طبيبك بفحص الأعراض لديك بشكل منتظم.


إذا تفاقم الربو لديك أو إذا تفاقم تنفسك بلغ طبيبك حالاً. من الجائز أن تشعر بتزايد الصغير لديك، وأن تشعر بأوقات متقاربة أكثر بضغط في صدرك أو أن عليك أن تستعمل بكثرة دواء للتخفيف السريع. إذا حدث واحد من هذه الأمور، فعليك مواصلة استعمال سريتايد ديسكوس، ولكن لا تزيد عدد النشقات التي تستعملها. من الجائز أن تتفاقم الحالة في صدرك وأنت قد تصبح مريضاً بشكل خطير. توجه إلى طبيبك، لأنه من الجائز أن تحتاج لعلاج إضافي.

تعليمات الإستعمال


- على الطبيب، الممرضة أو الصيدلي خاصتك أن يريك كيفية استعمال منشقتك. عليهم التأكد من كيفية إستعمالك للمنشقة من حين لآخر. المعنى بإستعمال غير صحيح بـ سريتايد ديسكوس أو بشكل مغاير عما وصف لك قد يؤدي لعدم مساعدتك في الربو أو بمرض COPD لديك كما هو مفترض.
- إن منشقة الديسكوس تحتوي على عبوة ذات مقادير دوائية تم تقسيمها مسبقاً (بليستر) حيث تحتوي بداخلها الدواء سريتايد ديسكوس على شكل مسحوق.
- في القسم العلوي من الديسكوس يوجد عداد حيث يبين كم مقدار دوائي تبقى. هو يقوم بالعد التنازلي حتى 0 (صفر). الأعداد من 5 (خمسة) حتى 0 (صفر) تظهر بلون أحمر لتحذيرك بأنه تبقى فقط مقادير معدودة. عندما يُظهر العداد 0 (صفر)، فإن منشقتك قد فرغت.

استعمال منشقتك

1. من أجل فتح الديسكوس خاصتك، امسك الغطاء الخارجي بيد واحدة وضع إبهام يدك الثانية على مقبض الإبهام. ادفع الإبهام بعيداً عنك ما أمكن. ستسمع صوت طقة. هذه العملية ستفتح ثقب صغير في الفوهة.




2. امسك الديسكوس خاصتك بحيث تتجه الفوهة بإتجاهك. يمكنك مسكه بيدك اليمنى أو اليسرى. حرّك الرافعة بعيداً عنك بقدر ما أمكن. ستسمع صوت طقة. هذه العملية تضع مقداراً من دوائك داخل الفوهة.




- في كل مرة يتم فيها إبعاد الرافعة إلى الوراء تفتح داخل المنشقة إحدى المقادير الدوائية المقسمة في العبوة ويكون المسحوق جاهزاً للإستنشاق من أجلك. لا تقم باللعب بالرافعة لأن هذه العملية تفتح المقادير المقسمة مسبقاً وتهدر من الدواء.
3. امسك الديسكوس بعيداً عن فمك، أزر إلى الخارج طالما أنت تشعر بارتياح. لا تزر لداخل الديسكوس خاصتك.
 4. أطبق شفثيك على الفوهة؛ قم بالإستنشاق إلى الداخل بشكل ثابت وعميق عن طريق الديسكوس، وليس عن طريق أنفك. أخرج الديسكوس من فمك. توقف عن التنفس لمدة 10 ثوان تقريباً أو لطالما هذا يريحك.

أزفر إلى الخارج ببطء.



5. اشطف فمك بعد ذلك بالماء وقم ببصقه خارجاً و/أو قم بتفريش أسنانك. هذا العمل يمكن أن يساعد على منع فطر الفم ومن أن تحصل لديك بحة.

6. لإغلاق الديسكوس، حرّك مقبض الإبهام إلى الوراء باتجاهك بعيداً ما أمكن. ستسمع صوت طقة. تعود الرافعة إلى مكانها الأصلي وتعود إلى حالة إعادة الضبط.



الديسكوس خاصتك جاهز الآن للإستعمال من جديد من أجلك.

كما هو الحال في المناشِق الأخرى، على المعالج التأكّد من أن الأطفال الذين يستعملون سريتايد ديسكوس يطبقون تقنية الإستنشاق الصحيحة، كما هو موصوف أعلاه.

تنظيف منشقتك

امسح فوهة الديسكوس بمنديل ورقي جاف من أجل تنظيفه.

إذا إستنشقت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

من المهم استعمال المنشقة حسب التعليمات. إذا إستنشقت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر من الموصى به، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي خاصتك. من الجائز أن تلاحظ بأن قلبك ينبض بشكل أسرع من المعتاد والشعور بعدم ثبات. من الجائز أيضاً أن يحدث لديك دوار، صداع، ضعف عضلي وآلام في المفاصل. إذا استعملت مقادير دوائية أكبر خلال فترة طويلة، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي خاصتك. ذلك لأن المقادير الدوائية الكبيرة من سريتايد ديسكوس قد تقلل كمية الهرمونات الستيروئيدية التي تنتج من قبل الغدة الكظرية. إذا إستنشقت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا إستنشقت طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال سريتايد ديسكوس

إذا نسيت إستنشاق هذا الدواء في الوقت المحدد، لا تستنشق مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. إستنشق المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي واستشر الطبيب. يجب المواظبة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب.

في حال توقفك عن استعمال سريتايد ديسكوس

من المهم جداً أن تستعمل سريتايد ديسكوس خاصتك كل يوم كما أوصيت. إستمر بإستعماله إلى أن يبلغك طبيبك بالتوقف. لا تتوقف أو لا تقلل مقدارك الدوائي من سريتايد ديسكوس خاصتك بشكل مفاجئ. فهذا قد يؤدي لتفاقم في التنفس لديك.

بالإضافة، إذا توقفت عن استعمال سريتايد ديسكوس بشكل مفاجئ، أو إذا قمت بتخفيض المقدار الدوائي من سريتايد ديسكوس، فقد تحدث لك (في أحيان نادرة جداً) مشاكل في الغدة الكظرية (adrenal) لديك (قصور الغدة الكظرية) الأمر الذي يمكن أن يسبب أحياناً أعراضاً جانبية.

الأعراض الجانبية تلك يمكن أن تشمل أياً مما يلي:

- ألم في البطن
- إرهاق وقلة الشهية للطعام، الشعور بوعكة
- غثيان وإسهال
- إنخفاض الوزن
- صداع أو نعاس
- إنخفاض نسب السكر في دمك
- ضغط دم منخفض واختلاجات

عندما يكون جسمك بحالة ضغط مثل سخونة، صدمة (مثل حادث طرق)، تلوث أو عملية جراحية، فإن قصور الغدة الكظرية يمكن أن يتفاقم وقد تحدث لديك أياً من الأعراض الجانبية المدونة أعلاه.

إذا لاحظت أية أعراض جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. من أجل منع حدوث هذه الأعراض، من الجائز أن يصف لك طبيبك كورتيكوستيروئيدات إضافية بشكل قرص (مثل بريدنيزولون).

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال سريتايد ديسكوس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

من أجل تقليل احتمال حدوث أعراض جانبية، يصف لك طبيبك المقدار الدوائي الأصغر من سريتايد ديسكوس من أجل السيطرة على الربو أو COPD لديك.

ردود فعل تحسسية: من الجائز أن تلاحظ تفاقم في تنفسك بشكل مفاجئ مباشرة بعد استعمال سريتايد ديسكوس. قد يحدث لديك صفير شديد وسعال أو تقاسي من ضيق في التنفس. أنت قد تلاحظ أيضاً حكة، طفح (تدرنات حاككة [شرى]) وابتفاح (عادة في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة) أو أنك قد تشعر بشكل مفاجئ بأن قلبك ينبض بشكل سريع جداً أو أنك تشعر بأنك توشك على الإغماء أو بدوار (الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إتهار أو فقدان للوعي). إذا كنت تعاني من أي واحد من هذه الأعراض أو إذا حدثت بشكل مفاجئ بعد استعمال سريتايد ديسكوس، توقف عن استعمال سريتايد ديسكوس وتوجه حالاً إلى الطبيب. ردود الفعل التحسسية لسريتايد ديسكوس هي غير شائعة (هي تؤثر على أقل من شخص 1 من بين 100).

إلتهاب الرئتين لدى مرضى COPD (عرض جانبي شائع)

إحك طبيبك إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض التالية خلال فترة استعمال سريتايد ديسكوس. هذه يمكن أن تكون أعراض لإلتهاب الرئتين:

- سخونة أو قشعريرة
- تزايد إنتاج البلغم، تغير في لون البلغم

- تزايد السعال أو تزايد صعوبات التنفس

أعراض جانبية أخرى مفصلة فيما يلي:

أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من شخص 1 من بين 10)

- صداع - يتحسن عادة في سياق العلاج.
- بُلغ عن عدد أكبر من حالات الرشح لدى متعالي COPD.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى أقل من شخص 1 من بين 10)

- فطر (بقع مؤلمة، بارزة، بلون كريم - أصفر) في الفم وفي الحنجرة. إضافة لذلك آلام في اللسان، بحة وتهيج في الحنجرة. إن شطف فمك بالماء وبصقه خارجاً حالاً و/أو تفريش أسنانك بعد استعمال أي مقدار دوائي من دوائك من شأنه أن يساعدك. من الجائز أن يصف لك طبيبك دواء مضاد للفطريات لمعالجة فطر الفم.
- آلام وإنتفاخ في المفاصل وآلام عضلية.
- تقلصات عضلية.

بُلغ أيضاً عن حدوث الأعراض الجانبية التالية لدى متعالجين لديهم مرض رئوي انسدادى مزمن (COPD):

- كدمات وكسور.
- إلتهاب الحيوب الأنفية (الشعور بضغط أو إحتقان في الأنف، في الخدين ومن خلف العينين، أحياناً مع ألم نابض).
- إنخفاض كمية البوتاسيوم في الدم (من الجائز أن تشعر بنبض غير متجانس، ضعف عضلات، تقلصات).

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى أقل من شخص 1 من بين 100)

- إرتفاع كمية السكر (الجلوكوز) في دمك (فرط سكر الدم). إذا كان لديك سكري، فمن الجائز أن يتطلب الأمر مراقبة للسكر في الدم بشكل أكثر تكراراً ويمكن أن يتطلب ملاءمة علاجك العادي للسكري.
- كاتاركت (تعكر عدسة العين).
- نبض سريع جداً (تسرع القلب).
- الشعور بعدم الثبات (رجفان) ونبض سريع أو غير منتظم (ضربات قلب) - هذه غير ضارة عادة وتقل في سياق العلاج.
- ألم في الصدر.
- الشعور بالقلق (تحدث هذه الظاهرة لدى الأطفال خاصة).
- إضطرابات في النوم.
- طفح تحسسي في الجلد.

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى أقل من شخص 1 من بين 1,000)

- صعوبات في التنفس أو صفير التي تتفاقم حالاً بعد استعمال سريتايد ديسكوس. إذا حدث ذلك توقف عن استعمال سريتايد ديسكوس خاصتك. استعمل منشقتك للتخفيف السريع لكي تساعدك على التنفس وبلغ طبيبك حالاً.
- سريتايد ديسكوس قد يؤثر على الإنتاج السليم للهورمونات الستيرويدية في الجسم، بالأخص إذا استعملت مقادير دوائية كبيرة لفترة طويلة. تشمل التأثيرات:
 - تباطؤ النمو لدى الأطفال والمراهقين
 - إنخفاض كثافة العظم
 - جلوكوما
 - زيادة في الوزن
 - وجه مستدير (على شكل القمر) (متلازمة كوشينغ)
- يقوم طبيبك بفحصك بشكل منتظم بالنسبة لكل واحد من هذه الأعراض الجانبية ويقوم بالتأكد من استعمالك للمقدار الدوائي الأخفض من سريتايد ديسكوس من أجل السيطرة على الربو لديك.

- تغيرات في السلوك، مثلاً إذا كنت نشطاً بشكل مغاير عن المعتاد وتغضب بسهولة (هذه التأثيرات تحدث خاصة لدى الأطفال).
- نبض غير منتظم أو نبضة إضافية للقلب (إضطرابات في النظم). بلغ طبيبك، ولكن لا تتوقف عن استعمال سريتايد ديسكوس إلا إذا بلغك الطبيب بالتوقف.
- تلوث فطري في المريء، الذي قد يؤدي إلى صعوبات في البلع.

أعراض جانبية بوتيرة غير معروفة، لكن من الجائز أن تحدث أيضاً:

- إكتئاب أو عدوانية. من المحتمل أكثر ظهور هذه الأعراض لدى الأطفال.
- تشوش الرؤية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية.

6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً - lactose monohydrate (الذي يحتوي على بروتينات الحليب).
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة - تحتوي منشقة الـ ديسكوس بداخلها على شريط من الألومنيوم الذي يقسم مسحوق الإستنشاق إلى مقادير دوائية معيارية، وتحميه من التماس مع الهواء. الجهاز معبأ ضمن عبوة فيها ديسكوس 1 يحوي 60 مقدار دوائي للإستنشاق.
- صاحب الإمتياز: جلاكسوسميثكلين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح - تكفا.
- المنتج: جلاكسو ويلكام پرودكشن، إيفرا، فرنسا.

● رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سريتيد ديسكوس 50/ 100 مكغ: 114-13-29551

سريتيد ديسكوس 50/ 250 مكغ: 114-15-29553

سريتيد ديسكوس 50/ 500 مكغ: 114-14-29552

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في تشرين الأول 2020.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.

© 2021 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Seretide PT v7B