

المواد غير الفعالة، ومسننات الحولى، وجيمستودين (Gestodene)، إستراديول (Ethinylestradiol)

- ٥٠ وضع طبعي الذي يغطي العروق موسبيثين في الدم**

 - كنت تعانين أو عانيت من الصفر الريدي بداعٍ لارتفاع درجة حرارة جسمك.
 - كنت تعانين أو عانيت من ارتفاع درجة حرارة جسمك.
 - عانتي في الماضي من مرضاً مزمناً مثل الطبيب والطافر وكيل الماء.
 - كنت تعانين أو عانيت من التهاب الكلى أو المثانة.
 - كنت تعانين من التهاب المثانة أو التهاب المجرى الهضمي.
 - وكلت تتناولين مستحضرات أو ملبيات مائية أو زيتاً بذر اليقطين.
 - أيضاً بذلت مساعداً لتعالج من الأمورية.

٥١. وصف طبعي الذي يغطي العروق موسبيثين على الشبل

استراديول (Ethynodiol dihydrogen phosphate) 0.02 ملجم وجيستودين (Gestodene) 0.075 ملجم

**٥٢. الدواء غير الفعالة وسبلاته الحساسية (ستارجات)
٥٣. معلومات إضافية وبند 2- عمليات ممهدة**

أ- اظفي إلى نند "معلومات إضافية" وبند 2- "عمليات ممهدة" حول جزء من مرتكبات الدواء.

٥٤. إقلاقني بشدة يعلن حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

اقرئي بشدة هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء، إذا كانتين قد أخذت سلطة إضافية، توجهي إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

٥٥. هذا الدواء وصف للعلاج لأمراض لا تعلمهها الآخرين، فهو قد يسبب الضرار لهم حتى إذا دايرت أن يضعون الطبي مشاهة.

٥٦. إذا كنت تعانين من أحد هذه الأمراض، اطلب رأياً طبياً الأولي، يذكر في ذلك سبب اشتغال الطبيب معك.

٥٧. قد تكون أكثر حموميةً مدمجةً وعن الداء

أ- عند استعمال الشكل الصحيح، وسلل منع الحمل البربرونية المتقدمة ثنيتها واحدة منطرق المكثنة (الفترة العكس)

الأكثر مؤثرةً لمنع الحمل أنها تزيد قليلاً من الاختثار

الحطاطة المومية في الأمعاء والشرائط، وأقلاعه في النساء الأولى وعددية

الاعراض الجلدية مومية الخصائص، مما ينفع منع حمل هرمونية

بربرونية، وذلك في المرة الأولى، لأنها أثقل

• سمبٌ بعد موعد ٤ أسبوعٍ
عليك أن تكوني متيقظةً وتوجه
أن لديك أعراض جلطة دم
نحويةً (١).

- تعتني من الأوضاع الطبية أو هذه الشدة

إذا كانت بحاجة للخصوص لفهد تتطلبون فرص لمنع المرض

توفر على تنقق فحوصات المساعدة

متى عليك التوجه إلى الطبيب؟

توجيه رسالتى معاً من جلطات

إذا لاحظت علامات ممكناً تحدث

إذا رأى أنه قد تكون خطوة مد

في الاتورة العصبية، جلطة

دوغرى، توقيبة أو سكتة دماغ

جذبية في الوقت، الرجاء تناول

فطام في حال نسيت فرص أو إذا كنت متذمّن بـ ذلك حمل.

جزء من الأوضاع المذكورة

أعراض لمنع المرض، أو أنها

من الممكن أن تتمكّن من استد

تماعبة مقدمة أكثر إذا طلب

الطبيب إذا كان أحد أحد

يتطور أو يفاقم خلل تناول

إذا كنت تعانين من مرض

القولون (مرض القولون)

إذا كنت تعانين من ثانية

مرض العصب الريني يوغرى على

إذا كنت تعانين من متلازمة

في تحوط المرض الذي يوغرى إلى

إذا كنت تعانين من فقر دم

الماء

إذا تم تناولها لفترة طويلة قد تقلل حبوب من منع الإختثار من المرض سرطان المبيض والبروستات

حبوب منع الحمل لا تحمي من أمراض التي تنتقل بالتمام

الجينس مثل الإيدز أو المنورة فقط كثرة من مستويه المسامة بذلك

هذا الراوند قد يرفع الإختثار لديك لأعراض مثل جلطات

تمزيع وسرطان الدم

هذا نساء إنتقام لا يمكنهن استعمال حبوب منع الحمل

سببي وضعيين الطبي، الرجال أقرن الشرارة للذكور بل فيليم

يلامك

لمعنى الحمل من المهم تناول فيليم وفاف للعلامات والبدء بزمرة

جيديه في الوقت، الرجاء تناوله بذلك يخفيف ما علىك

فطام في حال نسيت فرص أو إذا كنت متذمّن بـ ذلك حمل.

١. لاي غرض مخصوص الماء؟

فيليم مخصوص لمنع الحمل.

الفصلية المائية، فيليم تابع لمجموعة أدوية تدعى أقراص من الهرمونات الأنوثية، إستروجين (فينيل استرويدول) وبيروجستين (فينوسيد).

هذه الهرمونات تمنع الحمل بـ 3 طرق، عن طريق منع تحرير بريوستين، تكافف الإفراز من حق المرض الذي يصعب اخراج

الحيوانات المنوية للرحم ومنع الكائن المطلوب

بلطنة الرحم من أجل غرس الريبوستين.

عدا استعماله كصحيف تغثير أقراص منع الحمل واحد من الحق المرض المحسنة (الفلينة العنكبوت)

الأكثر موافقة لمنع الحمل.

حبوب منع الحمل لا تسبب المضاعفة وقت القيام

ملاحة، حنة

- غالباً حبوب منع
الشهرية منتظمة،
- حبوب منع الحمل

• مس بین 10,000 و

- من بين 10,000، امرأة مرضت بسرطان الثدي وتلقيت جوب من حمل المدة 5 سنوات في بداية سنوات الـ 30 لحياتها، مما يقارب 110 سنه.
 - الاختلاط لدلك المرض سرطان الثدي حتى يلوغ عمره 45 سنة.
 - إذا يوجد لديك فربة عائلة (أم، اخت أو جد) التي مرضت بسرطان الثدي.
 - إذا كنت تعانين من متلازمة مفرطة وظيفة الكظر.
 - توجهي فربة إلى الطبيب إذا كنت تلاحظين تغيرات في الثديين، تقويم في البالد، تغيرات في الحالة أو إذا كنت تلاحظين أو تشعررين به.
 - وجَدَّ أن تناول جوب لمنع الحمل مرتقباً أيضاً من هذه الحالات ولكن قلق وظهوره على المريض غير سلطاني، وجَدَ أن جوب منع الحمل مرتقبة في حالات أكثر شدة، وجَدَ أن جوب منع الحمل تناوله في الأدوية المفقرة معه معينة من سرطان الكبد لدى نساء الوالوات.
 - توجهي فربة إلى الطبيب إذا كنت تشعررين بالملطف وخيوم أضرار بغير معرفة العينين (برقان). من الممكن أن تحتاجي إلى التوقف عن استعمال فلبيل.
 - **اضطرابات نفسية**
نسماء غالينات الوالوات يستخدمن سائل هرمونية لمنع الحمل بما في ذلك قليوم بنتاليون عن الكتاب أو حالة نفسية ممكثنة، قد يكون الكتاب جدي وحيثما يوحي للأفراد انتشارية.
 - إذا كنت تعانين من تغيرات في حالة النفسية وأعراض الملل والآلام، واستعمل طبليك لاستشر طبيبة اضافية في أقرب وقت ممكن.
 - **التدخين**
إذا كنت مدخنة يجب إبلاغ الطبيب بذلك قبل بدء العلاج بهذا الدواء.
 - **الاختلاط لثمار رديني واعراض جانبية جدية**
بالنقل وبالاوية المرضية، المريضة تتناول جوب لمنع الحمل، برقة مع الحمل هذا الاختلاط يترافق لدى سمات الحجر، خاصة إذا كان فرق جيل بين الحبل، يوحي بعدم التدخين أثناء استعمال جوب لمنع الحمل.
 - إذا كنت غير مدخنة على التوقف عن التدخين وكتقى 35 سنة، قد يوصيك طبيبك باستعمال وسيلة منع حمل من نوع آخر.
 - **الفحوصات والمتابعة**
 - قبل البدء باستعمال المدرة الأولى، سيسألك الطبيب بخصوص ماضيك الطبي، والخاص بعائلتك سفهون ضبط ماءه وسيقني إنتمال ياك حامل.
 - من المفضل أن تكون هناك حاجة لفحوصات إضافية تفحص التثنين، لكن فقط إذا هناك حاجة لهذه الفحوصات لا جاكل أو في حال كانت لديك مخاوف خاصة.
 - إثناء فترة العلاج يجب إجراء مراجعت دورية لدى طبيبه، بما في ذلك حصر مصباح عرق الرحم.
 - افحصي كل شهر فيما إذا طرأت تغيرات في التثنين والحلامات، أخرى الطبيب إذا كنت تلاحظين أو تشعررين بأي تغير مثل كتل أو ثوب في البطن.
 - قبل عملية جراحية، تأكدي بأن الطبيب يعرف بأنك تتناولين قليوم من الممكن أن يطلب منه إيقاف تناول الجبة 4-6 أسبوعاً قبل العملية الجراحية، وذلك لخفض خطر الاختلاط المرضية (النظري بـ 2% "خطاطن مووية" يوحي لك الطبيب حتى تستعملين الدهاء بتناول الجبة مجدداً).
 - **تقاعدات بين الأدوية**
إذا كنت تأخذين، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة وأضافات مختلفة، أخرى الطبيب أو الصيدلي بذلك على وجهه.
 - أدلة الأدوية التالية التي قد تؤثر على مستويات قليوم بالدم.
 - **دواء لعلاج الصرع مثل باربازيتات، بريدينون، فنتوتين، كاربازيتون، أو إسكاربازيتين، وكيربرامات**
وأدوية معينة لعلاج ضرب الأذين (HIV) والتهاب الكبد من نوع C (تشعّشلات بوتوز، وسووجه الطبيب حتى تستعملين الدهاء بتناول الجبة مجدداً).
 - **قلقيون وفريجين**
إذا كنت تأخذين، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة وأدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة وأضافات مختلفة، أخرى الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذين أحد الأدوية التالية التي قد تؤثر على مستويات قليوم بالدم.
 - **جرسوقيون**
إذا كنت تأخذين، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة وأدوية لعلاج الصرع مثل باربازيتات، بريدينون، فنتوتين، كاربازيتون، أو إسكاربازيتين، وكيربرامات
 - **C** (تشعّشلات بوتوز، وسووجه الطبيب حتى تستعملين الدهاء بتناول الجبة مجدداً)
 - **reverse transcriptase inhibitors**
قلقيون وفريجين
 - **جرسوقيون**
إذا كنت تأخذين، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة وأدوية لعلاج الصرع مثل باربازيتات، بريدينون، فنتوتين، كاربازيتون، أو إسكاربازيتين، وكيربرامات
 - **مشطلات الإنزيم CYP3A4** مثل ايتراكونازول، فاركيزونازول، وفوكوزانازول (أدوية لعلاج ثولات المايكروبلات) (مثل لريثرو-ميسيين) التي قد ترفع من مستويات الإستروجين والأدوية التي قد تؤثر على مستويات قليوم في الدم
 - **مضادات حيوية** لعلاج أمراض ثلوثية مثل رفاميسينين
 - **المستحضر النباتي** St. John's wort (هيربروك)
إلاع الحالات المزاجية الاكتئابية
 - **أونوريوكسيك** (تسريع تناول الطعام وسكن الهم)
 - **أدوية التي قد يرتفع تركيزها في الدم عند الاستعمال مع قليوم** - سيلوكوزين، فنتوتين، فوكوريلين، أو دوية التي قد ينخفض تركيزها في الدم عند الاستعمال مع قليوم - لاموتروجين