

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! הרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוחן ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להקה לאילו הרואה מפושתת מהרופה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התגובה (exp. date) המופיע על גבי אריזת הקרטון והבקבוקן. תאריך התגובה מתייחס ליום האחרון שיכוחות - תופעות שמופיעות ב- 1-10,000 מתרן.
- יש לאחסן מתחת לאיזור החדר או ארון חודש.
- יציבות לאחר הפעילה והנחיות נספנות לצוות המטפל מופיעות בסוף העלון בפרק: Information for the healthcare professional.
- אין להשתמש בתרופה אם אתה מבחין שהארזה נפגמה.

6. מידע נוסף

- נספן על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Mannitol, sodium citrate, water for injection
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האזיה: **התמיסה:** צוללה וחסורת צבע. **הבקבוקן:** בקבוקון 100 מ"ל, מפלסטיק חסר-צבע, פקק גומי אפור ומכסה נפתח מאלומיניום. האזיה מכילה 1, 3 או 6 בקבוקונים. יתכן ולא כל גידל האזיה משוקקים.
- **בעל הרישום והיבואן וכותבו:** נוברטיס ישראל בע"מ, ת"ד 7126, תל אביב.
- נערך בדצמבר 2020 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 135 99 31323
- לשם הפצתו ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

במטופלים עם محلת FAG'ט, דוחו מקרים של תסנים של רמות סייד נמוכות בدم (היפוקלצמיה) כגון עוויות שרירים או חוסר תחושה, או תחושת עקצוץ במיחס באוזר מסביב לפה. תופעות לוואי שאין שיכוחות - תופעות שמופיעות ב- 1-10,000 מתרן.

3. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקלסטה עלול לגרום לתופעות תא-DEM אדונומיים; חסור תאבון; נזוד Shinna; שנינוות שעשויה לכלול: ראייה בעירינות ובמודעות; תחושת עקצוץ או חסור תחשוה; עיפויות קיצונית; רעד; אובדן הכרה Zemini; יהום בעין או גירוי או לדלקת עם כאב ואדם-ণיות; תחושת סחרור; עליה בלחץ-הדם; הסמקה; שיעול; קוצר-נשימה; קשי' עיכול; כאב בטן; עיצרות; ייש בשפה; צרבת; פריחה בעור; הזעה מוגברת; גרד; האמתה של העור; כאב צואואר; נקשות שלשרים, בעצמות;/או במפרקים; כאב בראשי החזה שלך ולושה מים. תופעות לוואי המושגשות לטיפול בזיהומים מס'ים[ם] (סוג מוד') לכליות שלך (כגון אמיגוג'יק'יז'דים [סוג מוד'] או משלנים (ספס) המשמשת לטיפול בזיהומים מס'ים[ם] (סוג מוד') או משלנים (ספס) או גירוי או לדלקת עם כאב ואדם-ণיות; תחושת סחרור; עליה תופעות לוואי הקשורות לעורי הראשן לראשונה, אבל הן פחות שכוחות לאחר העוריים העוקבים.

רבות תופעות הללו, כגון צרפת, פריחה בעור; הזעה מוגברת; מרבית תופעות הללו, כגון צרפת, פריחה בעור; הזעה מוגברת; במפרקים; כאב ראש, מחרחות בשלושת הימים הראשונים או לאח המנה של אקלסטה. התסנים הם מדרכן לכל קלים עד ביניים וועלם מוך בראשי החזה שלך ולושה מים. הרופא שלך יכול לבדוק תופעות לוואי אלו. הסיכוי לחותות מוגברת או פרצטמול משך אבאים בעל עצמה מתונה כזו איבופרופן או פרצטמול להפחחת תופעות לוואי אלו. הסיכוי לחותות מוגברת או פרצטמול יורד עם המנת העוקבות של אקלסטה.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקלסטה עלול לגרום לתופעות

לאובי בחולק המושגשות לטיפול בזיהומים מס'ים[ם] (סוג מוד') או גירוי או לדלקת עם כאב ואדם-ণיות; תחושת סחרור; עליה תופעות לוואי הקשורות לעורי הראשן לראשונה, אבל הן פחות שכוחות לאחר העוריים העוקבים.

5. הירין והנקה

אפשר לך לקבל אקלסטה אם אתה בהריון או מיניקה, חשוב

שאתה עשויה להיות בהריון או מתכונת להיכנס להריון. היועץ עם הרופא שלך, הרופך או האחוט לפני טיפולת תרופה זו.

6. נגיעה ושימוש במקונות

שhaija גם החומר הפעיל באקלסטה (חומצה זולדרונית),

משמשת במטופלים מבוגרים עצמאית או כדי להפחית את כמותם או להשתמש במקונות עד שאתה מרגיש טוב יותר.

7. מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אקלסטה מכילה פחתות מ- 1 מילימול של נתרן (23 מ"ג) בכל בקבוקון של 100 מ"ל וכן למעה "נטולת נתרן".

8. כיצד משתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראת הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרופך אם אתה בטוח בנסיבות ואופן הטיפול בתכשיר. לא ידע אם אקלסטה גותמת להפרעות הלילי בלב האבל עליך לדודו לרופא צאב, חולשה או אינ-וחות ביריר, במפרק היריר או במפשעה היה זה יכול להיות מוגברת. תסנים של הפרעות בלב לאחר קבלת אקלסטה.

9. אנטטופורוזיט

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

הטבילה מטפלת במינון או שיכוחות לאילו אנטטופורוזיטים. יודע נסף.

10. מה מיעdetת התרופה?

כל בקבוקון של 100 מ"ל תמייסה מכיל 5 מ"ג חומצה

זולדרונית (אנדרוזן). ראה פרק 6

11. חומרם בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר

קריא בעין את העלון עד סוף בטרם תשמש בתרופה. אם ש לך שאלות

נוספנות, פנה אל הרופא או אל הרופך.

12. תמייסה זולדרונית 5 מ"ג/100 מ"ל

עלון לצרכך לפי תקנות הרוקחים 1986

7. תמייסה זולדרונית 5 מ"ג/100 מ"ל

כל בקבוקון של 100 מ"ל תמייסה מכיל 5 מ"ג חומצה

זולדרונית (אנדרוזן).

8. מרכיבים בתכשיר

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

9. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

10. מרכיבים בתכשיר

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

11. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

12. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

13. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

14. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

15. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

16. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

17. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

18. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

19. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

20. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

21. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

22. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

23. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

24. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

25. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

26. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

27. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

28. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

29. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

30. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

31. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

32. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

33. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

34. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

35. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

36. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

37. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

38. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

39. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

40. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

41. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

42. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

43. אנטטופורוזיטים

טבילים מטפלים

טבילים מטפלים

44. אנטטופורוזיטים