

חברת פריגו מבקשת ליידע אתכם על עדכון העלון לצרכן עבור התכשיר:

Alrin AF Teva / אלרין AF טבע

הרכב התכשיר וחוזקו: OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE 0.05 %

התוויה הרשומה לתכשיר בישראל:

Relief of nasal congestion, which is a result of common colds, sinusitis, hay fever or allergies of the upper respiratory system.

בהודעה זו מצוינים רק השינויים המהותיים המוגדרים כעדכוני בטיחות על רקע צהוב. קיימים עדכונים נוספים שאינם מהותיים ואינם נכללים בהודעה זו.

העלון המעודכן לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות

<http://www.health.gov.il>

וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת פריגו ישראל סוכנויות בע"מ בטלפון 03-5773700

בברכה,
עלמה שימן, רוקחת ממונה
פריגו ישראל סוכנויות בע"מ

עלון לצרכן

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אין להשתמש בתרופה זו בו זמנית עם נטילת תרופות מקבוצת מעכבי מונואמינאוקסידז (MAOI) - לטיפול במחלת פרקינסון ובדיכאון), או במשך 14 יום לאחר סיום הטיפול בהן. תרופות מקבוצה זאת עלולות להגביר את השפעת אוקסימטזולין על עליית לחץ הדם.
- אתה סובל מגלאוקומה צרת זווית (לחץ תוך עיני גבוה).
- אתה סובל ממחלת לב כלילית חריפה או אי ספיקת לב שמאלית המתבטאת בסימני קצרת.

לפני הטיפול בתרופה היוועץ ברופא אם אתה סובל או סבלת בעבר:

- מיתר לחץ דם

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח: ההשפעה של אוקימטזולין על עליית לחץ הדם עשויה להתגבר בשימוש יחד עם: תרופות נגד דיכאון מסוגים מסוימים: נוגדי דיכאון טריציקליים, מאפרוטילין, או מעכבי מונואמינאוקסידז (MAOI) או במשך 14 יום לאחר סיום הטיפול בהן.

הריון הנקה ופוריות

הריון

אוקימטזולין לא נקשר להשפעה שלילית על ההריון. ניתן להשתמש בנשים הרות אם משתמשים על פי ההמלצות. יש לנקוט בזהירות במטופלות עם יתר לחץ דם או סימנים של זרימת דם מופחתת לשליה. שימוש תכוף או ממושך במינונים גבוהים עשוי להפחית את זרימת הדם לשליה.

הנקה

לא ידוע אם אוקימטזולין מופרש לחלב אם. לאור המחסור בנתונים על השימוש באוקימטזולין במהלך ההנקה, אין להשתמש בתרופה במהלך ההנקה.

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי שאינן שכיחות (**uncommon**) תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000: התעטשות, יובש או גירוי באף, פה או גרון, גודש באף (אף סתום).
תופעות לוואי נדירות (**rare**) תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000: חרדה, עייפות, עצבנות, הפרעות שינה בילידים, פעימות לב מהירות, חזקות או לא סדירות (פלפיטציות), עליית לחץ דם, נפיחות בדופן האף, כאב ראש, בחילה, הסמקה, פריחה, הפרעות בראייה.