كبليڤي 10 ملغ

مسحوق ومُذيب لتحضير محلول للحقن تحت الجلد/داخل الوريد

المادة الفعّالة: تحتوي كل قارورة مسحوق على كابلاسيزوماب caplacizumab 10 mg.

الموادّ غير الفعالة: انظر البند 6.

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدّواء.
إذا كانت لديك أسئلة إضافيّة، توجّه إلى الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.
وُصِف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين، لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.

بالإضافة إلى النشرة، هناك لمستحضر كبليڤي بطاقة معلومات السلامة للمعالَج. تتضمن هذه البطاقة معلومات سلامة هامة عليك معرفتها قبل بدء العلاج بكبليڤي، خلاله، وعليك العمل بموجبها. راجع بطاقة معلومات السلامة للمعالَج، والنشرة للمستهلك قبل البدء باستعمال المستحضر. احتفظ بالبطاقة لمراجعتها ثانية عند الحاجة.

1. لم أعَد كبليڤي؟

لعلاج البالغين، الذين يعانون من فرفرية نقص الصفيحات التخثرية المكتسبة (aTTP - acquired thrombotic thrombocytopenic purpura)، بالدمج مع علاج استبدال مصل الدم وكبح جهاز المناعة.

aTTP هو اضطراب نادر في تخثر الدم، تتشكل فيه خثرات في الأوعية الدموية الصغيرة. قد تؤدي هذه الخثرات الدموية إلى انسداد الأوعية الدموية وإلى ضرر في الدماغ، القلب، الكلى، أو الأعضاء الأخرى. يمنع كبليڤي تشكّل هذه الخثرات الدموية عبر إيقاف تكدس الصفائح الدموية معا. وهكذا يقلل كبليڤي خطر التعرض لنوبة إضافية من aTTP بعد وقت قصير من التعرض للنوبة الأولى.

الفصيلة العلاجية: مضادات التخثر.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:
كنت حساسا (لديك حساسية) لكابلاسيزوماب أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتوي عليها هذا الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء
أخبر طبيبك إذا:
- كنت تعاني من فرط النزيف خلال العلاج. يُحتمَل أن يطلب منك طبيبك إيقاف العلاج. سوف يخبرك الطبيب متى يمكنك البدء بالعلاج مجددا.
- كنت تستعمل مضادات التخثر مثل: مناهض لفيتامين K، ريڤاروكسيبان وأپيكسابان (التي تعالج الخثرات الدموية). سيقرر طبيبك كيف ستتم معالجتك.
- كنت تستعمل مضاد الصفيحات، مثلا: أسپيرين، أو هيپارين ذا الوزن الجزيئي المنخفض (لمنع تكوّن خثرات دموية). سيقرر طبيبك كيف ستتم معالجتك.
- كان لديك اضطراب في الدم، مثل الهيموفيليا. سيقرر طبيبك كيف ستتم معالجتك.
- كان لديك انخفاض حاد في أداء الكبد. سيقرر طبيبك كيف ستتم معالجتك.
- كنت على وشك اجتياز عملية جراحية أو علاج الأسنان. سيقرر طبيبك إذا كان يمكن تأجيل الأمر أو إذا كان عليك التوقف عن تناول كبليڤي قبل أن تجتاز عملية جراحية أو علاج أسنان.

الأطفال والمراهقون
هذا الدواء ليس معدّا للأطفال والمراهقين الذين أعمارهم أقل من 18 عاما.
لا تتوفر معلومات حول أمان ونجاعة استعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين الذين أعمارهم أقل من 18 عاما.

التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول، أو تناولتَ مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائيّة، أخبِر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:
أدوية مضادة للتخثر مثلا: مناهض لفيتامين K، ريڤاروكسيبان، أو أپيكسيبان، التي تعالج الخثرات الدموية، أو دواء مضاد للصفيحات، مثلا: أسپيرين، أو هيپارين ذا الوزن الجزيئي المنخفض، اللذين يمنعان تكوّن خثرات دموية.

الحمل، الإرضاع، والخصوبة
الحمل
عليكِ إبلاغ الطبيب إذا كنتِ حاملًا أو إذا كنتِ تخططين للحمل. لا يوصى باستعمال كبليڤي أثناء الحمل.

الإرضاع
أخبري طبيبكِ إذا كنتِ مرضعة. سوف يوصي لكِ طبيبكِ حول إذا كان يتعين عليكِ التوقف عن الرضاعة أو عدم استعمال كبليڤي، مع الأخذ بعين الاعتبار الفائدة التي يجنيها طفلكِ من الرضاعة والفائدة التي تجنينها أنتِ من كبليڤي.

السياقة واستعمال الماكينات
لا يُتوقع أن يؤثر كبليڤي في قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكينات.

معلومات مهمّة عن قسم من مكوّنات الدواء
يحتوي الدواء على الصوديوم (sodium) بكمية أقل من 1 مليمول (1 mmol sodium) (23 ملغ) في الجرعة، إي إنه يُعتبر "خاليا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استعمال المستحضر دائمًا حسَب تعليمات الطبيب.
عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.
الجرعة وطريقة العلاج يُحدّدهما الطبيب فقط.
بداية العلاج بكبليڤي تكون من قبل طبيب خبير باضطرابات الدم.
الجرعة الموصى بها عادة هي:
- **الجرعة الأولى**
  - قارورة واحدة تُحقن في الوريد من قِبل أحد أفراد الطاقم الطبي.
  - يُعطى الدواء قبل البدء باستبدال مصل الدم.
- **الجرعات المتتالية**
  - قارورة واحدة، مرة في اليوم، كحقنة تحت الجلد (تحت جلد البطن).
  - تُعطى الحقنة تحت الجلد بعد كل استبدال يومي لمصل الدم.
  - بعد انتهاء استبدال مصل الدم اليومي، سوف يستمر علاجك بكبليڤي لمدة 30 يوما على الأقل، من خلال حقن قارورة واحدة مرة في اليوم.

يُحتمَل أن يوصي لك طبيبك بمتابعة العلاج يوميا لمدة 28 يوما إضافيا، على الأكثر.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

قد يقرر طبيبك أنك أنت أو المعالج/ة الخاصّ بك قادرين على حقن كبليڤي. في مثل هذه الحالة، سوف يقدم طبيبك أو مقدم الخدمات الصحية إرشادا لك أو للمعالِج/ة الخاصّ بك حول كيفية حقن كبليڤي.

تعليمات الاستعمال
يجب أن تُعطى الحقنة الأولى من كبليڤي في الوريد من قِبل أحد أفراد الطاقم الطبي. تظهر تعليمات لاختصاصيي الرعاية الصحية المتعلقة بطريقة حقن كبليڤي في الوريد في نهاية النشرة.

في كل حقنة، استعمل عبوة حزمة جديدة لتحضير محلول الحقن. لا تحاول حقن كبليڤي قبل أن تتعلم من أحد أفراد الطاقم الطبي كيف عليك القيام بذلك. لا تستعمل الحزمة لحقنة أخرى إطلاقا.

المرحلة 1 - النظافة
- اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون.
- حضّر مسطح عمل مستوٍ ونظيف لوضع عبوّة الحزمة.
- تأكد من أن بحوزتك وعاء للتخلص من النفايات.

المرحلة 2 - قبل الاستعمال
- تأكد من أن عبوة الحزمة كاملة.
- **افحص تاريخ انتهاء الصلاحية.** لا تستعملها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
- لا تستعمل الحزمة إذا ظهر أي ضرر في العبوة أو الأغراض المضمّنة فيها.
- ضع كل مكوّنات الحزمة على المسطح النظيف والمستوي.
- إذا لم تكن الحزمة مخزّنة بدرجة حرارة الغرفة، يجب الانتظار حتى تصبح درجة حرارة القارورة والمحقنة بدرجة حرارة الغرفة (25°C – 15°C)، وذلك من خلال وضعهما بدرجة حرارة الغرفة لبضع دقائق. لا يجوز تسخينهما بأية طريقة أخرى.

المرحلة 3 - طهّر السدادة المطاطية
- أزل الغطاء البلاستيكي عن القارورة. لا تستعمل القارورة إذا كان الغطاء البلاستيكي الأخضر غير موجود.
- نظف السدادة المطاطية المكشوفة بأحد المناديل الكحولية المزوّدة، واتركها بضع ثوان حتى تجف.
- بعد التنظيف، لا تلمس السدادة المطاطية أو لا تسمح للسدادة بأن تلمس أي مسطّح كان.



المرحلة 4 - وصل المهايئ
- خذ مهايئ القارورة المغلّف وأزل الغطاء الورقي عنه. اترك المهايئ في العبوة البلاستيكية المفتوحة الخاصة به. لا تلمس المهايئ ذاته.



- ضع المهايئ فوق القارورة مع الحفاظ على المهايئ في عبوته البلاستيكية.
- اضغط بقوة نحو الأسفل حتى يصبح المهايئ موصولا عبر النقر في مكانه، بحيث يخترق المهايئ سدادة القارورة. اترك الآن المهايئ الموصول بالقارورة **في عبوته الخارجية.**

المرحلة 5 - حضّر المحقنة
- أمسك المحقنة بيدك، ثم اكسر الغطاء الأبيض بيدك الثانية.
- لا تستعمل المحقنة إذا كان الغطاء الأبيض ناقصا، رخوا، أو متضررا.



- **لا تلمس** طرف المحقنة أو تسمح له بأن يلامس أي مسطح كان.
- ضع المحقنة على المسطح النظيف والمستوي.

المرحلة 6 - صِل المحقنة بالمهايئ والقارورة
- خذ القارورة مع المهايئ الموصول.
- أزل العبوّة البلاستيكية عن المهايئ من خلال الإمساك بالقارورة بيد واحدة، والضغط على جوانب عبوة المهايئ بيدك الأخرى، ثم ارفع العبوة نحو الأعلى.

تأكد من أن ينفصل المهايئ عن القارورة.



- أمسك المهايئ مع القارورة الموصولة به بيد واحدة. ضع طرف المحقنة على وصلة مهايئ القارورة.
- صِل المحقنة بالقارورة بلطف من خلال تحريكها باتجاه عقارب الساعة، حتى تشعر بمقاومة.



المرحلة 7 - حضّر المحلول
- احتفظ بالقارورة بوضعية عامودية على المسطح، بينما تتجه المحقنة نحو الأسفل.
- ادفع مكبس المحقنة ببطء حتى تصبح المحقنة فارغة. لا تفصل المحقنة عن القارورة.
- بينما لا تزال المحقنة موصولة بمهايئ القارورة، اخلط بلطف القارورة مع المحقنة الموصولة بها حتى يذوب المسحوق. تجنّب تشكّل رغوة. **لا تهز** القارورة.



- اترك القارورة الموصولة بالمحقنة على المسطح لمدة **5 دقائق** بدرجة حرارة الغرفة لكي يذوب المسحوق كليا. قد يرتفع المكبس تلقائيا ثانية - هذه الخطوة سليمة.
- انتقل إلى المرحلة 8 بعد مرور الخمس دقائق هذه فوراً.

المرحلة 8 - اسحب المحلول
- **افحص إذا كان المحلول يتضمن جزيئات.** يجب إذابة كل المسحوق، ويجب أن يكون المحلول صافياً.
- ادفع مكبس المحقنة ببطء حتى النهاية نحو الأسفل.
- أدر كل المعدّات - القارورة، المهايئ، والمحقنة - بالاتجاه المعاكس.
- من خلال الاحتفاظ بوضعية عامودية، اسحب ببطء المكبس لنقل كل المحلول إلى المحقنة. لا يجوز هز المحقنة.



المرحلة 9 - حضّر المحقنة للحقن



- أدر كل المعدّات - القارورة، المهايئ، والمحقنة - نحو الأعلى (بينما تكون المحقنة في القسم العلوي). افصل المحقنة المليئة عن المهايئ عبر الإمساك بالمهايئ بيد واحدة، وإدارة المحقنة بلطف بعكس اتجاه عقارب الساعة.
- ضع القارورة والمهايئ الموصول بها في الحاوية المزوّدة للتخلص من النفايات.
- **لا تلمس** طرف المحقنة أو تسمح له بأن يلامس المسطح. ضع المحقنة على المسطح النظيف والمستوي.

انتقل إلى المرحلة 10 لحقن كابلاسيزوماب تحت الجلد في البطن. تظهر تعليمات لاختصاصيي الرعاية الصحية المتعلقة بحقن كبليڤي في الوريد في نهاية النشرة.

المرحلة 10 - صِل الإبرة
- أخرج الإبرة من العبوّة، عبر إزالة الغطاء الورقي عن عبوة الإبرة وإخراج الإبرة مع الغطاء الواقي.



- من دون إزالة غطاء الإبرة، صِل الإبرة بالمحقنة، عبر الإدارة باتجاه عقارب الساعة حتى تشعر بمقاومة.
- اسحب نحو الخلف واقي الأمان الخاص بالإبرة.
- **افحص محتويات المحقنة.** لا تستعمل الدواء إذا لاحظت أنه يتضمن أي تعكر، كتل أو أي شيء آخر يبدو غير سليم. اتصل بالطبيب أو الممرضة في حال حدوث هذه الحالة.

المرحلة 11 - حضّر موقع الحقن للحقن تحت الجلد



- اختر موقعا ملائما ("موقع الحقن") على بطنك للحقن تحت جلدك. تجنّب الحقن حول السرّة.
- اختر موقع حقن مختلفاً عن الموقع الذي اخترته في اليوم السابق وذلك لمساعدة الجلد على التعافي بعد الحقن.
- استعمل منديلاً كحولياً آخر لتنظيف موقع الحقن الذي اخترته.

المرحلة 12 - إعطاء الدواء
- أزل بحذر الغطاء الواقي عن الإبرة وتخلّص منه. تأكد من أن المحقنة لا تلمس أي مسطح قبل الحقن.
- أمسك المحقنة على مستوى العينين بينما تكون الإبرة متجهة نحو الأعلى.
- أخرج كل فقاعات الهواء عبر الطرق على جانب المحقنة بالإصبع لجعل فقاعات الهواء تصعد نحو طرف المحقنة. بعد ذلك، ادفع المكبس ببطء حتى تخرج كمية قليلة من السوائل عبر الإبرة.
- اقرص بلطف الجلد النظيف بين الإبهام والسبابة لتشكيل ثنية.



- أمسك ثنية الجلد هذه خلال كل عملية الحقن.
- أدخل كل طول الإبرة في ثنية الجلد بزاوية كما يظهر في الرسم التوضيحي.
- اضغط على المكبس نحو الأسفل بالقدر الذي يتيحه.

- أخرج الإبرة بذات الزاوية التي أدخلتها فيها. لا تفرك موقع الحقن.

المرحلة 13 - بعد إعطاء الدواء
- بعد الحقن فورا، ضع واقي الإبرة فوق الإبرة حتى تدخل الإبرة إلى مكانها عبر النقر.



- تخلّص من المحقنة والإبرة في حاوية النفايات.

إذا استعملت جرعة مفرطة من كبليڤي
لا يُحتمل أن يتم حقن جرعة مفرطة لأن القارورة الواحدة تحتوي على جرعة واحدة فقط. أخبر طبيبك إذا كنت تعتقد أنك تناولت جرعة مفرطة.
إذا ابتلع طفل كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.

إذا نسيت استعمال كبليڤي
إذا نسيت تناول الدواء، ما زال يتعين عليك حقنه قبل مرور 12 ساعة من الوقت المحدد. ولكن إذا مضى أكثر من 12 ساعة منذ موعد حقن الجرعة، لا تتناول الجرعة المنسية، بل احقن الجرعة القادمة في الساعة الاعتيادية. عليك المواظبة على العلاج وفقاً لتوصيات الطبيب.

إذا توقفت عن تناول كبليڤي
للحصول على استفادة قصوى من علاجك، من المهم أن تستعمل كبليڤي وفق ما وصفه لك طبيبك وطوال المدة الزمنية التي حددها. يرجى أن تتحدث مع الطبيب قبل أن تتوقف عن العلاج، لأن التوقف المبكّر جدا قد يؤدي إلى أن تعود حالتك إلى ما كانت عليه سابقا.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوّة الدواء ومن الجرعة الدوائيّة في كلّ مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظّارات الطبّية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافيّة بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، يمكن أن يسبّب استعمال كبليڤي أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدِمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبيّة. فمن المحتمل ألّا تعاني من أيّ منها.
توجّه إلى الطبيب فورًا إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية الخطيرة التالية:
نزيف مستمر أو مبالغ به.
قد يقرر الطبيب متابعتك عن كثب أو تغيير علاجك.

في بحث سريري تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية وفق الشيوع التالي:

أعراض جانبية شائعة جدا (very common)، قد تؤثر في أكثر من 1 من بين 10 معالَجين:
- نزيف من اللثتين
- حُمّى
- تعب
- صداع
- نزيف من الأنف
- شرى

أعراض جانبيّة شائعة (common)، قد تؤثر في حتى 1 من بين 10 معالَجين:
- نزيف من العين
- تقيؤات دموية
- دم في البراز
- براز أسود شبيه بالقطران
- نزيف في المعدة
- بواسير تسبب نزيفاً
- نزيف شرجي
- ردود فعل في منطقة الحقن: طفح، حكة، ونزيف
- نزيف في الدماغ يتجسد بصداع حاد ويظهر بسرعة، تقيؤات، انخفاض مستوى الوعي، حمى، تظهر أحيانا اختلاجات وتيبّس العنق أو آلام في العنق
- ألم في العضلات
- سكتة دماغية
- دم في البول
- دم مبالغ به أثناء الدورة الشهرية
- نزيف مهبلي
- سعال دمي
- ضيق في التنفس
- تكدم (نزيف دموي، كدمة)

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبيّ لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.
يمكن إبلاغ وزارة الصحّة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحّة (www.health.gov.il)، الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:
https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يُخزّن الدواء

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تُسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنَع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوّة وعلى الملصق والكرتون. تاريخ انتهاء الصلاحيّة يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:
يُخزن الدواء في الثلاجة (بدرجة حرارة تتراوح بين 8°C-2°C). يُمنع تجميده.
يُحفظ بالعلبة الأصليّة لحمايته من الضوء.

يمكن تخزين كبليڤي بدرجة حرارة لا تتعدى 25°C لفترة وحيدة مدتها حتى شهرين، ولكن شريطة ألا تتعدى تاريخ انتهاء الصلاحية. لا يجوز إعادة تخزين كبليڤي في الثلاجة بعد تخزينه بدرجة حرارة الغرفة.
لا يجوز استعمال كبليڤي إذا لاحظتَ أنه يتضمن أية جزيئات أو إذا طرأ تغيير على لونه قبل الحقن.

شروط التخزين بعد إعادة تشكيل المستحضر (reconstitution):
يظل المحلول الجاهز مستقرا حتى 4 ساعات بدرجة حرارة 25°C، ولكن بهدف الحفاظ عليه من التعرض للتلوث الجرثومي، يجب استعمال المحلول الجاهز فورا، إلا إذا كانت طريقة إعادة التشكيل (reconstitution) تمنع خطر التعرض لتلوث جرثومي.
في حال عدم استخدام المحلول الجاهز فورا، تكون أوقات وظروف التخزين تحت مسؤولية المستخدم.

يُمنع التخلص من الأدوية في سلة النفايات المنزلية أو في مياه الصرف الصحي المنزلي. اسأل الصيدلي الخاص بك كيف عليك التخلص من الأدوية التي لا تحتاجها بعد. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعّالة، تحتوي كل قارورة مسحوق أيضا على المواد غير الفعّالة التالية:
Sucrose, trisodium citrate dihydrate, citric acid anhydrous, and polysorbate 80.
تحتوي كل محقنة جاهزة للاستعمال على:
ماء للحقن Water for injections

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوّة:
- قارورة زجاجية تتضمن مسحوقا أبيض، لتحضير محلول للحقن
- Water for injections في محقنة جاهزة للاستعمال لإذابة المسحوق

بعد إذابة المسحوق بالمذيب، يصبح المحلول صافيا، عديم اللون أو مائل إلى اللون الأصفر قليلا.

يُسوّق كبليڤي في عبوة وحيدة، تتضمن قارورة واحدة مع مسحوق كابلاسيزوماب، محقنة واحدة مليئة بمذيب، مهايئ قارورة واحد، إبرة واحدة، ومنديلين كحوليين
أو بعبوة تتضمن 7 قارورات مع مسحوق كابلاسيزوماب، 7 محاقن مليئة بمذيب، 7 مهايئات للقارورة، 7 إبر، و 14 منديلا كحوليا.

قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.

لا تحتوي هذه النشرة على كل المعلومات عن المستحضَر. إذا كانت لديك أية أسئلة أو إذا لم تكن متأكدا من أية معلومات، توجه إلى الطبيب.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه: سانوفي-أفينتس إسرائيل م.ض.، شارع بني غاؤون 10، نتانيا.

اسم المُنتج وعنوانه: Ablynx NV، بلجيكا.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 165-25-36110

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

تم تحريرها بـ: 02/2021

The following information is intended for healthcare professionals only:
The intravenous bolus injection of Cablivi given at the start of the treatment must be administered by a health care professional. Preparing a dose of Cablivi for intravenous injection should be done in the same way as for a subcutaneous injection (see Instructions for Use, step 1 to 9, in section 3).
Cablivi can be intravenously administered by connecting the prepared syringe to standard Luer locks of IV lines or using a suitable needle. The line can be flushed with 0.9% sodium chloride.