

نشرة المستهلك وفقاً لأنظمة الصيدلة (المستحضرات) لعام 1986

يُسوّق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

غوداميد 100 ملغ

يحتوي كلّ قرص على:

حمض الأسيتيل ساليسيليك 100 ملغ، Acetyl salicylic acid 100 mg
لمعينة قائمة بالموادّ غير الفعّالة، انظر الفصل 6، "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بإمعان حتّى نهايتها قبل استخدامك للدواء. تتضمّن هذه النشرة معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا توقّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
يتوجّب عليك استخدام المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند التجريب في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

1. لأيّ غرض خصّص هذا الدواء؟

الدواء مخصّص للوقاية الأوليّة من مرض القلب التاجيّ لدى المرضى المعرّضين لخطر عالٍ والوقاية الثانويّة من أمراض القلب والدماغ المتسبّبة عن خثار الشرايين.

الفصيلة العلاجيّة: مضادات التخثّر ومتبّطات تكّدس الصفائح الدمويّة.
يعمل غوداميد 100 ملغ على تثبيط تكّدس الصفائح الدمويّة، ممّا يمنع تشكّل الجلطات الدمويّة.

2. قبل استخدام هذا الدواء

لا يجوز استخدام الدواء إذا:

- كنت حسّاساً (كانت لديك أرجيّة) لحمض الأسيتيل ساليسيليك (المادّة الفعّالة)، للساليسيلات أو لأيّ واحد من المركّبات الأخرى التي يحتوي عليها غوداميد 100 ملغ (لمعينة قائمة بالمركّبات غير الفعّالة، انظر الفصل 6 "معلومات إضافية").
- كان لديك في الماضي ردّ فعل معيّن على مسكّنات الألم أو الأدوية المضادّة للحمّى أو للالتهاب (الساليسيلات أو أدوية أخرى غير ستيرويديّة مضادّة للالتهاب) على شكل نوبات الربو أو ردود فعل تحسّسيّة أخرى.
- كنت تعاني من قرحة حادّة في المعدة أو في المعى.
- كان لديك استعداد للاضطرابات المسبّبة للنزيف.
- كنت تعاني من الفشل الكلويّ أو الكبديّ.
- كنت تعاني من الفشل القلبيّ الحادّ الذي لا يعالج بشكل مناسب.
- كنت تتناول في الفترة ذاتها ميتوتريكسات بجرعة 15 ملغ أو أكثر أسبوعياً.
- كنت في الثلث الأخير من الحمل وتتناولين جرعة يوميّة تزيد عن 150 ملغ (انظري البند "الحمل، الإرضاع والخصوبة").

التحذيرات الخاصّة المتعلّقة باستخدام الدواء

قبل العلاج بغوداميد 100 ملغ، أخبر طبيبك إذا:

- كنت حسّاساً (كانت لديك أرجيّة) لمسكّنات أخرى للألام، لأدوية مضادّة للالتهاب، لأدوية مضادّة للروماتيزم أو لموادّ أخرى مسبّبة للأرجيّة.
- كنت تتناول أيضاً مضادات الالتهاب غير الستيرويديّة (NSAIDs) مثل إيبوبروفين أو نابروكسين (مسكّنات للألام وأدوية لعلاج الحمّى أو الالتهاب). انظر البند 2، "المستحضرات التي تقلّل من مفعول الدواء".

- كنت تعاني من حالات الأرجية الأخرى (المصحوبة بأعراض من قبيل الظواهر الجلدية، الحكة أو الشرى).
- كنت تعاني من الربو القصبي، التهاب الأنف التحسسي (سيلان الأنف التحسسي)، انتفاخ الأغشية المخاطية في الأنف (السيليات في الأنف) أو من مرض مزمن في المسالك التنفسية.
- كنت تتلقَى علاجًا بالفعل بالمستحضرات المضادة للتخثر (مثل مشتقات الكومارين أو الهيبارين، باستثناء الجرعات المنخفضة من الهيبارين (low dose heparin)).
- كنت تعاني من قرحة في المعدة أو الاثني عشر أو كان لديك تاريخ من حالات النزف في الجهاز الهضمي.
- كنت تعاني من خلل في وظيفة الكبد.
- كنت تعاني من خلل في وظيفة الكليتين أو جهاز القلب والأوعية الدموية (مثل المرض في الأوعية الدموية في الكلية، الفشل القلبي، انخفاض حجم الدم، الخضوع لعملية جراحية واسعة النطاق، الإنتان، أو حالات النزف الملحوظة) لأن حمض الأسيتيل ساليسيليك قد يزيد من خطر تضرر وظيفة الكليتين والإصابة بالفشل الكلوي الحاد.
- كان من المخطئ له خضوعك لعملية جراحية، بما في ذلك العمليات الجراحية الصغيرة (مثل عملية خلع الأسنان)، وذلك لاحتمال زيادة الاستعداد لنشوء النزف. أخبر طبيبك أو طبيب الأسنان الذي يعالجك بتناولك لغوداميد 100 ملغ.
- كان لديك نقص في الإنزيم G6PD. من شأن حمض الأسيتيل ساليسيليك أن يزيد من سرعة تحلل أو تمزق خلايا الدم الحمراء أو أن يسبب نوعًا معينًا من فقر الدم. وتشمل العوامل التي قد تزيد من هذا الخطر الجرعات العالية، الحمى أو التلوثات الحادة.

التحذيرات الأخرى:

- يؤدي إعطاء الجرعات المنخفضة لحمض الأسيتيل ساليسيليك إلى تقليل إفرازات حمض البول. من شأن هذه الحالة أن تتسبب في نوبة النقرس لدى المرضى الذين يوجد لديهم الميل المسبق لذلك.
- إذا أصبت بشقوق جلدية أو تعرّضت لإصابة ما فقد يستمرّ النزيف وقتًا أطول من المعتاد. ويتعلّق الأمر بفعالية الدواء. لا تكون للشقوق أو الجروح الطفيفة (التي تتسبب مثلًا عن عملية الحلاقة) تأثيرات ملحوظة بالعادة. إذا اختبرت نزيفًا غير اعتيادي (في موضع غير نموذجي أو لمدة غير اعتيادية من الزمن) فاستشر الطبيب.
- ممنوع تناول الأدوية المحتوية على حمض الأسيتيل ساليسيليك على مدار فترات طويلة أو بجرعات عالية دون استشارة الطبيب.

الأطفال والمراهقون:

الدواء مخصّص للأشخاص الذين سنّهم فوق الـ 18. دون هذا العمر يجب مراجعة الطبيب. ممنوع استخدام غوداميد 100 ملغ لدى الأطفال أو المراهقين الذين يعانون من الأمراض الحموية إلا إذا أمر الطبيب بذلك بعد فشل العلاجات الأخرى. قد يشكّل نشوء التقيؤ المتواصل بالتزامن مع هذا المرض علامة على متلازمة راي وهي حالة مرضية نادرة جدًا لكنها مهدّدة للحياة وتستدعي علاجًا طبيًا فوريًا.

التفاعلات/ردود الفعل الدوائية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية المصرفة بدون وصفة طبيب والإضافات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تتناول:

المستحضرات التي تزيد من مفعول الدواء أو التي قد تزيد من خطر نشوء الأعراض الجانبية:

- الأدوية المضادة لتخثر الدم (مثل كومارين وهيبارين) ومحلّلات الجلطات الدموية: من شأن حمض الأسيتيل ساليسيليك أن يزيد من خطر النزف في حال تمّ تناوله قبل العلاج بمحلّلات الجلطات الدموية. يجب الانتباه إلى علامات النزف الخارجية والداخلية (مثلًا الكدمات) في حال كنت تتلقَى علاجًا كهذا.
- أدوية أخرى متبّطة لتكّدس الصفائح الدموية مثل نيكلوبيدين وكلوبيدوغريل: زيادة خطر نشوء النزف.
- الكورتيكوستيرويدات: المستحضرات المحتوية على الكورتيزون أو المستحضرات الشبيهة بالكورتيزون (باستثناء تلك المستخدمة للعلاج الموضعي أو العلاج ببدائل الكورتيزون ضدّ مرض أديسون): زيادة خطر نشوء الأعراض الجانبية في الجهاز الهضمي.
- الكحول: زيادة خطر الإصابة بتقرّحات الجهاز الهضمي والنزف.
- مسكّنات أخرى للألام ومضادات الالتهاب (الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية) وأدوية أخرى تستخدم لعلاج حالات النقرس على وجه العموم: زيادة خطر الإصابة بتقرّحات الجهاز الهضمي والنزف.

- الأدوية ضدَّ السكريّ: قد ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم.
- ديجوكسين: دواء يسبب زيادة قوّة انقباض عضلة القلب.
- ميثوتريكسات، المستخدم لعلاج السرطان وبعض اضطرابات الروماتيزم.
- حمض الفالبرويك، المستخدم لعلاج الصرع.
- أدوية من نوع SSRI لعلاج الاكتئاب: زيادة خطر الإصابة بالنزف في الجهاز الهضمي.

المستحضرات التي تقلل من مفعول الدواء:

- الأدوية التي تزيد من إفراز البول (مدرات البول): مناهضات ألدوستيرون مثل سبيرونولون، كانرينوات، ومدرات البول العروية مثل فوروسيميد).
- أدوية معينة لعلاج فرط ضغط الدم (تحديدًا مثبّطات ACE).
- أدوية لعلاج النقرس تزيد من إفراز حمض البول (مثل بروبنسيد وبيزبرومارون). بعض مضادّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) (باستثناء حمض الساليسيليك) مثل إيبوبروفين ونابروكسين: انخفاض مدى تثبيط تكّس الصفائح الدموية وعملية التخثر: قد يقلل ذلك ممّا يمنحه الدواء من حماية من النوبة القلبية والسكتة الدماغية.
- ميتاميزول (مستحضر مخصّص لتسكين الألم وعلاج الحمى): احتمال انخفاض تأثير حمض الأسيتيل ساليسيليك على تكّس الصفائح الدموية عند تناول الدوائين معًا. نتيجةً لذلك، يجب توخّي الحذر عند إعطاء هذا العلاج المدمج لمتلقّي العلاج الذين يتناولون غوداميد 100 ملغ بجرعة منخفضة للوقاية من النوبات القلبية.

قبل استخدام حمض الأسيتيل ساليسيليك، أخبر الطبيب بالأدوية الأخرى التي تتناولها. إذا كنت تستخدم حمض الأسيتيل ساليسيليك بشكل منتظم، فاستشر الطبيب قبل أن تتناول أدويةً أخرى، بما فيها الأدوية المصروفة دون وصفة طبيب.

- ممنوع تناول غوداميد 100 ملغ بالتزامن مع أحد الأدوية المذكورة أعلاه دون الحصول على توجيهات واضحة من الطبيب.

تناول الدواء واستهلاك الكحول

لا يجوز شرب الكحول خلال فترة العلاج بحمض الأسيتيل ساليسيليك.

الحمل، والإرضاع، والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، كنت تظنّين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

الحمل

خلال الثلث الأوّل والثاني من الحمل ينبغي تناول غوداميد 100 ملغ فقط بأمر من الطبيب. أمّا خلال الثلث الأخير من الحمل فلا يجوز تناول حمض الأسيتيل ساليسيليك وهو المادّة الفعّالة في غوداميد 100 ملغ بجرعة تزيد عن 150 ملغ لليوم وذلك بسبب الخطر المتزايد لنشوء المضاعفات لدى الأمّ والطفل قبل الولادة وخلالها (بما في ذلك الخطر المتزايد لحدوث الإجهاض وبعض العاهات الخلقية؛ انظر أيضاً البند "لا يجوز استخدام الدواء إذا:"). ويمكن تناول غوداميد 100 ملغ بجرعة 150 ملغ يومياً كحدّ أقصى خلال الثلث الثالث من الحمل بأمر من الطبيب فقط.

الإرضاع

تنتقل كمّيّات صغيرة من حمض الأسيتيل ساليسيليك ومستقلباته إلى حليب الأمّ. وبما أنّه لم يتمّ الإبصار إلى اليوم عن أيّ تأثيرات على الطفل الرضيع فإنّه لا ينبغي التوقّف عن الإرضاع في حال كانت الجرعة اليومية لا تزيد عن 150 ملغ. رغم ذلك، فإنّ استهلاك الجرعات العالية (أكثر من 150 ملغ يومياً) يستلزم التوقّف عن الإرضاع.

قيادة السيّارة واستخدام الماكينات

لا حاجة إلى اتّخاذ احتياطات وقائيّة خاصّة.

3. كيف تستخدم الدواء؟

يتوجّب عليك مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّداً من الجرعة الدوائية وكيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية اليومية الموصى بتناولها عادةً هي:
قرص واحد في اليوم.
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

- من الممكن بلع القرص كاملاً مع الكثير من السوائل (يستحسن شرب كأس من الماء) بعد الوجبة. يمكن خلطاً لذلك مصّ القرص أو مضغه ثم بلعه. ويجوز مضغ أو هرس القرص.
- لا يجوز تناول الدواء على الريق.

مدة العلاج:

غوداميد 100 ملغ مخصّص للاستخدام الطويل الأمد. ويجب على الطبيب المعالج أن يحدّد مدة العلاج.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم

قد يكون عرضا الدوار والطنين علامتي التسمّم الخطير، تحديداً لدى الأطفال والمرضى المسنين. ويجب إخبار الطبيب حالاً إذا كنت تشكّ بأنك قد تناولت جرعة مفرطة. سيحدّد الطبيب الوسائل التي يجب اتّخاذها وفقاً للجرعة المفرطة التي تم تناولها. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل أو شخص آخر ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطحب معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الساعة المحدّدة لذلك، فتناول القرص حالاً تبعاً للوارد أعلاه في الفصل 3، "كيف تستخدم الدواء" أو تبعاً لتوجيهات الطبيب. يُمنع منعاً باتاً تناول جرعتين معاً عوضاً عن الجرعة المنسية!

إذا توقّفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقّف عن تناول غوداميد 100 ملغ دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! يجب مراجعة المُلصق والتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توقّرت لديك أسئلة إضافية حول استخدام الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أيّ دواء آخر، قد يؤدّي استخدام غوداميد 100 ملغ إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستخدمين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية لأنك قد لا تعاني من أيّ واحد منها. إذا اختبرت أحد الأعراض الجانبية الوارد وصفها أدناه، فتوقّف عن تناول غوداميد 100 ملغ وأخبر الطبيب بذلك كي يستطيع تقييم خطورة العرض الجانبي وتحديد ما يجب فعله. يجب التوقّف عن استخدام غوداميد 100 ملغ فور نشوء العلامات الأولى على الحساسية المفرطة (انظر أدناه تحت الأعراض الجانبية النادرة).

الأعراض الجانبية الشائعة (الأعراض التي تظهر عند مستخدم واحد من بين 10 كحدّ أقصى):

- حرقة الفؤاد
- الغثيان، التقيؤ وآلام البطن
- الإسهال
- النزف الطفيف من الجهاز الهضمي

الأعراض الجانبية غير الشائعة (الأعراض التي تظهر عند مستخدم واحد من بين 100 كحدّ أقصى):

- ردود الفعل الجلدية [في الحالات النادرة جداً قد يحدث اندلاع خطير للطفح الجلدي الذي يصيب الأغشية المخاطية ويكون مصحوباً بالحُمى (Erythema exsudativum multiforme)]
- النزف في الجهاز الهضمي. من شأن الاستخدام المتواصل لغوداميد 100 ملغ أن يسبّب فقر الدم (نتيجة لنقص الحديد) بسبب فقدان الدم الخفي في الجهاز الهضمي. وقد يؤدّي النزف الخطير في الجهاز الهضمي إلى البراز الأسود أو التقيؤ الدموي.

- التقرّحات في الجهاز الهضمي، مما قد يسبّب الانتفاخ في حالات نادرة جدًا.
- النزف في الجهاز الهضمي.
- يجب مراجعة الطبيب حالاً إذا لاحظت البراز الأسود الشبيه بالقار أو التقيؤ الدموي (إنهما علامتان على النزف الخطير في الجهاز الهضمي، رجاء قراءة البند "الاستجابة للأعراض"، الوارد أدناه).

الأعراض الجانبية النادرة (الأعراض التي تظهر عند مستخدم واحد من بين 1000 كحدّ أقصى):

- ردود فعل الحساسية المفرطة في الجلد، في الجهاز التنفسي، في الجهاز الهضمي وفي جهاز القلب والأوعية الدموية، خصوصاً لدى مرضى الربو. قد تشمل العلامات الآتي: انخفاض ضغط الدم، نوبات تشمل صعوبات التنفس، التهاب الأغشية المخاطية في الأنف، انسداد الأنف، ردود الفعل التحسسية (الصدمة)، انتفاخ الوجه، اللسان والحلق (وذمة الأوعية الدموية).

الأعراض الجانبية النادرة جداً (الأعراض التي تظهر عند مستخدم واحد من بين 10000 كحدّ أقصى):

- ارتفاع نتائج فحوص الكبد.
- خلل في وظيفة الكليتين والفشل الكلوي الشديد.
- انخفاض مستوى السكر في الدم (نقص سكر الدم).
- يؤدي إعطاء الجرعات المنخفضة لحمض الأسيتيل ساليسيليك إلى تقليل إفرازات حمض البول. من شأن هذه الحالة أن تتسبب في نوبة النقرس لدى المرضى الذين يوجد لديهم الميل المسبق لذلك.

الأعراض الجانبية التي مدى شيوعها غير معروف

- قد تكون أعراض الصداع، الدوار، الارتباك، ضعف القدرة على السماع والطنين (الرنين داخل الأذنين) علامات على الجرعة المفرطة، تحديداً لدى الأطفال ومتلقّي العلاج المسنّن (انظر "إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم").
- قد تمّ الإخبار عن حالات النزف الخطيرة مثل النزف في الدماغ (خصوصاً لدى المرضى الذين يعانون من فرط ضغط الدم غير المسيطر عليه و/أو الذين يتلقون علاجاً مدمجاً يشمل مضادات التخثر). إن هذه الحالات نادرة بل نادرة جداً وقد كان بعضها مهدداً للحياة.
- تسارع تحلّل أو تمزّق خلايا الدم الحمراء إضافةً إلى نوع معيّن من فقر الدم لدى المرضى الذين يعانون من نقص شديد في G6PD.
- حالات النزف: الرُعاف، النزيف من اللثة، النزيف في الجلد أو النزف في المسالك البولية والأعضاء التناسلية، كما قد يدوم النزف وقتاً أطول. قد يستمرّ هذا التأثير بين 4 و8 أيام بعد الاستخدام.

الاستجابة للأعراض:

- يجب التوقّف عن تناول غوداميد 100 ملغ إذا شعرت بالأعراض الوارد ذكرها أعلاه كما يجب إخبار الطبيب بذلك كي يحدّد الوسائل التي ينبغي اتّخاذها وفقاً لشدة الأعراض الجانبية.
- يجب التوقّف عن تناول غوداميد 100 ملغ حتّى إذا نشأت علامة واحدة فقط على ردّ فعل الحساسية المفرطة. لا تتناول غوداميد 100 ملغ بعد ذلك أبداً.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فيجب عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بالضغط على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستمارة المتصلة للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- **امنع التسّم!** هذا الدواء، وأيّ دواء آخر، يجب الاحتفاظ به في مكان مغلق بعيدًا عن مرأى ومتناول أيدي الأطفال و/أو الأطفال الرضع، وهكذا ستمنع التسّم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
- يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. date) الوارد على العلبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر ذاته.
- **ظروف التخزين:** يجب التخزين في درجة حرارة دون 25 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة النفايات البيئية. استفسر الصيدليّ عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها وسيساهم اتّباع توصياته في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادّة الفعّالة يحتوي الدواء أيضًا على المركّبات غير الفعّالة التالية:

Glycine, Maize starch, Powdered Cellulose, Lemon flavour (IFF no 15.81.4287), Saccharin sodium

- **كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:**
غوداميد 100 ملغ عبارة عن قرص أبيض اللون ومستدير يوجد عليه خط شطر يتيح تقسيم الجرعة إلى جزئين متساويين من 50 ملغ من المادّة الفعّالة وهي حمض الأسيتيل ساليسيليك.
تتوفّر الأقراص في علبة نفطات (لويحات) تحتوي على 10، 20، 30، 40 أو 50 قرصًا. قد لا تتوفّر بعض أحجام العلب.
- صاحب الامتياز وعنوانه: شركة غرامزيه للمنتجات الصيدليّة م.ض.، ص.ب. 528، يوقنيعام عيليت 2069206.
- اسم المصنّع وعنوانه: شركة الدكتور بفلجوير أرزيميتيل م.ض.، بامبيرغ، ألمانيا
- تمّ تحرير النشرة في يناير/كانون الثاني 2021 بالتّماشى مع توجيهات وزارة الصّحة.
- رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصّحة: 133-80-29716-00
- من باب التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّ صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

GODAMED PIL 12012021

ملاحظات	دليل على التعديل	الفصول التي تم تعديلها	جدول تعديلات النشرة
	نسخ النصّ الوارد في نشرة المستحضر أسبيرين كارديو، التي وافقت عليها وزارة الصحة في 16 أبريل/نيسان 2020، وتعديل النصّ تبعاً لشروط التسجيل المطلوب استيفائها.	تمّ تعديل معظم محتويات النشرة نتيجة لمطابقتها للمنتج الجنيب في إسرائيل - أسبيرين كارديو	01 - 04 يناير/كانون الثاني 2021

تصريح التعهد باستخدام نشرة المستهلك

133-80-29716-00

GODAMED 100mg

اسم المستحضر:

إني أصرّح أنّه تمّ فحص النشرة مرّتين بحيث تمّ قراءتها من بدايتها إلى نهايتها. وعلى حدّ علمي، لا تتضمن النشرة أيّ تناقضات، أو أخطاء إملائية أو نحوية أو أيّ معلومات خاطئة بل تستوفي النشرة شروط تسجيل المستحضر في إسرائيل. إني أصرّح بموجب هذا المستند أنّ التغييرات المشار إليها في هذه النشرة هي التغييرات الوحيدة التي تمّ إجراؤها. وتمّ نسخ محتويات النشرة المقترحة والمقدّمة من نشرة المستحضر أسبيرين كارديو، التي تمّ تحريرها في يونيو/حزيران 2020، كما تمّ تعديل محتوياتها تبعاً لشروط التسجيل المطلوب استيفائها.

تمّ تعديل هذه النشرة بالتماسي مع مذكرة قسم تسجيل المستحضرات الرقم 587734819 المؤرّخة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019 والمعنونة "طريقة الإخبار عن تعديلات في نشرات المستحضرات المخصّصة للبشر وللحيوانات - التعديل المؤرّخ في ديسمبر/كانون الأول 2019"

D. Wagner

דייטד וגנר

מ.ר. 3599

וכרון יעקב 30900

ديفيد فاغنير - 04 يناير/كانون الثاني 2021

الصيدلي المسؤول - GRAMSE PHARMACEUTICALS