

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

ספטל סקרב®

תמיסה לחיטוי
לשימוש חיצוני

הרכב

כלורהקסידין גלוקונאט 4% w/v (Chlorhexidine Gluconate 4% w/v)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף הוראות השימוש בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

- שטיפת ידיים אנטיספטית
- חיטוי ידיים לפני ניתוח
- חיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח

קבוצה תרפויטית: חומרים מחטאים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. במיוחד במטופלים עם היסטוריה של תגובות אלרגיות אפשריות הקשורות לכלורקסידין.
- יש להימנע ממגע עם העיניים, האוזן התיכונה, המוח וקרומ המוח (העור המכסה את המוח ועמוד השדרה).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אין להשתמש בחללי הגוף (לדוגמה אף או אוזניים).
- יש להשתמש בזהירות ביילודים, במיוחד אלו שנולדו לפני הזמן. ספטל סקרב עלול לגרום לכוויות כימיות בעור.
- הסר כל בד סופג, אריג או בגד לפני שתמשיך לניתוח. אין להשתמש בכמויות מוגזמות ואין לאפשר לתמיסה להצטבר בקפלי העור או מתחת למטופל או לטפטף על הסדינים או דבר אחר שנמצא במגע ישיר עם המטופל. כאשר ישנו צורך לשים תחבושות על אזורים בעור שנחשפו לספטל סקרב, יש לנקוט בזהירות על מנת להבטיח שום עודפי תמיסה לא נשארו בטרם חבישת האיזור.

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

שים לב

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

הוראות השימוש:

אין למהול את התמיסה.

לשטיפת ידיים אנטיספטית:

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
2. הוסף 5 מ"ל של ספטל סקרב לא מהול ורחץ את הידיים במשך כדקה
3. שטוף היטב במים
4. יבש היטב את הידיים

לחיתוי ידיים לפני ניתוח:

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
2. הוסף 5 מ"ל של ספטל סקרב לא מהול ורחץ את הידיים במשך כדקה
3. נקה את הציפורניים באמצעות מברשת
4. שטוף את הידיים במים
5. חזור על הפעולה פעם נוספת למשך 2 דקות
6. שטוף היטב במים
7. יבש היטב את הידיים

לחיתוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח:

1. שטוף את כל הגוף עם 25 מ"ל של ספטל סקרב, לפחות פעמיים, בדרך כלל פעם אחת ביום שלפני הניתוח ופעם שנייה ביום הניתוח.
2. שטוף היטב במים
3. יבש היטב את הגוף.

אין לעבור על המנה המומלצת

אם בטעות בלעת ספטל סקרב

אם בטעות בלעת ספטל סקרב, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בספטל סקרב עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

לעיתים נדירות כלורוקסידין עלול לגרום לרגישות יתר כולל שוק אנפילקטי (התנפחות של הגרון או השפתיים ולחץ דם נמוך) ותגובות אלרגיות (דלקת העור, גירוד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, סרפדת, גירוי בעור, שלפוחיות). אם מתרחשת אחת מהתגובות האלה, יש להפסיק את השימוש ולפנות לקבלת טיפול רפואי מיד.

תופעות לוואי ביילודים:
כוויות כימיות (שכיחות לא ידועה).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

5. <https://sideeffects.health.gov.il> איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 2 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה של התכשיר.

6. מידע נוסף

- **נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:**
Pluronic PE 6800, ammonyx LO, isopropanol, D-gluconolactone, herbacol 15.393/T(B), spectracol ponceau 4R, sodium hydroxide (for pH adjustment), Purified water.

- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**
נזל צמיג, צלול עד מעט עכור בצבע אדום.

כל בקבוק מכיל 500 מ"ל תמיסה.

שם היצרן:
ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת.ד. , 114. בנימינה.

בעל הרישום וכתובתו:
טבע מדיקל בע"מ, רח' האורגים, 8 אשדוד.

עלון זה נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות בתאריך פברואר 2020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 043.08.23618.00