

אין לייטול תרופות בחושך! בדקתי התווית והמונה בכל פעם  
שהירג' גונטלת תרופה. הרכבי משלפויים אם הירג' זקוקה  
לهم.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ  
בראך או ברוך.

#### כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

בשים רק לבנים מוכתנה והחלפי' לעתים קרובות. גם גרבינים  
יש להליף מייד'ם. תיתן הבקה של בן החוג ולכך של הקפיד  
על הימנעות מגע מיין או להקפיד על שימוש בקבוקים בעט  
מאג'מי' בהשך כל תקופת הטיפול. כמו כן, רוח' לחתיע'ץ עט  
הרופא בדבר כורך בטיפול הרותיק בין טיפול  
לטיפול, הקפיד לא לחדר את נזול השיטה בעטבנה ובכמota  
רבה מדי', על מנת לא לחדר את הנזול לחם – דבר העול  
להעביר את הדוחם לשם. אם הירג' בהרין – אל תשטעמי'  
כל בתכשיר שטיפה.

#### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בזידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי עלול  
לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תיבהל למקרא  
רשימת תופעות הלואו. יתכן ואל הסבל מארח מהן.

#### 5. תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שטוףיעות ב- 1-10 משתמשים מהן:

- כאב ראש וחומרת
- התכווציות בطن
- חום
- טעם לא נעים בפה
- חמואה לאirlala על הלשון שלך
- עורם בעור
- אדמומיות העור (אритומה)
- גירוד של העור (pruritus)
- אי נוחות בעור (ציבור, כאבי עור / עוקץ)
- גירוד בעור
- הפרשות נרתיקיות
- אי נוחות נאצזר האגן
- יתרה לביבובן

#### 6. תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות שטוףיעות ב-1-10 משתמשים מהן:

- חמואה חול'
- דיאאון
- עייפות
- חמואה עצבעות
- קש' Shinna
- חמואה מוזרה באכבעות וובהונת
- שלשלולים
- עצירות
- בטן פומואה ומורגרת
- יבש בפה או צמא
- טעם מתבלט בפה
- הרכזחות שרירים
- שתן כהה
- דלקות בדררי השתן (UTI) העוללות לגרום לכאב או תחושת  
צירה במתן שתן, או מעתן מוגבר
- נפשות של הפוט (הALK חיצוני של איבר המין הנשי)
- שייטים בסוטה של גנג' דומם בין תקופות הווסת או אי נוחות  
מוגברת במחלך תקופת הווסת

#### 7. תופעות לוואי שכיחות אין ידועה (לא ניתן להסביר מההנתונים הדיווחים):

- פריריה מגדרת (אנטיקריה)
- אם הופעה תופעות לוואי, אם אחת מתופעות הלואו מחייבת  
או כארש את סובלות מטופעת לוואי שלא צינה בעלה, עלי'ר  
ליהויעץ ברופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשדר הבריאות באמצעות לחיצה  
על הקישור "דוחות על תופעות לוואי" נסיבות טיפול רפואי" שמצוין  
בדף הבית של אחרון משרד הבריאות il. מטופות הווסת או אי נוחות  
המנוגנת לבמהלך תקופת הווסת

[link: https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

#### 5. אך לאחcen את התרופה?

• מנייע הרעליה? תרופה זו ולר הדראה אחרת יש לשמר במקום  
סגור מחוץ להישג ידים ופומואה ראי'יתם של ידים / או תינוקות  
ועל-ידי' תמן עיר העלה. אין לזרום להקה לא להרואה

• אין לשתמש בתרופה אחריה תאריך התופה (exp.date)  
הופיע עלי'ר הגוף על גוף הרופא דוח'ם לית'וטו להווסת לוואי, או ע' כיסיה

לקיים: [link: https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

#### 6. מידע נוסף:

• נסף על החומר הפעיל metronidazole: propylene glycol, carbomer (carbopol 974P), methyl parahydroxybenzoate, disodium edetate, propyl parahydroxybenzoate, sodium hydroxide, purified water

• כדי נראית התרופה ומה תנק'ה הארזה:

זידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי חסר גע' עד צהבת  
בריה. הג'ל מגע בשיפורת האשלכתן לשפכים או פסולת  
פלסטי'ק כובגה בטורן בקרטון. הקרטון מכיל גם 5 מוליכים

חד עותם המודדים 5 ג'ם של ג'ל.

• בעל הרשות: מגאנטראם בע"מ, תד. 519,  
הוד השרון 4510501, ישראל.

• יצ'ן: מדיה מנופקטורני, מורייגן, צרפת.

• עדין בספטמבר 2020.

• מס' רישום התרופה בפקנס התרופות הממלכתי במשרד  
הבריאות: זידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי: 118 72 29887

## 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי ג'ל לנרטיק

הרכב:

החוואר הפעיל:

מטרונידזול 7.5 mg/g ג'ל וג'ינלי

לשימוש הרכיבים הבלטי' פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראי סעיף

6, מידע נסוף.

#### 1. מה מיועדת התרופה?

זידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי משמש לטיפול מקומי חיצוני  
לנרטיק בזיזומים בקטריאלים ונטיבקטריאלים בתכשיר, ראי סעיף

קובואה תרופיטית: אנטיבקטריאלי מקבוצת ניטראומיידוזילים.

#### 2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

• את אלרגיה לחומר הפעיל metronidazole או כל אחד מהמרכיבים הימי'ים אשר מכילה התרופה (המפורטים

בעמ' 6 מ'עד נסוף).

• את אלרגיה לכל נורמ'ן אנטיבקטריאלי השיר למשפחה

הירוביומידוזילום (חומר מרשר).

• את אלרגיה לפרבנים (חומר מרשר).

אדרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בזידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי:

• סבלת בעבר מבעיות בעורם הדם או סבלת מחלת המפשעה על הדם.

• את סובלת, או את חדשת שאת סבלת מחלת מנדידה נרתיקית:

חימיטופוטן של הדרקון הרטיקי עלי'ם להפר לבוליטים

ויתר כארת מושתת בזידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי

ואת עשייה להזדקק לטיפול נסוף לטיפול בימי'טוניים.

• את בעקומות והותם חודשיות.

• את אלרגיה לזרבצ'ין המבוצ'ת מטרונידזול.

• הירג' נסועת לעבר בדיקות מעבדתיות, מארח ו-

- הימני'י שימוש ממשך ומיתור בתרופה זו.

כמו עם כל דיז'ום בנטרכיק, רצוי להימנע מקרים מיוחדים  
במהלך תקופת ההתקאה ובזמן שאת משתמש בזידובל

7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי.

ילדים ומתבגרים:

זידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי אין מושך יעיל ובטוח בילודים

מתחת לגיל 18 שנים שלא ידוע אם השימוש יעיל ובטוח בילודים

לידים ותבגרים:

דיז'ום בקטריאלים וג'ינלי אין מושך יעיל ובטוח בילודים

הקשישות וכוונאה מכר, לא בזענה עריכה קלינית לשימוש

בזידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי עבר קבוצת ג'ל.

אינטראקציות/ תגובה בין תרופות:

אם את לוקחת, או אם לך לחתך לאחרונה, תרופות אחרות כולן

תגובה לא מושך וטומאה מכר, סופי' על רופא או לחתוך:

• תרופה נזגדת קרש מהסוג קורמין (Warfarin).

• תרופה לטיפול במלחמות ופשלות ג'ל (Lithium).

• תרופה שארונית: ציקלוסופרין (Cyclosporin).

• תרופה המשמשת לביעות עור ולטיפול בסרטן: פלאואורציל-5 (5-Fluouracil).

שימוש בתרופה כזרcum וזרcum:

אם הירג' ברהירון או מניקה, חושבת כי הירג' בהרין או מתכונת

הירג'ן, יש להזיעץ ברופא לפני השימוש בזידובל 7.5 מ"ג/ג'

ג'ל וג'ינלי.

היגיאה ושימוש במכונות:

לזידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי אין השפעה על יכולת הנהיגה

והשימוש במכונות.

מידוח שבס עילן חלק המרכיבים של התרופה:

זידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי מיל' צ'יל' methyl parahydroxybenzoate (E218) - 0.8 mg/g

propyl parahydroxybenzoate (E216) - 0.2 mg/g

אשר עלילים לגרום לתגובה אלרגיות.

זידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וג'ינלי מיל' ג'ם:

propylene glycol (E1520) - 30 mg/g

העלול לגרום לגידרי בעור.

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמי'ד בהתאם להוועת הרופא. עלי'ר

לבדוק עם רופא או הרוקח אם אירק בשouchה בוג� למינן ואופן

הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקשו על ידי הרופא  
בלבד.

המינון המקביל בהדר הזראה אחרית מרופא, בדרך כלל הא:

לנשים מעל גיל 18: אפליקטור אחד, פעם אחת ביום, לפחות

5 ימים, לפחות פעם שנייה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

הוראות לשימוש בתרופה:

#### 1. מילוי המוליך:

הסירי את פקק השופורת ונקי' את כיסוי המתקת בעדרת קצה

הפקק.

הברגי את המוליך על השופורת.

חוטי בעדרות ג'ל מהשפורה לתוך המוליך. בוכנת המוליך

נענו בדבון המילוי ותעוצר כאשר המוליך ייל' את כמות הג'ל

המתאימה.

פהחי את המוליך והזראה את השופורה עם הפקק.

#### 2. החדרת המוליך:

ניתן להזריא את המוליך במלון שביבה על הג'ל, כאשר הרכיבים

כפויים, או בכל תנוחה נוחה אחרת.

אחז' בוכנת המוליך מלוא' ובעדינות החדרי' לברתיק עוקם,

לחץ בעדרות ג'ל עד לעצירה, סימן לריקון כל תכולת

המוליך בברתיק. הזריא את המוליך והשליכ' לפה.

#### 3. הטיפול במוליך:

כל מוליך מיועד לשימוש חד פעמי. במידיה ושנה המלצה רופא

על טיפול פעמי'יים, ניתן להשתמש שימוש חוזר באותו מוליך.

הזריא את הבוכנה מהמוליך לאחר השימוש.

שפוי' את הבוכנה ומוליך בימים חמימים וובון והודיע' היטב

כדי לאפשר שימוש חוזר במוליך, יש לדוחוף בעדרות את הבוכנה

זרהה לתוך המוליך.

אם מוחת בתשעות מינון גבוה יותר או אם בעשרות בעיל' יד

מן התרופה, נמי' מיד לחדר מין של בתי-חוותים, והובי' אריזת

לוי' (ראי סעיף 4 'טיפול לוואי').

אם שחחת בתשעות מינון גבוהה תרופה. אל ממוח' יותר מפעם ביום.

הבא לפני השינה. אל ממוח' יותר מפעם ביום.

יש להתמודד בטיפול כפי' שהומליך על ידי הרופא.

אם את מפסיקה את תקנות נטילת התרופה

אל תטפל ללא התיעשות עם הרופא המתפל' המטפל

בנרטיק טיפול למלון אחות הרופא יוכן' על ידי הרופא.

לקחת את כל המלך הדיז'ום.