

نشرة للمستهلكة وفق أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986
يُسوّق الدواء دون وصفة طبية

فاچيفم 10 مكغ
أقراص مطلية للاستعمال المهبل

المادة الفعالة:
إسترايول 10 مكغ (كهيميهدرات)
estradiol 10 mcg (as hemihydrate)

المواد غير الفعالة ومُسببات الحساسية في المستحضر: انظري البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّهي إلى الطبيب أو الصيدلي. عليك استعمال الدواء حسب التعليمات في بند الجرعة من هذه النشرة. استشيري الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقم أعراض المرض أو إذا لم تتحسن بعد أسبوعين حتى 4 أسابيع.

1. لم أعد هذا الدواء؟

فاچيفم 10 مكغ معدّ لعلاج الضمور المهبل الناتج عن نقص الإستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث. هناك خبرة محدودة حول العلاج لدى نساء تجاوزن سن 65 عاماً.

المجموعة العلاجية: إستروجينات. طبيعية ونصف اصطناعية، بسيطة.

يحتوي فاچيفم 10 مكغ على إسترايول وهو هرمون جنسي أنثوي ينتمي إلى مجموعة هرمونات تدعى الإستروجينات. الإسترايول في فاچيفم 10 مكغ شبيه بالإسترايول الذي ينتجه المبيضين لدى المرأة. ينتمي فاچيفم 10 مكغ إلى مجموعة أدوية تدعى العلاج الهرموني البديل (HRT) للاستعمال المهبل. "الضمور المهبل" هو حالة تحدث نتيجة انخفاض مستويات الإستروجين في جسمك وتتجسد في أعراض مثل الجفاف والتهيّج. تحدث هذه الحالة بشكل طبيعي بعد انقطاع الطمث. يعمل فاچيفم 10 مكغ عبر استبدال الإستروجين المنتج عادة في مبيض المرأة. يتم إدخاله إلى مهبلك، بحيث يتحرر الهرمون في المنطقة التي تحتاجه. من شأن هذا الأمر أن يخفف من شعور الإنزعاج في المهبل.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للإستراديول، أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظري البند 6 "معلومات إضافية").
 - كان لديك الآن، أو في الماضي سرطان الثدي أو أن هناك شكاً لوجود سرطان الثدي لديك.
 - كان لديك الآن، أو في الماضي سرطان حساس للإستروجين، مثل سرطان بطانة الرحم (endometrium) أو أن هناك شكاً لوجود سرطان من هذا النوع لديك.
 - كان لديك نزيف مهبل مهبول السبب.
 - لديك فرط تنسج بطانة الرحم (endometrial hyperplasia) غير المعالج.
 - كنت تعانين أو عانيت في الماضي من خثرة دموية في الوريد (thrombosis)، مثلاً: في الساقين (deep venous thrombosis) أو في الرئتين (pulmonary embolism).
 - كان لديك اضطراب في تخثر الدم (مثل نقص بروتين C، بروتين S، أو مضاد الثرومبين).
 - كان لديك الآن أو مؤخراً مرض ناتج عن خثرات دموية في الشرايين، مثل نوبة قلبية، سكتة دماغية، أو ذبحة صدرية (angina).
 - كان لديك الآن أو في الماضي مرض في الكبد، ولم تعد نتائج فحوصات أداء الكبد لديك إلى مستواها السليم.
 - كانت لديك مشكلة دم نادرة تدعى "برفيرية" التي تنتقل وراثياً.
- إذا ظهرت أية حالة من الحالات التي ذكرت أعلاه للمرة الأولى أثناء استعمال فاجيفم 10 مكغ، توقفي فوراً عن استعمال الدواء واستشيري طبيبك حالاً.

التاريخ الطبي والفحوصات الطبية الروتينية

- ينطوي استعمال علاج هرموني بديل (HRT) على مخاطر يجب أخذها بالحسبان عند اتخاذ قرار للبدء بهذا العلاج أو متابعته.
- إن التجربة المكتسبة في علاج النساء اللواتي انقطعت الدورة الشهرية لديهن في فترة مبكرة (نتيجة فشل المبيضين أو عملية جراحية) محدودة. إذا انقطعت الدورة الشهرية لديك في فترة مبكرة، قد تختلف المخاطر الكامنة في استعمال علاج هرموني بديل. يرجى أن تستشيري الطبيب.
- قبل أن تبدأي باستعمال (أو عندما تبدأين العلاج من جديد) علاج هرموني بديل (HRT)، سوف يسألك الطبيب عن تاريخك الطبي وتاريخ عائلتك. قد يقرر الطبيب إنجاز فحص جسماني، قد يشمل على فحص ثدييك و/أو فحص داخلي، عند الحاجة.
- بعد أن تبدأين العلاج بفاجيفم 10 مكغ، عليك إجراء فحص لدى الطبيب مرة في السنة على الأقل. في هذه الفحوصات، تحدثي مع الطبيب عن أفضليات ومخاطر مواصلة العلاج بالدواء.
- عليك إجراء فحص مسح الثدي الروتيني وفق توصيات طبيبك.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- قبل العلاج بفاجيفم 10 مكغ، أخبري الطبيب إذا كنت تعانين الآن أو عانيت في الماضي من أية مشكلة من المشاكل التالية، لأن هذه المشاكل قد تعود ثانية أو تتفاقم خلال العلاج بالدواء. في مثل هذه الحال، عليك زيارة الطبيب لإجراء فحوصات في فترات متقاربة أكثر:
- ربو
 - داء الصرع
 - داء السكري
 - حصى في كيس المرارة
 - ضغط دم مرتفع
 - حالات شقيقة أو صداع حادة
 - اضطراب في الكبد مثل ورم حميد في الكبد
 - نمو بطانة الرحم لديك خارج الرحم (endometriosis) أو إذا كان لديك تاريخ طبي من فرط تنسج بطانة الرحم (endometrial hyperplasia)
 - مرض يؤثر في طبلة الأذن والسمع (otosclerosis)
 - مرض في جهاز المناعة يؤثر في أعضاء كثيرة في الجسم (ذئبة حمامية جهازية، SLE)
 - خطر متزايد للإصابة بالسرطان الحساس للإستروجين (مثلاً: في حال مرضت والدتك، أختك، أو جدتك بسرطان الثدي)

- خطر متزايد للإصابة بخثرات دموية (انظري البند "خثرات دموية في الوريد [thrombosis]")
- وجود أورام ليفية (fibroids) في الرحم
- كان مستوى الدهون في الدم مرتفعاً جداً (التريليبيريدات)
- احتباس السوائل نتيجة مشاكل في القلب أو الكلى.

نلفت انتباهك، فأجيفم 10 مكغ ليس وسيلة لمنع الحمل. إذا مضى أقل من 12 شهراً منذ دورتك الشهرية الأخيرة، أو إذا كان عمرك أقل من 50 عاماً، ربما عليك استعمال وسائل منع حمل إضافية لمنع الحمل. توجهي إلى الطبيب للحصول على استشارة.

العلاج الهرموني البديل والسرطان

فرط تنسج بطانة الرحم (endometrial hyperplasia) وسرطان بطانة الرحم (endometrial cancer)

إن تناول أقراص خاصة بالعلاج الهرموني البديل وتحتوي على إستروجين فقط، خلال فترة طويلة، قد يزيد خطر تطوير سرطان بطانة الرحم (endometrium).

ليس معروفاً بالتأكيد فيما إذا كان هناك خطر شبيه عند استعمال العلاج مجدداً أو العلاج المتواصل (أكثر من سنة) بأجيفم 10 مكغ. مع ذلك، أظهر فأجيفم 10 مكغ قدرة امتصاص منخفضة جداً في الدم، لهذا فإن إضافة بروجستين غير ضرورية.

إذا كنت تعانين من **نزيف مهلي مفاجئ** أو من **بقع دموية**، على الأغلب لا داعي للقلق، ولكن عليك تحديد موعد لدى الطبيب. يمكن لهذا الأمر أن يشكل علامة تدل على سماكة بطانة الرحم لديك.

تتطرق المخاطر التالية إلى الأدوية التي تحتوي على علاجات هرمونية بديلة تصل إلى الدورة الدموية. مع ذلك، فأجيفم 10 مكغ معدّل لعلاج موضعي مهلي، وامتصاصه في الدم منخفض جداً. إن إمكانية تفاقم الحالات المذكورة أدناه أو عودتها مجدداً خلال العلاج بأجيفم 10 مكغ قليلة، ولكن عليك التوجه إلى الطبيب إذا كنت قلقة.

سرطان الثدي

هناك شهادات تدل على أن فأجيفم 10 مكغ لا يزيد خطر حدوث سرطان الثدي لدى نساء لا يُصنّب بسرطان الثدي في الماضي. ليس معروفاً فيما إذا كان يمكن استعمال فأجيفم 10 مكغ بأمان لدى النساء اللواتي أصبن بسرطان الثدي في الماضي.

افحصي ثدييك فحصاً منتظماً. توجهي إلى الطبيب إذا لاحظت أية تغييرات في الثدي مثل

- تكوّن حفر في الجلد
- تغييرات في الحلمة
- كتل يمكن رؤيتها أو تحسسها.

بالإضافة إلى ذلك، يوصى بإجراء فحص تصوير الثدي الشعاعي في حال اقترَح عليك.

سرطان المبيض

سرطان المبيض نادر، وهو نادر أكثر بكثير من سرطان الثدي. إن استعمال علاج هرموني بديل من الإستروجين فقط مصحوب بارتفاع طفيف في خطر حدوث سرطان المبيض.

مقارنة:

يتغير خطر الإصابة بسرطان المبيض مع التقدّم في العمر. مثلاً: لدى النساء اللواتي أعمارهن 50 حتى 54 عاماً، ولا يتناولن علاجاً هرمونياً بديلاً، سيتم لدى امرأتين تقريباً من بين 2,000 تشخيص سرطان المبيض خلال 5 سنوات. النساء اللواتي يتناولن علاجاً هرمونياً بديلاً لمدة 5 سنوات، سيحدث نحو 3 حالات من بين 2,000 مستعملة (أي حالة واحدة إضافية تقريباً).

تأثيرات العلاج الهرموني البديل على القلب والدورة الدموية

خثرات دموية في الوريد (thrombosis)

إن خطر حدوث خثرات دموية في الأوردة أعلى بـ 1.3 حتى 3 أضعاف لدى متلقيات العلاج اللواتي يتناولن علاجاً هرمونيا بديلاً مقارنة بمتلقيات العلاج اللواتي لا يتناولنه، لا سيما خلال سنة العلاج الأولى. قد تكون الخثرات الدموية خطيرة، وإذا انتقلت هذه الخثرات إلى الرئتين فقد تسبب ألماً في الصدر، ضيقاً في التنفس، إغماء، وحتى الوفاة.

- إن خطر تشكّل خثرة دموية في الأوردة يزيد مع التقدم في العمر، وكذلك في حال كانت إحدى الحالات التالية تنطبق عليك. عليك إبلاغ الطبيب إذا كانت إحدى الحالات التالية تنطبق عليك:
- كنتِ غير قادرة على المشي لفترة طويلة نتيجة عملية جراحية كبيرة، إصابة أو مرض (انظري أيضاً البند 3 "إذا كنتِ على وشك اجتياز عملية جراحية")
 - كنتِ تعانين من الوزن الزائد بشكل كبير ($BMI > 30 \text{kg/m}^2$)
 - كنتِ تعانين من أية مشكلة في تخثر الدم تتطلب علاجاً طويل الأمد بدواء يُستعمل لمنع الخثرات الدموية
 - عانى أحد أفراد عائلتك ذات مرة من خثرة دموية في الساق، الرئة، أو في عضو آخر في الجسم
 - كنتِ تعانين من مرضة الذئبة الحمامية الجهازية (SLE)
 - كنتِ تعانين من السرطان.
- لمعرفة علامات الخثرة الدموية، انظري البند 4 "توقفي عن استعمال فاجيفيم 10 مكغ وتوجهي فوراً إلى الطبيب".

مقارنة:

لدى نساء في سن الـ 50 عاماً من العمر، ولا يتناولن علاجاً هرمونيا بديلاً، طوال 5 سنوات، فإن 4 حتى 7 نساء من بين 1,000 بالمعدل، من المتوقع أن يعانين من خثرة دموية في الوريد. لدى نساء في سن الـ 50 عاماً من العمر، ويتناولن علاجاً هرمونيا بديلاً يحتوي على إستروجين فقط لأكثر من 5 سنوات، ستكون 5 حتى 8 حالات من بين 1000 متعاجة (أي حالة إضافية واحدة).

مرض قلب (نوبة قلبية)

لا يطرأ ارتفاع على خطر تطوير مرض قلب لدى نساء يتناولن علاجاً يتضمن إستروجين فقط.

سكتة دماغية

إن خطر حدوث خثرات دموية في الأوردة أعلى بـ 1.5 ضعفاً لدى متلقيات العلاج اللواتي يتناولن علاجاً هرمونيا بديلاً مقارنة بمتلقيات العلاج اللواتي لا يتناولنه. يزداد عدد حالات السكتة الإضافية بسبب استعمال علاج هرموني بديل مع التقدم في العمر.

مقارنة:

لدى نساء في سن الـ 50 عاماً من العمر، ولا يتناولن علاجاً هرمونيا بديلاً، بالمعدل فإن 8 من بين 1,000، من المتوقع أن يعانين من سكتة دماغية خلال 5 سنوات. لدى نساء في سن الـ 50 عاماً من العمر، ويستعملن علاجاً هرمونيا بديلاً، ستكون 11 حالة من بين 1,000 متعاجة، طوال 5 سنوات (أي 3 حالات إضافية).

حالات إضافية

لا يمنع العلاج الهرموني البديل فقدان الذاكرة. هناك أدلة تشير إلى وجود خطر أعلى لحديث فقدان الذاكرة لدى نساء يبدأن بتناول علاج هرموني بديل بعد سن 65 عاما. توجهي إلى الطبيب للحصول على استشارة.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناولين، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبري الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا يتوقع أن يؤثر فاجيفم 10 مكغ المستعمل للعلاج الموضعي المهبل، في أدوية أخرى. قد يؤثر فاجيفم 10 مكغ في العلاجات الأخرى المعدة للعلاج المهبل.

الحمل والإرضاع

فاجيفم 10 مكغ معد للنساء بعد سن انقطاع الطمث فقط. إذا أصبحت حاملا، عليك التوقف عن العلاج بفاجيفم 10 مكغ والتوجه إلى الطبيب.

السياقة واستعمال الماكينات

من غير المعروف عن تأثير.

3. كيف تستعملين الدواء؟

احرصي على استعمال هذا الدواء كما هو موصوف في هذه النشرة تماما أو وفق تعليمات الطبيب أو الصيدلي. عليك أن تفحصي مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكدة فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة الموصى بها عادة هي:

- عليك استعمال قرص واحد في المهبل، في كل يوم، في الأسبوعين الأولين.
- بعد ذلك، استعملي قرصا واحدا في المهبل مرتين في الأسبوع. حافظي على فاصل زمني قدره 3 أو 4 أيام بين قرصين.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج

إذا لم تتحسن حالتك أو إذا كنت تشعرين بسوء بعد 2-4 أسابيع، أو إذا حدثت أعراض أخرى، عليك مراجعة الطبيب.

معلومات عامة عن علاج أعراض سن انقطاع الطمث

عند استعمال أدوية لعلاج أعراض سن انقطاع الطمث، يوصى باستعمال الجرعة الدوائية الناجعة الأقل مقدارا، واستعمال الدواء للفترة الزمنية الأقصر الضرورية.

طريقة تناول

- يمكن أن تبدأي باستعمال فاجيفم 10 مكغ في اليوم الأكثر مريحا لك.
- لاستعمال المهبل فقط
- أدخل القرص في المهبل بمساعدة الموصل (مطابق).
- هذا الدواء غير معد للابتلاع!

في "التعليمات للمستعملة"، في نهاية النشرة، يرد شرح حول كيفية استعمال فاجيفم 10 مكغ. اقرأي التعليمات

بعناية قبل استعمال فاجيفم 10 مكغ.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا استعملت جرعة مفرطة من فاجيفم 10 مكغ توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي.
فاجيفم 10 مكغ معدّ للعلاج الموضعي المهبلّي. جرعة إستراديول في فاجيفم 10 مكغ منخفضة لدرجة أن هناك حاجة إلى استعمال عدد كبير من الأقراص حتى يقترب من الجرعة الدوائية العادية المستعملة في العلاج الفموي.
إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ توجهي فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضري عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول جرعة، استعملي جرعة فور تذكرك. يُمنع استعمال جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن تناول الدواء

راجعي طبيبك، بشأن أي سؤال عن مدة العلاج أو للتحديث عن العلاجات البديلة.

إذا كان يتعين عليك اجتياز عملية جراحية

إذا كنت على وشك اجتياز عملية جراحية، أخبري الطبيب الجراح بأنك تتناولين فاجيفم 10 مكغ. قد تحتاجين إلى التوقف عن تناول فاجيفم 10 مكغ طوال 4 حتى 6 أسابيع تقريباً قبل العملية الجراحية، لتقليل خطر الإصابة بخثرة دموية [انظري البند 2 "خثرات دموية في الوريد". أسألي طبيبك متى عليك تناول فاجيفم 10 مكغ ثانية.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحققّي من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناولين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشيري الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أيّ دواء، يمكن أن يُسبب استعمال فاجيفم 10 مكغ أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمات. لا تفزعي عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. ربّما لن تعاني من أي منها.

تم الإبلاغ عن الأمراض التالية في أحيان قريبة أكثر لدى نساء يستعملن علاجات هرمونية بديلة تصل إلى الدورة الدموية، مقارنة بنساء لا يستعملن علاجاً هرمونياً بديلاً. هذه المخاطر منخفضة أكثر في العلاجات المعدة للاستعمال في المهبل مثل فاجيفم 10 مكغ:

- سرطان المبيض
- خثرات دموية في أوردة الساقين أو الرئتين (انصمام خثاري وريدي)
- سكتة دماغية
- احتمال فقدان الذاكرة، إذا بدأ العلاج الهرموني البديل بعد سن 65 عاماً

لمعلومات إضافية عن هذه الأعراض الجانبية، انظري البند 2 "قبل استعمال الدواء".

توقفي عن استعمال فاجيفم 10 مكغ وتوجهي فوراً إلى الطبيب

إذا عانيت من إحدى الحالات التالية المفصلة أدناه خلال العلاج الهرموني البديل:

- حالات صداع شبيهة بالشقيقة تحدث للمرة الأولى
- اصفرار الجلد أو بياض العينين (يرقان). من المحتمل أن تشير هذه العلامات إلى مرض في الكبد
- طراً ارتفاع كبير على ضغط الدم (قد تكون الأعراض صداع، تعب، دوخة)

- أية مشكلة من المشاكل المذكورة في البند 2 تحت عنوان "لا يجوز استعمال الدواء"
- إذا أصبحت حاملاً
- إذا ظهرت علامات الخثرة الدموية، مثل:
- تورم مصحوب بالألم واحمرار الساقين
- ألم مفاجئ في الصدر
- صعوبات في التنفس
- لمزيد من المعلومات، انظري البند 2 تحت عنوان "خثرات دموية في الوريد (thrombosis)".

أعراض جانبية شائعة: قد تؤثر في حتى مستعملة واحدة من بين 10 نساء

- صداع
- ألم في البطن
- انزعاج، نزيف أو إفراز من المهبل.

أعراض جانبية ليست شائعة: قد تؤثر في حتى مستعملة واحدة من بين 100 امرأة

- عدوى فطرية في الأعضاء التناسلية
- غثيان
- طفح
- ارتفاع الوزن
- موجات حرارة
- ارتفاع ضغط الدم.

أعراض جانبية نادرة جداً: قد تؤثر في حتى مستعملة واحدة من بين 10,000 امرأة

- إسهال
- احتباس السوائل
- تفاقم الشقيقة
- فرط التحسس في كل أجهزة الجسم (مثل رد فعل/صدمة تأقية).

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية خلال العلاج بإستروجين المتناول عبر الفم:

- مرض في كيس المرارة
- اضطرابات مختلفة في الجلد:
- تغيرات في لون الجلد، لا سيما الجلد حول الوجه والعنق المعروفة بـ "كلف الحمل" (chloasma)
- عقد جلدية حمراء ومؤلمة (erythema nodosum)
- طفح مع احمرار أو جروح على شكل لعبة لوح الأسهم (erythema multiforme).

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

تجنبي التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنبين التسمّم. لا تسببي التقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على عبوة اللويحة (بليستر) والعبوة الخارجية. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

عليك تخزينه بدرجة حرارة أقل من 25°C.

لا يجوز التخزين في الثلاجة.

يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلّة المهملات البيئية. عليك استشارة الصيدلي حول تأثيرات الأدوية غير الضرورية. تساعد هذه التدابير في حماية جودة البيئة. قد يؤدي هذا الدواء إلى خطر بيئي مائي.

6. معلومات إضافية

يحتوي كل قرص مهيلي على 10 ميكروغرامات من إستراديول (كإستراديول هيميهدرات).

إضافة إلى المركّب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:

hypromellose, lactose monohydrate 17.9 mg, maize starch, magnesium stearate.

يحتوي طلاء القرص على:

hypromellose, macrogol 6000.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

يُسوّق كل قرص مهيلي أبيض في موصّل (مطابق) أحادي الاستعمال.

في جانب واحد من قرص فاجيفم 10 مكغ تظهر الطباعة "NOVO 278".

أحجام العبوات:

18 قرصا مهيليا وموصلات

24 قرصا مهيليا وموصلات

قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

نوفو نورديسك م.ض.

شارع عتير يدع 1،

كفار-سابا 4464301.

اسم المنتج وعنوانه:

نوفو نورديسك أي.إس.، نوفو ألي،

دي. كيي -2880، باجسفيرد، دنمارك.


تم تحرير هذه النشرة في شباط 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:


146-89-33241

تعليمات للمستعملة


كيفية استعمال فاجيفم 10 مكغ




1. مَرِّقِي عبوة بليستر منفردة واحدة.
افتحي الطرف كما هو موضح في الصورة.



2. أدخلي الموصل بحذر في المهبل. توقفي عندما تشعرين
بمقاومة قليلة (8-10 سم).



3. لتحرير القرص، اضغطي بلطف على المكبس حتى تشعرين بنقرة.
سيلتصق القرص بجدار المهبل فوراً.
ولن يسقط خارجاً عندما تقفين أو تمشين.



4. أخرجي الموصل وتخلصي منه.

Vagifem 10 IL PIL FEB21-Notification