

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

تأفانك أقراص 500 ملغ أقراص مطلية

المادة الفعالة: ليفوفلوكساسين (ك هييميهدرات) 500 ملغ 500 mg Levofloxacin (as hemihydrate)
المواد غير الفعالة في المستحضر، أنظر الفقرة 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لمعالجة، لا تعطيه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء غير مخصص للأطفال أو المراهقين.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لمعالجة التلوثات البكتيرية التي تسببها الجراثيم الحساسة لـ Levofloxacin لدى الكبار.

مثلا: التهاب الجيوب الأنفية، ثلوثات في الطرق التنفسية السفلى، ثلوثات في المسالك البولية والكلى وكذلك التلوثات الجلدية والأنسجة الرخوة.

الفصيلة العلاجية: مضاد حيوي ينتمي إلى فصيلة الـ "فلوروكينولونات".

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

● كنت حساسا (الرجي) لليفوفلوكساسين، لأي مضاد حيوي آخر من فصيلة الـ "كينولونات" مثل موكسيسفليكساسين، سيبروفلوكساسين أو أوفلوكساسين أو إحدى المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6). علامات لرد فعل تحسسي تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، إنفتاح الغشفتين، الإجه، الحنجرة أو اللسان.

● كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض الصرع.

● كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الأوتار مثل التهابات الأوتار، تنتج عن علاج بمضاد حيوي من فصيلة الـ "كينولونات". الوتر يربط بين العظام والعظم.

● كنت طفلا أو فتى مراهق.

● كنت حامل، من شأنك أن تصبحي حامل أو تظنين بأنك حامل.

● كنت مرضعة.

لا تتناول الدواء إذا انطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه. إذا لم تكن واثقا، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول تأفانك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ تأفانك، إحك للطبيب إذا:

كنت بعمر 60 سنة أو أكثر.

● كنت تتناول أدوية من فصيلة الـ "كورتيكوستيروئيدات"، تسمى أحياناَ ستيروئيدات (أنظر فقرة "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").

● عانيت من ضرر دماغي جراء سكتة أو إصابة دماغية أخرى.

● لديك مشاكل في الكلى.

● كنت تعاني من نقص في الإنزيم G6PD (glucose-6-phosphate) ‘dehydrogenase deficiency’.

هناك إحتمال لكيف بأن تعاني من مشاكل خطيرة في الدم عند تناول لهذا الدواء.

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الصحة النفسية.

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في القلب؛ يجب توخي الحذر عند تناول مثل هذا الدواء وذلك إذا ولدت مع أو لديك سابقة عائلية لإطالة مقطع QT (الذي يمكن ملاحظته في فحص التخطيط الكهربائي للقلب)، إذا كنت تعاني من عدم توازن في أملاح الدم (خاصة نسبة منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم)، إذا كان نظم قلبك بطيء جدا (يسمى "bradycardia")، إذا وجد لديك قصور قلبي، إذا قاسبت في الماضي من إحتشاء في عضلة القلب (نوبة قلبية)، إذا كنت امرأة أو مسنا أو إذا كنت تتناول أدوية أخرى تؤدي إلى تغيرات غير سليمة في التخطيط الكهربائي للقلب (أنظر الفقرة "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").

● لديك سكري.

● كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الكبد.

● لديك مرض يؤدي إلى ضعف عضلي خطير (myasthenia gravis).

● لديك مشاكل في الجهاز العصبي (peripheral neuropathy).

● شخص لديك توسع أو بروز لوعاء دموي كبير (أم الدم الأبهريّة أو أم الدم المحيطية لوعاء دموي كبير).

● كان لديك في الماضي تحلل في الأبهر (تمزق في جدار الأبهر).

● لديك سابقة عائلية لأم الدم الأبهريّة أو تحلل الأبهر أو عوامل خطورة أخرى أو حالات أخرى تزيد من قابلية حدوثها (مثلا: اضطرابات في التسنج الضام مثل متلازمة مارفان، متلازمة إهلرس - داتلوس للأوعية الدموية، أو اضطرابات وعائية مثل التهاب الشرايين على إسم تاكاياسو، التهاب شرايين الصدفغي، مرض بهجت، إرتفاع ضغط الدم، أو تصلب معروف للشرايين).

● تطور لديك ذات مرة طفح خطير أو تقشر خطير للجلد، حوصصات و/أو تقرحات في الفم بعد تناول ليفوفلوكساسين.

توجه للطبيب، المرضضة أو الصيدلي عند تناولك فلوروكينولون إذا:

● كنت تعاني من ألم مفاجئ خطير في البطن، في الصدر أو في ظهرك، أو توجه حالا لقرعة الطوارئ.

يمكن أن يؤدي تأفانك في حالات نادرة إلى ألم والتهاب في الأوتار. خاصة لدى متعالجين كبار أو لدى متعالجين يتناولون كورتيكوستيروئيدات. إذا شعرت بأي مشكلة في الأوتار بعد تناول الدواء الرجاء توجه للطبيب فورا.

أدوية من فصيلة الـ "فلوروكينولونات"، بما في ذلك تأفانك، قد تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الوهن العضلي الوبيل مثل تفاقم ضعف العضلات

أو مشاكل في التنفس - إذا شعرت بهذه الأعراض توجه للطبيب فورا.

إذا لم تكن واثقا فيما إذا كانت إحدى التحذيرات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، توجه للطبيب أو الصيدلي قبل تناول تأفانك.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للأطفال وللمراهقين.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراَ، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، لأن تأفانك قد يؤثر على عمل أدوية أخرى وأدوية أخرى قد تؤثر على عمل تأفانك.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول الأدوية التالية، نظرا لأن هذه المشاركة مع تأفانك يمكن أن تزيد الخطورة لحدوث أعراض جانبية:

● كورتيكوستيروئيدات، تسمى أحياناَ ستيروئيدات - تستعمل لمعالجة الإلتهابات. قد تكون معرض لخطورة أكبر لحدوث إلتهاب و/أو تمزق في الأوتار.

● وارفارين - يستعمل لتميع الدم. قد تكون معرض لخطورة أكبر لظهور النزف. من الجائز أن يحتاج طبيبك إلى توجيهك لإجراء فحوص دم منتظمة، لفحص قابلية تخثر الدم لديك.

● ثيوفيللين - يستعمل لمشاكل في التنفس. لديك إحتمال أكبر للمعانة من

إختلاج بالإستعمال المشترك مع تأفانك.

● أدوية المضادة للإلتهاب لاستيروئيدة - المستعملة لحالات الألم والالتهاب مثل أسبيرين، إيبوبروفين، فينبوفين، كيتوبروفين وإندوميتاسين. أنت معرض لإحتمالية أكبر بأن تعاني من إختلاج عند تناول مشترك مع تأفانك.

● سيكلوسبورين - للإستعمال بعد زراعة أعضاء. قد تكون معرض لخطورة أكبر للمعانة من الأعراض الجانبية لـ سيكلوسبورين.

● أدوية التي تؤثر على شكل نبضات القلب. بما في ذلك أدوية لعلاج عدم سلامة نظم القلب (مضادات اللا نظمية مثل كوينيدين، هيدروكوينيدن، ديسوبيراميد، سوتالول، دوفيتيليد، إبيوتيليد وأمبودرون)، أدوية لعلاج الإكتئاب (مضاد الإكتئاب ثلاثية الحلقة مثل أميتريبتيلين وإيميپرامين)، أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية (مضادات الذهان)، أدوية لعلاج التلوثات الجرثومية (مضادات حيوية من مجموعة الـ "ماكروليدات" مثل إيريترومييسين، أزيترومييسين وكلاريترومييسين).

● بروبينيسيد - لإعلاج القرص. من الجائز أن يعطيك طبيبك مقداراَ دوائياً أكثر إنخفاضا، إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى.

● سيميتيدين - لعلاج القرحات في الجهاز الهضمي والقرقان. من الجائز أن يعطيك طبيبك مقدار دوائي أكثر إنخفاضا، إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى.

إحك لطبيبك إذا انطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه.

لا يجوز تناول أقراص تأفانك بنفس الوقت مع الأدوية التالية، نظراً لأن هذا الأمر قد يؤثر على عمل تأفانك:

أقراص الحديد (لعلاج فقر الدم)، إضافات التوتياء، مضادات الحموضة الحاسوبية منزوعة الأيونات (تستعمل للقرقان)، ديدانوزين، أو سوكرالفات (لقرحات المعدة) (أنظر الفقرة 3 لاحقاَ «إذا كنت تتناول حالياَ أقراص الحديد، إضافات التوتياء، مضادات الحموضة، ديدانوزين أو سوكرالفات لاحقاَ».

فحوص البول للمستحضرات الأيونية

أثناء إستعمال تأفانك، هناك إمكانية لتلقي نتائج إيجابية خاطئة في فحوص البول لمسكات الآلام القوية المسماة المستحضرات الأيونية. إذا تم توجيهك من قبل طبيبك لإجراء فحص بول، إحك للطبيب بأنك تتناول تأفانك.

فحوصات للسل

أثناء إستعمال تأفانك، هنالك إمكانية لتلقي نتائج سلبية خاطئة في فحوص مخبرية معينة لتقصي الجراثيم المسببة للسل.

فحوص السكر

لدى مرضى السكري المتعالجين بمستحضرات فموية مضادة للسكري أو إنسولين يجب مراقبة نسب السكر في الدم.

إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان إستعمال الدواء مع وجبة الطعام أو بأي وقت بين الوجبات.

الحمل والإرضاع

لا يجوز إستعمال تأفانك إذا:

● كنت في فترة الحمل، من شأنك أن تصبحي حامل أو تظنين بأنك حامل. كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع.

السياقة وإستعمال الماكينات

قد تعاني من أعراض جانبية بعد تناول هذا الدواء والتي تشمل الشعور بدوار، ميل للثوم، الشعور بدوران (فيرتيغو) أو تغيرات في الرؤية. قد تؤثر بعض من هذه الأعراض الجانبية على قدرتك على التركيز وعلى سرعة إستجابتك. إذا حدث هذا الأمر، فلا يجوز السياقة أو القيام بأي نشاطات تتطلب مستوى كبير من الإنتباه.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيحاء من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاَ بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. يتعلق المقدار الدوائي بنوع التلوث لديك وبمكانه في الجسم. يتم تحديد فترة العلاج حسب شدة التلوث.

إذا شعرت بأن تأثير الدواء أضعف مما ينبغي أو أقوى مما ينبغي، فلا تغير المقدار الدوائي من تلقاء نفسك، بل إستوضح عن ذلك من طبيبك.

كبار ومسنون لديهم مشاكل في الكلى

من الجائز أن يعطيك الطبيب مقداراَ دوائياً أخفض.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا يجوز إعطاء هذا الدواء للأطفال أو للمراهقين.

لا يجوز المضغ! لا يجوز السحق، يجب بلع الدواء مع كأس من الماء، بالإمكان شطر القرص في خط الشطر الذي على وجه القرص من أجل تناول نصف مقدار دوائي عند الحاجة.

بالإمكان تناول الدواء مع وجبة الطعام أو بأي وقت بين الوجبات.

إذا كنت تتناول حالياَ أقراص الحديد، إضافات التوتياء، مضادات الحموضة، ديدانوزين أو سوكرالفات، فلا يجوز تناول هذه الأدوية سوية مع تأفانك. يجب ترك فاصل زمني قدره ساعتين على الأقل قبل أو بعد تناول تأفانك.

إحم جلدك من الشمس

يجب الإمتناع عن التعرض المباشر للشمس خلال العلاج بهذا الدواء ولمدةٍ يومين إضافيين بعد توقف عن تناوله. لأن جلدك يصبح أكثر حساسا للشمس مما يؤدي إلى حروق، وخز أو حوصصات خطيرة إذا لم تتخذ إجراءات الحذر التالية:

● تأكد من إستعمالك لكريم ذو عامل وقاية مرتفع

● ارتدي دائماَ قبعة وثياب تغطي ذراعيك ورجليك

● واتجه نحو إستعمال أسرة التشفيع

إذا تناولت بالخطأ مقداراَ دوائياً أكبر

إذا تناولت بالخطأ مقداراَ دوائياً أكبر أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالا إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر معك علبة الدواء. لكي يعلم الطبيب ماذا تناولت.

قد تعاني من الأعراض التالية: نوبات إختلاج، الشعور بإرتباك، دوار، تناقص الوعي، رجفان ومشاكل في القلب - التي تؤدي لعدم إنتظام النبض، كذلك غثيان أو الشعور بحرقان في المعدة.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تتناول الدواء حال تذكرك، إلا إذا إقترب وقت تناول الجرعة القادمة تقريبا. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصاك الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول الدواء فقط لأنك تشعر بتحسن كبير.

من المهم أن تكمل العلاج كما وصف من قبل الطبيب. إذا توقفت عن العلاج أكثر مما ينبغي، فإن التلوث قد يعود، حالتك قد تتفاقم أو أن الجرثومة قد تطور مقاومة للدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تأفانك قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض

المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

هذه الأعراض الجانبية هي عادة طفيفة أو متوسطة وفي أحيان متقاربة تختفي بعد وقت قصير.

يجب التوقف عن إستعمال تافانيك والتوجه حالاً للطبيب أو للمستشفى إذا كنت تعاني من الأعراض الجانبية التالية:

نادرة جداً (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 10.000) - رد فعل تحسسي. العلامات يمكن أن تشمل: طفح، مشاكل في التنفس أو في البلع، إنتفاخ الشفتين الوجه، الحنجرة أو اللسان لديك.

يجب التوقف عن إستعمال تافانيك والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تلاحظ إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة التالية - من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي طارئ:

نادرة (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 1.000) - إسهال مائي الذي قد يكون دموي أيضاً، حيث من الجائز أن يترافق بقلصات في البطن وسخونة مرتفعة. هذه قد تكون علامات لمشكلة خطيرة في الأمعاء.

آلم والتهاب في الأوتار أو الأربطة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تمزقها. **وتر العرقوب هو الذي يتأثر على الأغلب.**

- إختلاجات.

- رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هذيان، بارانويا)، تغير رأيك وأفكارك (ردود فعل ذهانية) مع خطورة لأفكار أو أفعال إنتحارية.

- الشعور بآكتئاب، مشاكل نفسية، الشعور بعدم هدوء، أحلام غريبة أو كوابيس.

- **إنخفاض نسب السكر في الدم (hypoglycemia)** أو إنخفاض نسب السكر في الدم الذي يؤدي إلى سبات (سبات ناجم عن نقص السكر في الدم).

هذه المعلومات هامة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السكري.

نادرة جداً (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 10.000) - الشعور بحرقة، وخز، آلم أو خدر. هذه يمكن أن تكون علامة لـ "إعتلال عصبي".

أعراض جانبية شيووعها غير معروف (أعراض شيووعها لم يحدد بعد)

- حالات طفح جلدي خطيرة تشمل متلازمة ستيفنس – جونسون و"إنتحلال البشرة التحري السمي" (TEN). هذه يمكن أن تظهر على الجسم على شكل بقع يشبه الهدف مائلة للون الأحمر أو بقع دائرية تتراشق أحيانا

بحويصلات في مركزها، تقشر الجلد، تقرح في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية والعينين ومن الجائز أن يسبقها سخونة وأعراض شبيهة بالإنفلونزا. أنظر الفقرة 2.

- فقدان الشهية للطعام، إصفرار الجلد والعينين، بول بلون داكن، حكة أو حساسية في البطن. هذه قد تكون علامات لمشاكل في الكبد التي قد تشمل فشل كبدي ميمت.

إذا تضررت الرؤية لديك أو إذا كنت تعاني من إضطرابات أيًا كانت في العينين خلال فترة العلاج ب تافانيك، يجب إستشارة طبيب العينين بشكل فوري.

إستشر الطبيب إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية التالية أو إذا إستمرت لأكثر من عدة أيام:

شائعة (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 10)

- مشاكل في النوم.

- صراع، الشعور بدوار.

- غثيان، تقيؤ وإسهال.

- إرتفاع نسبة إنزيمات كبد معينة في الدم.

غير شائعة (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 100) - تغيرات عدد جراثيم أو فطريات إضافية، تلوث ناتج عن فطر يسمى كاندنبا، الذي من الجائز أن يتطلب علاج.

- تغيرات في عدد خلايا الدم البيضاء في نتائج فحوص الدم (leukopenia, eosinophilia).

- الشعور بتوتر (قلق)، الشعور بإرتباك، الشعور بعصبية، الشعور بميل للنوم، إرتجاج، الشعور بدوار (فيرتيغو).

- ضيق في التنفس (dyspnea).

- تغيرات في حاسة التذوق، فقدان الشهية للطعام، معدة عصبية أو عسر هضم، آلم في منطقة البطن، الشعور بنفخة في البطن (غازات) أو إمساك.

- حكة وطفح جلدي، حكة شديدة أو شرى (urticaria)، فرط تعرق.

- آلم في المفاصل أو آلم في العضلات.

- قد تظهر نتائج شاذة في فحوص الدم جراء مشاكل في الكبد (زيادة في البيليروبين) أو في الكلى (زيادة في الكرياتينين).

- ضعف عام.

نادرة (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 1.000)

- كدمات وأنزفة تحدث بسهولة جراء إنخفاض في عد الصفائح الدموية (thrombocytopenia).

- إنخفاض نسبة خلايا الدم البيضاء (neutropenia).

- رد فعل مبالغ للجهاز المناعي (حساسية مفرطة).

- الشعور بوخز في اليدين وراحتي القدمين (paresthesia)

- مشاكل في السمع (طنين في الأذنين) أو في الرؤية (تشوش الرؤية).

- ضربات قلب سريعة بشكل غير إعتيادي (tachycardia) أو إنخفاض ضغط الدم.

- ضعف عضلي. هذا الأمر مهم لدى مرضى الوهن العضلي الوبيل (myasthenia gravis) - مرض نادر في الجهاز العصبي).

- تغيرات في الأداء الوظيفي للكلى وأحيانا قصور كلوي الذي قد يحدث نتيجة رد فعل تحسسي للكلى، المسمى إلتهاب الكلى الخلالي.

- سخونة.

- يقع حمامي (erythema) ذات حدود حادة مع/ بدون حويصلات، التي تتطور خلال ساعات من تناول ليفوفلوكساسين ويتم التعافي مع بقايا فرط التصبغ ما بعد الإلتهاب؛ الأمر عادة ما يعود في نفس المنطقة من الجلد أو الغشاء المخاطي بعد التعرض ثانية لـ ليفوفلوكساسين.

أعراض جانبية شيووعها غير معروف (أعراض لم يحدد شيووعها بعد) - تناقص كريات الدم الحمراء (فقر دم): قد يسبب شحوب أو إصفرار الجلد جراء تضرر خلايا الدم الحمراء، تناقص في تعداد كافة أنواع خلايا الدم (قلة الكريات الشاملة).

- سخونة، آلم في الحنجرة والشعور بوعدة عامة لا تزول. من الجائز أن تحدث نتيجة إنخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (ندرة المحببات).

- فقدان جريان الدم (رد فعل شبيه بصدمة إستهدافية).

- إرتفاع نسب السكر في دمك (فرط سكر الدم). هذه المعلومات مهمة بالنسبة لمرضى السكري.

- تغيرات بحاسة الشم، فقدان حاسة الشم أو المذاق.

- مشاكل في الحركية والمشى (خلل في الحركة، إضطراب خارج الهرمي).

- فقدان مؤقت للوعي أو للثبات (إغماء).

- فقدان رؤية مؤقت، إلتهاب في العينين.

- تضرر السمع أو فقدان السمع.

- تسارع نظم القلب بشكل غير سليم، عدم إنتظام نظم القلب بشكل خطراً على الحياة، بما فيه سكتة قلبية، تغييرات في نظم القلب (التي تُسمى "إطالة مقطع QT"، الذي يلاحظ في فحص ECG، تخطيط النشاط الكهربائي للقلب).

- صعوبات في التنفس أو صفير (تشنج القصبات).

- ردود فعل تحسسية رئوية.

- إلتهاب البنكرياس.

- إلتهاب الكبد (hepatitis).

- زيادة حساسية الجلد لضوء الشمس وللضوء فوق البنفسجي.

- إلتهاب الأوعية الدموية جراء رد فعل تحسسي (vasculitis).

- إلتهاب مخاطية الفم.

- تمزقات عضلية وتلف عضلي (إنتحلال العضلات المخططة).

- إحمرار وإنتفاخ في المفاصل (إلتهاب المفاصل).

- آلم، بما في ذلك آلم في الظهر، في الصدر وفي الأطراف.

- نوبات يورفيريا لدى مرضى اليورفيريا (مرض إستقلابي نادر جداً).

- صراع متواصل مع أو بدون تشوش في الرؤية (إرتفاع حميد للضغط داخل الجمجمة).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسعّم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يجب التخزين بدرجة حرارة تقل عن 30 درجة مئوية. يجب حفظ الأقراص في العلبة الأصلية.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose, hypromellose, crospovidone, sodium stearyl fumarate, titanium dioxide (E171), talc, macrogol 8000, red & yellow ferric oxide (E172).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أقراص تافانيك هي أقراص مطلية مخصصة للبلع. الأقراص مطاولة الشكل وذات خط للسطر، ذات لون شاحب مائل للأصفر - أبيض حتى مائل للحمرة - أبيض.

الأقراص معبأة ضمن لويجات ذات 1, 5, 7, 10 أقراص.

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلبة.

صاحب الإمتياز: سانوفي - أفنتيس إسرائيل م.ض، ص.ب. 8090، نتانيا 4250499.

المنتج: سانوفي - وينتروپ للصناعات، فرنسا.

تم إعدادها في تموز 2020 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

هذه النشرة لا تحتوي على كافة المعلومات عن الدواء. إذا توفرت لديك أية أسئلة أو إذا لم تكن واثقا من شيء، ما الرجاء مراجعة الطبيب.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 119442996321

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.