

אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי תמיסה להזרקה תת-עורית

החומר הפעיל וריכוזו:
כל מ"ל תמיסה מכיל:

אבאטספט 125 מ"ג
abatacept 125 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6 ו-"מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בסעיף 2.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי:

- מיועדת להפחתת סימנים ותסמינים, השריית תגובה קלינית מוגברת, עיכוב התקדמות הנזק המבני ושיפור התפקוד הגופני בחולים מבוגרים הסובלים מדלקת מפרקים שגרנית (Rheumatoid Arthritis) פעילה בינונית עד חמורה. ניתן להשתמש באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי במבוגרים כטיפול יחיד או בשילוב עם תרופות ממשפחת (DMARDs) disease-modifying antirheumatic drugs, מלבד תרופות מסוג נוגדי TNF (tumor necrosis factor antagonists).
- אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי מיועדת לטיפול בחולים מבוגרים עם דלקת מפרקים ספחתית פעילה active psoriatic arthritis (PsA).

קבוצה תרפויטית: מדכא סלקטיבי של מערכת החיסון

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתכשיר אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אבאטספט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת המרכיבים הנוספים, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- **לפני הטיפול באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי ספר לרופא על כל מצב רפואי שלך, לרבות אם:**
 - יש לך זיהום כלשהו, גם אם הוא קטן (כגון חתך פתוח או פצע), או זיהום שהוא בכל הגוף (כגון שפעת).
 - אם יש לך זיהום בזמן הטיפול באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי, קיים סיכוי גבוה יותר להופעת תופעות לוואי חמורות.
 - יש לך זיהום שאינו נעלם או שחוזר שוב ושוב.
 - הנך סובל או סבלת בעבר מדלקת בכבד כתוצאה מזיהום (דלקת כבד ויראלית).
- לפני תחילת הטיפול באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי, ייתכן שהרופא המטפל יערוך לך בדיקה לדלקת כבד.

- סבלת מזיהום בריאות שנקרא שחפת (טוברקולוזיס (TB)), קיבלת תוצאות חיוביות של בדיקה עורית לשחפת או שהיית לאחרונה במגע קרוב עם מישהו שהייתה לו שחפת.
- לפני תחילת הטיפול באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי, ייתכן שהרופא המטפל יערוך לך בדיקה לשחפת או יבצע בדיקה עורית.
- תסמיני שחפת יכולים לכלול: שיעול שאינו עובר, ירידה במשקל, חום והזעת לילה.
- הנך עומד לעבור ניתוח.
- קיבלת לאחרונה חיסון או מתוכנן לך חיסון. במהלך הטיפול באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי וכן במהלך 3 החודשים לאחר סיום הטיפול באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי, אסור לך לקבל חיסונים חיים.
- יש לך עבר של בעיית נשימה הנקראת מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD).
- אורנסיה 125 מ"ג להזרקה תת-עורית (ניתנת בזריקה מתחת לעור) אינה מכילה מלטוז. אין צורך לשנות את צורת ניטור רמות הסוכר שלך בדם אם אתה מקבל אורנסיה 125 מ"ג במתן תת-עורי.
- הנך בהריון או מתכננת הריון, ראי סעיף "הריון והנקה".
- הנך מניקה או מתכננת להניק. ראי סעיף "הריון והנקה".
- ישנם אנשים שטופלו באורנסיה ופיתחו סרטן עור. ספר לרופא שלך אם יש לך עבר משפחתי או אישי של סרטן העור ואם הנך רואה גידולים כלשהם או שינויים במראה העור שלך במהלך או אחרי הטיפול באורנסיה.
- ייתכן שקיים סיכוי גבוה יותר לפתח זיהום חמור אם תשתמש באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי יחד עם תרופות ביולוגיות אחרות לדלקת מפרקים שגרונת (RA) או לדלקת מפרקים ספחתית (PsA).

ילדים ומתבגרים:

אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי אינה מיועדת לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי עלולה להשפיע על האופן בו פועלות תרופות אחרות, ותרופות אחרות עלולות להשפיע על האופן בו אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי פועלת ולגרום לתופעות לוואי חמורות. במיוחד אם אתה לוקח תרופות ביולוגיות אחרות לטיפול בדלקת מפרקים שגרונת (RA) או בדלקת מפרקים ספחתית (PsA), אשר עלולות להשפיע על מערכת החיסון שלך, כגון:

- אטנרספט
- אדלימומאב
- אינפליקסימאב
- אנקינרה
- ריטוקסימאב
- גולימומב
- סרטוליזומאב פגול
- טוסיליזומאב

הריון והנקה:

ספרי לרופא המטפל אם הנך בהריון או אם את מתכננת הריון. לא ידוע האם אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי יכולה להזיק לעוברך.

אם נטלת אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי במהלך ההריון, שוחחי עם הרופא המטפל שלך בטרם תינוקך יקבל חיסונים כלשהם.

ספרי לרופא המטפל אם את מניקה או מתכננת להניק. לא ידוע האם אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי עוברת לחלב האם. שוחחי עם הרופא המטפל שלך על הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך אם את מטופלת באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן למנה, ולכן נחשבת ל"נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

אם הרופא המטפל שלך יחליט שאתה או מטפל מטעמך יכולים להזריק לך אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי במזרק מוכן לשימוש בבית, עליך או על המטפל שלך לעבור הדרכה בנוגע לדרך הנכונה להכנה והזרקה של אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי. אל תנסה להזריק אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי עד שתקבל הדרכה מהצוות המקצועי (רופא או אחות) על הדרך הנכונה להזרקה.

טיפול במבוגרים עם דלקת מפרקים שגרנית (Rheumatoid Arthritis)

- המינון המקובל בדרך כלל של אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי לטיפול במבוגרים עם דלקת מפרקים שגרנית (Rheumatoid Arthritis) הוא זריקה תת-עורית פעם בשבוע.
- במקרים מסוימים הרופא ייתן לך באופן חד פעמי בתחילת הטיפול מנת העמסה של עירוי של אורנסיה IV. במקרה זה, הזריקה התת-עורית של אורנסיה צריכה להינתן בתוך יום מהעירוי התוך ורידי.
- מטופלי אורנסיה במתן תוך ורידי (עירוי) העוברים לטיפול באורנסיה במתן תת-עורי – יש לקבל את הזריקה התת-עורית הראשונה במקום העירוי התוך ורידי הקרוב המתוכנן.

טיפול במבוגרים עם דלקת מפרקים ספחתית פעילה (Active Psoriatic Arthritis)

- המינון המקובל בדרך כלל של אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי לטיפול במבוגרים עם דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic arthritis) הוא זריקה תת-עורית פעם בשבוע.
- מטופלי אורנסיה במתן תוך ורידי (עירוי) העוברים לטיפול באורנסיה במתן תת-עורי – יש לקבל את הזריקה התת-עורית הראשונה במקום העירוי התוך ורידי הקרוב המתוכנן.
- יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
- ראה הוראות להכנה ומתן הזריקה של אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי בסוף העלון לצרכן.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם הזרקת מינון גבוה יותר של התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל:

- **זיהומים.** אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי עלולה להגדיל את הסיכוי לזיהומים או להחמיר זיהומים קיימים. ישנם אנשים שנפטרו מזיהומים אלו. פנה לרופא המטפל באופן מיידי אם אתה מפתח תסמיני זיהום כלשהם. תסמיני זיהום יכולים לכלול:
 - חום
 - הרגשת עייפות כבדה
 - שיעול
 - תסמינים דמויי שפעת
 - עור חם, אדום או כואב.
- תופעות לוואי השכיחות ביותר שהובילו להתערבות רפואית (שינויים בטיפול או הפסקת הטיפול באורנסיה) במתן התרופה היו בעקבות זיהום.
- הזיהומים השכיחים ביותר שדווחו שהובילו לשינויים במינון התרופה היו: זיהום בדרכי הנשימה העליונות, דלקת סימפונות (ברונכיטיס) ושלבתת חוגרת (הרפס זוסטר).
- הזיהומים השכיחים ביותר שהובילו להפסקת הטיפול בתרופה היו: דלקת ריאות (Pneumonia), זיהומים מקומיים ודלקת סימפונות (ברונכיטיס).
- הזיהומים השכיחים ביותר שדווחו: זיהום בדרכי הנשימה העליונות, דלקת של הגרון והאף (נאזופרינגיטיס), דלקת בסינוסים (סינוסיטיס), זיהום בדרכי שתן, שפעת ודלקת סימפונות (ברונכיטיס).
- זיהומים נוספים שדווחו: דלקת אף (ריניטיס), שלבתת פשוטה (הרפס סימפלוקס) ודלקת ריאות (Pneumonia).
- הזיהומים החמורים השכיחים ביותר שדווחו היו: דלקת ריאות (Pneumonia), זיהום ברקמות רכות (צלוליטיס), זיהום בדרכי שתן, דלקת סימפונות (ברונכיטיס), מחלת סעיף (מחלת המסעפת, דיברטיקוליטיס) ודלקת אקוטית בכליה ואגן הכליה (פיאלונפריטיס אקוטית).
- **תגובות אלרגיות.** תגובות אלרגיות יכולות להתפתח באנשים המשתמשים באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי. פנה לרופא המטפל או גש לחדר המיון באופן מיידי אם אתה מפתח תסמיני כלשהו של תגובה אלרגית. תסמינים של תגובה אלרגית יכולים לכלול:
 - פריחה עורית אלרגית (סרפדת)
 - נפיחות בפנים, בעפעפיים, בשפתיים או בלשון
 - קושי בנשימה
 - תת לחץ דם
- **זיהום מסוג הפטיטיס B באנשים הנושאים את הוירוס בדמם.** אם אתה נשא של וירוס ההפטיטיס B (וירוס המשפיע על הכבד), הוירוס יכול להפוך פעיל במהלך השימוש באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי. ייתכן שהרופא המטפל יערוך בדיקות דם לפני התחלת הטיפול באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי.
- **חיסונים.** אין לקבל אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי עם חיסונים מסוגים מסויימים (חיסונים חיים). הינך יכול לקבל חיסונים שאינם חיים, כגון חיסון נגד זיהומים פנאומוקוקיים וחיסון מומת (לא פעיל) נגד שפעת. אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי גם עלולה לגרום לחיסונים מסויימים להיות פחות יעילים. שוחח עם הרופא המטפל שלך לגבי החיסונים המתוכננים לך.
- **בעיות נשימה באנשים הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD).** הנך עלול לפתח בעיות נשימה מסוימות לעתים קרובות יותר אם הנך מקבל אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי ויש לך COPD. תסמיני בעיות במערכת הנשימה כוללים:
 - החמרה במחלת ה-COPD
 - שיעול
 - חרחור
 - קושי בנשימה

○ דלקת ריאות (Pneumonia)

- **סרטן (ממאיריות).** סוגים מסויימים של סרטן דווחו בחולים המטופלים באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי. לא ידוע אם אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי מגבירה את הסיכוי לחלות בסוגי סרטן מסויימים. סוגי סרטן שנצפו כללו סרטן ריאות, לימפומות, סרטן עור, סרטן שד, סרטן צינור המרה, סרטן שלפוחית השתן, סרטן צוואר הרחם, סרטן רירית הרחם, מלנומה, תסמונת מיאלודיספלסטית, סרטן השחלות, סרטן הערמונית, סרטן כליות, סרטן בלוטת התריס וסרטן הרחם.

תופעות הלוואי השכיחות ביותר של אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי כוללות:

- כאב ראש
- זיהום בדרכי הנשימה העליונות
- בחילה
- דלקת של הגרון והאף (נאזופרינגיטיס)

תופעות לוואי נוספות:

- כאבי ראש
- דלקת של הגרון והאף (נאזופרינגיטיס)
- סחרחורות
- שיעול
- כאב גב
- יתר לחץ דם
- קשיי עיכול
- זיהום בדרכי שתן
- פריחה
- כאב בגפיים

תגובות באתר ההזרקה בחולים מבוגרים הסובלים מדלקת מפרקים שגרנית שטופלו באורנסיה 125 מ"ג תת-עורי כללו שטף דם פנימי (המטומה), גרד ואדמנת (אריתמה)

תופעות לוואי שדווחו לאחר שיווק התרופה (Postmarketing experience)

- דלקת כלי הדם (וסקוליטיס)
- הופעה חדשה של מחלת ספחת (פסוריאזיס) או החמרה במחלה קיימת
- סרטני עור שאינם מלנומה (קרצינומת תאי בסיס (basal cell carcinoma) וקרצינומת תאי קשקש (squamous cell carcinoma))
- תגובות סיסטמיות בעקבות ההזרקה (כגון: גרד, לחץ בגרון, קוצר נשימה)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי איחסון:

- אחסן במקרר בטמפרטורה 2°C - 8°C .
- אין להקפיא את התרופה. אחסן באריזה המקורית על מנת להגן מאור.
- יש להשליך בצורה בטוחה תרופה פגת תוקף או שאיננה בשימוש יותר.

6. מידע נוסף:

- **נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**
Sucrose, poloxamer 188, disodium phosphate anhydrous, sodium phosphate monobasic monohydrate, water for injection.

- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**
כל מזרק מכיל 1.007 מ"ל תמיסה צלולה עד מעט בועקת בגוון שקוף עד צהוב בהיר.
האריזה מכילה 1, 4 או 12 מזרקים. ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.
- **בעל הרישום וכתובתו:** בריסטול - מאירס סקוויב (ישראל) בע"מ, רח' אהרון ברט 18, ת.ד. 3361, קרית אריה, פתח תקווה 4951448.
- **היצרן וכתובתו:** בריסטול - מאירס סקוויב הולדינגס פארמה בע"מ, ליאביליטי קומפני, מנאטי, פורטו-ריקו 00674, ארה"ב.


נערך בפברואר 2021.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 149-54-33788-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות להכנה ומתן הזריקה של אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי:

מזרק מוכן לשימוש של אורנסיה עם מגן מחט מסוג
BD UltraSafe Passive™



לפני תחילת השימוש הראשון וכן בכל פעם שאתה משתמש במזרק אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי מוכן לשימוש, אנא קרא את ההוראות בעיון. ייתכן שיהיה מידע חדש בהוראות. טרם שימוש ראשון במזרק מוכן לשימוש יש לוודא כי הצוות המקצועי (רופא או אחות) הנחה אותך בנוגע לדרך הנכונה להזריקה והחליט כי אתה או המטפל שלך יכולים להזריק אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי בבית.


חשוב:

- שמור את המזרק המוכן לשימוש במקרר עד שאתה מוכן להזריקה
- אין להקפיא את המזרק


לפני שאתה מתחיל: הכר את המזרק המוכן לשימוש שלך



לפני השימוש:



אחרי השימוש:



למזרק מוכן לשימוש יש **ידית אחיזה (Flange extender)** המקלה על אחיזה בו בזמן ההזרקה, וכן **מגן למחט (Needle guard)** אשר מכסה את המחט אוטומטית בתום פעולת ההזרקה.

אין להסיר את מכסה המחט (Needle Cover) לפני שאתה מוכן להזריק.
אל תמשוך חזרה את הבוכנה של המזרק בשום זמן נתון.
אל תחזיר את המכסה למזרק בשום זמן נתון, מאחר שזה עלול להרוס, לכופף או לשבור את המחט.



המשך לשלב 1
שלב 1: הכנה להזרקה של אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי

אסוף ושים את כל האביזרים לצורך ההזרקה שלך על משטח נקי ושטוח.

רק המזרק המוכן לשימוש נמצא באריזה.


- מגבון אלוהול



- מזרק מוכן לשימוש עם מגן מחט מסוג UltraSafe Passive



- פלסטר



- מכל אשפה מיוחד



- צמר גפן או פד גזה



תן למזרק המוכן לשימוש להתחמם.

- הוצא מהמקרר מזרק אחד מוכן לשימוש והמתן במשך **30 דקות** כדי לאפשר לו להגיע לטמפרטורת החדר.
- אין להאיץ את תהליך החימום בכל דרך אחרת כגון שימוש במיקרוגל או הנחה של המזרק במים חמים.
 - אין להסיר את מכסה המחט (Needle Cover) בזמן ההמתנה להגיעתו של המזרק המוכן לשימוש לטמפרטורת החדר.




שטוף היטב את הידיים במים ובסבון.



המשך לשלב 2.

שלב 2: בדוק את המזרק המוכן לשימוש

- החזק את המזרק המוכן לשימוש בגוף המזרק כך שמכסה המחט (Needle Cover) פונה כלפי מטה. ראה תמונה.
- בדוק את תאריך התפוגה המודפס על גבי התווית. אין להשתמש בתכשיר לאחר תאריך זה.
 - בדוק את המזרק המוכן לשימוש כדי לראות אם יש נזק. אין להשתמש אם הוא סדוק או שבור.




בדוק את הנוזל.

- **בדוק את נוזל המזרק המוכן לשימוש דרך חלונית הצפייה.**
על הנוזל להיות צלול ובגוון שקוף עד צהוב בהיר.

אין להזריק אם הנוזל עכור, צבעו השתנה או אם יש חלקיקים בתוכו.


לתשומת ליבך: זה תקין לראות בועת אוויר. אין לנסות להסירה.



המשך לשלב 3.

שלב 3: בדוק את המנה במזרק המוכן לשימוש

החזק את המזרק בגובה העיניים. הסתכל מקרוב על מנת לוודא שכמות הנוזל במזרק המוכן לשימוש היא בגובה קו המילוי או מעט מעליו:



אין להשתמש אם המזרק המוכן לשימוש אינו מכיל כמות תקינה של הנוזל. התקשר לרוקח שלך מידית.

ORENCIA125mgSC_NPL_MoH_Feb2021

המשך לשלב 4.


שלב 4: בחר והכן את אתר ההזרקה

בחר את אתר ההזרקה שלך.
בחר את אתר ההזרקה שלך **בבטן**,
בקדמת הירכיים או
באזור החיצוני של הזרוע העליונה (רק אם
הזריקה ניתנת על-ידי המטפל).



החלף בכל פעם את אתר ההזרקה:

- בכל שבוע אתה יכול להשתמש באותו איזור הזרקה בגופך, אך בכל פעם השתמש באתר הזרקה שונה באותו האיזור.
- **אל** תזריק באזור בו העור רגיש, פצוע, אדום, קשקשי או קשה.
- **הימנע** מהזרקה באזורים עם צלקות או סימני מתיחה.
- בצע רישום של התאריך, השעה ואתר ההזרקה שבו הזרקת.




נקה בעדינות את אתר ההזרקה.

- נגב את אתר ההזרקה באמצעות פד האלכוהול והנח לו להתייבש באוויר.
- **אין** לגעת שוב באתר ההזרקה לפני ההזרקה.
- **אין** לנשוף על איזור ההזרקה הנקי.

הסר את מכסה המחט (needle cover) על-ידי החזקה ביד אחת את גוף המזרק המוכן לשימוש ומשיכת מכסה המחט על-ידי היד השנייה.

אל תשים את מכסה המחט חזרה על המחט לאחר שהסרת אותו .
השלך את מכסה המחט לפח האשפה הביתית.

- **אין** להשתמש במזרק המוכן לשימוש אם הוא נפל לאחר שהסרת את מכסה המחט.
- **אל** תשתמש במזרק המוכן לשימוש אם המחט פגומה או מעוקמת.
לתשומת ליבך: זה תקין לראות טיפת נוזל יוצאת מהמחט .



1_Feb2021



אין להחזיר חזרה את מכסה המחט של המזרק המוכן לשימוש, כיוון שזה עלול לפגום במחט.

המשך לשלב 5
שלב 5: הזרק את מנת האורנסיה 125 מ"ג תת-עורי שלך


החזק את גוף המזרק המוכן לשימוש בידך באמצעות האגודל והאצבע המורה. בידך הפנויה **תפוס (בצורת צביטה) את איזור העור שניקית.**



הכנס את המחט.
הכנס בעדינות את המחט אל תוך העור שתפסת בזווית של 45 מעלות.



השלם את כל השלבים על מנת לקבל מנה מלאה של התרופה.




ודא: לאחר סיום ההזרקה, **מגן המחט יכסה את המחט** וייתכן שתשמע קליק.

שחרר את מגן המחט: הרם באיטיות את האגודל מראש בוכנת המזרק על מנת להפעיל את מגן המחט.

הזרק: השתמש באגודל על מנת **לדחוף את ראש הבוכנה עד כמה שניתן.**

הוצא את המזרק המוכן לשימוש והרפה מהעור שתפסת.

המשך לשלב 6



שלב 6: לאחר ההזרקה

טיפול באתר ההזרקה:

- ייתכן דימום קל באתר ההזרקה. ניתן ללחוץ על אתר ההזרקה עם פיסת צמר גפן או פד גזה.
- אין לשפשף את אתר ההזרקה.
- במידת הצורך ניתן לכסות את אתר ההזרקה בפלסטר.

השלכת מזרקים משומשים:

- מיד אחרי השימוש השלך את המזרק של אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי למכל אשפה מיוחד.
- **אל תזרוק מחטים משומשות ומזרקים לפח האשפה הביתי שלך.**
- אם אין ברשותך מכל אשפה מיוחד, אתה יכול להשתמש במכל אשפה ביתי שהוא:
 - עשוי מפלסטיק קשיח
 - יכול להיסגר בסגירה מלאה עם מכסה עמיד לניקוב, כך שלא יוכלו ליפול מזרקים מתוך המכל
 - אנכי ויציב במהלך השימוש
 - עמיד לנזילות
 - בעל סימון של אזהרה מתאימה לגבי הימצאות פסולת מסוכנת בתוכו
- **אל תזרוק את מכל האשפה המיוחד לפח האשפה הביתי. אל תמחזר את מכל האשפה המיוחד המשומש.**

אם הזריקה ניתנה לך על-ידי אדם אחר, עליו להיות זהיר בזמן מגע עם המזרק על מנת להימנע מפציעה בטעות מדקירת המחט ומהעברה אפשרית של זיהום. **הרחק את המזרקים המוכנים לשימוש של אורנסיה 125 מ"ג תת-עורי ואת מכל האשפה מהישג ידם של ילדים.**

