

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סומטרידקס® 100, 50, קפליות

כל קפלייה מכילה סומאטריפטן (סומאטריפטן) (Sumatriptan) (as succinate) בכמויות 50 או 100 מ"ג. את התאמה.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו ברטע
השתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל העובד. תרופה זו נרשמה בעברך. אל תחזיק אותה לאחרים. היא עלולה להזיק, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי ידומה.

1. למה מיועדת התרופה?

סומטרידקס משמשת להקלה אקוטית בהתקפי מיגרנה, עם או בלי אזורי. היא הושתתה על **סומטרידקס** רק כאשר ישנה אבחנה ברורה של מיגרנה. **קבוצה תרופתית:** משככי כאבים: טריפטנים - אגוניסטים סלקטיביים לקולטן 5-HT_{1B/1D}.

תסמיני מיגרנה עלולים להיגרם על ידי התרחבות זמנית של כלי דם בראש. סומטריפטן נחשב מנפחית את התרחבות כלי הדם. זה כשלעצמו מסייע לשכך את כאב הראש ולהקלה על תסמינים אחרים של התקף מיגרנה, כגון בחילה או הקאה ורגישות לאור ולקול.

2. לפני השימוש בתרופה

אם אתה גריש (אלרגי) לחומר הפעיל (סומאטריפטן) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים של מכלית התרופה (ראה סעיף 6).

אם יש לך בעיית לב כגון היצרות של העורקים (מחלת לב איסכמית), או כאבים בחזה (תעוקת חזה), או אם היה לך תקף לב.

אם יש לך בעיות ברימת הדם ברגליך אשר גורמות לכאבים מדי התכוונויות בזמן שאתה הולך (מחלת כלי דם היקפיים).

אם היה לך אירוע מוחי או אירוע מוחי חרף (מנוחם גם התקף איסכמי חורף או TIA).

אם יש לך לחץ דם גבוה. ייתכן שתוכלי להשתמש ב**סומטרידקס** אם לחץ הדם הגבוה שלך הוא מתון ומסופל.

אם יש לך מחלת לבד מתחורה. עם תרופות אחרות למיגרנה, כולל אלו המכילות ארגוטאמינן או תרופות דומות כגון מתיסריד מלאט (methysergide maleate); או כל טריפטן, או אגוניסט 5-HT_{1B/1D} (כגון נארטריפטן או זולמיטריפטן).

עם כל אחת מהתרופות נוגדות דיכאון הבאות:
○ מעכבי מונואמינן אוקסיאז (MAOIs) או כל לקחת MAOI בשבועיים האחרונים.

חולפות במהירות, או שהן מחמירות: ← **פנה מייד לקבלת עזרה רפואית.** סעיף 4 (מופיע בהמשך) כולל מידע נוסף על תופעות לוואי אפשריות אלה.

גבובות בין תרופות שאסור לקחת עם סומטרידקס ואחרות עלולות לגרום לתופעות לוואי אם הן נלקחות עם סומטרידקס.

אם אתה לוקח, או אם אתה לוקח להריון תרופות אחרות כולל תרופות לזכר, מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח: ארגוטאמינן

עם משמשת טיפול במיגרנה, או תרופות דומות כגון מתיסריד (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה").

אל תשתמש ב**סומטרידקס** באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני שימוש ב**סומטרידקס**. אל תקח שוב כל תרופה החכילה ארגוטאמינן או מרכיבים הדומים לארגוטאמינן לפחות 6 שעות לאחר השימוש ב**סומטרידקס**.

טריפטנים/אגוניסטים לקולטן 5-HT_{1B/1D} (אחרים כגון נארטריפטן, זולמיטריפטן) או זולמיטריפטן המשמשים גם לטיפול במיגרנה (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתמש ב**סומטרידקס** באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש ב**סומטרידקס**. אל תקח שוב כל תרופה החכילה ארגוטאמינן או מרכיבים הדומים לארגוטאמינן לפחות 6 שעות לאחר השימוש ב**סומטרידקס**.

טריפטנים/אגוניסטים לקולטן 5-HT_{1B/1D} (אחרים כגון נארטריפטן, זולמיטריפטן) המשמשים גם לטיפול במיגרנה (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתמש ב**סומטרידקס** באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש ב**סומטרידקס**. אל תקח שוב כל תרופה החכילה ארגוטאמינן או מרכיבים הדומים לארגוטאמינן לפחות 6 שעות לאחר השימוש ב**סומטרידקס**.

תרופות MAOIs המשמשות לטיפול בדיכאון. אם לקחת אותן בשבועיים האחרונים אל תשתמש ב**סומטרידקס**.

תרופות טריציקליים המשמשות לטיפול בדיכאון. אם לקחת אותן בשבועיים האחרונים אל תשתמש ב**סומטרידקס**.

תרופות SSRIs, SNRIs, TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים) המשמשות לטיפול בדיכאון. שימוש ב**סומטרידקס** יחד עם תרופות אלה עלול לגרום לתסמונת סרטונין (אוסף של תסמינים שיכולים לכלול חוסר מנוחה, בלבול, הדיעה, הזיות, הפרקסיות מעורבים, תלמויות שרירים, פזמורטר, עלייה בדופק ורעד). ספר לרופא שלך מיידי אם אתה מושפע באופן זה.

הפירקיום פרופרטום (St. John's Wort). נטילת תרופות פצמיות המכילות הפירקיום יחד עם סומטרידקס עלולה להעלות את הסיכוי לתופעות לוואי.

הריון, הנקה ופוריות
אם אתה בהריון, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת להרות, היועצך ברופא לפני השימוש בתרופה. שימוש מוגבל בלבד על הבטיחות של סומטרידקס בנישים בהריון, אם כי עד כה אין ראיה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדים. הרופא שלך ידון איתך האם את צריכה או לא צריכה להשתמש ב**סומטרידקס** כשאת בהריון.

אם אתה לוקח תרופות נוגדות דיכאון (מעכבי סלקטיביים עם ספיגה חזרה של סרטונין) או SNRIs (מעכבי ספיגה חזרה של סרטונין ונוורדרגלין), או TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים).

← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בסומטרידקס.** ראה גם סעיף "גבובות בין תרופות" להלן.

אם אתה משתמש בסומטרידקס לעיתים קרובות שימוש תכוף מדי בסומטרידקס עלול להחמיר את כאבי הראש שלך.

← **ספר לרופא שלך אם זה מתייחס אליך.** הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק להשתמש בסומטרידקס.

אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה משתמש בסומטרידקס תופעות אלה עלולות להיות עזות אך הן בדרך כלל חולפות במהירות. אם אינן

הריון, הנקה ופוריות
אם אתה בהריון, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת להרות, היועצך ברופא לפני השימוש בתרופה. שימוש מוגבל בלבד על הבטיחות של סומטרידקס בנישים בהריון, אם כי עד כה אין ראיה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדים. הרופא שלך ידון איתך האם את צריכה או לא צריכה להשתמש ב**סומטרידקס** כשאת בהריון.

אם אתה לוקח תרופות נוגדות דיכאון (מעכבי סלקטיביים עם ספיגה חזרה של סרטונין) או SNRIs (מעכבי ספיגה חזרה של סרטונין ונוורדרגלין), או TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים).

← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בסומטרידקס.** ראה גם סעיף "גבובות בין תרופות" להלן.

אם אתה משתמש בסומטרידקס לעיתים קרובות שימוש תכוף מדי בסומטרידקס עלול להחמיר את כאבי הראש שלך.

← **ספר לרופא שלך אם זה מתייחס אליך.** הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק להשתמש בסומטרידקס.

אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה משתמש בסומטרידקס תופעות אלה עלולות להיות עזות אך הן בדרך כלל חולפות במהירות. אם אינן

חולפות במהירות, או שהן מחמירות: ← **פנה מייד לקבלת עזרה רפואית.** סעיף 4 (מופיע בהמשך) כולל מידע נוסף על תופעות לוואי אפשריות אלה.

גבובות בין תרופות שאסור לקחת עם סומטרידקס ואחרות עלולות לגרום לתופעות לוואי אם הן נלקחות עם סומטרידקס.

אם אתה לוקח, או אם אתה לוקח להריון תרופות אחרות כולל תרופות לזכר, מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח: ארגוטאמינן

עם משמשת טיפול במיגרנה, או תרופות דומות כגון מתיסריד (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה").

אל תשתמש ב**סומטרידקס** באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני שימוש ב**סומטרידקס**. אל תקח שוב כל תרופה החכילה ארגוטאמינן או מרכיבים הדומים לארגוטאמינן לפחות 6 שעות לאחר השימוש ב**סומטרידקס**.

טריפטנים/אגוניסטים לקולטן 5-HT_{1B/1D} (אחרים כגון נארטריפטן, זולמיטריפטן) המשמשים גם לטיפול במיגרנה (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתמש ב**סומטרידקס** באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש ב**סומטרידקס**. אל תקח שוב כל תרופה החכילה ארגוטאמינן או מרכיבים הדומים לארגוטאמינן לפחות 6 שעות לאחר השימוש ב**סומטרידקס**.

טריפטנים/אגוניסטים לקולטן 5-HT_{1B/1D} (אחרים כגון נארטריפטן, זולמיטריפטן) המשמשים גם לטיפול במיגרנה (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתמש ב**סומטרידקס** באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש ב**סומטרידקס**. אל תקח שוב כל תרופה החכילה ארגוטאמינן או מרכיבים הדומים לארגוטאמינן לפחות 6 שעות לאחר השימוש ב**סומטרידקס**.

תרופות MAOIs המשמשות לטיפול בדיכאון. אם לקחת אותן בשבועיים האחרונים אל תשתמש ב**סומטרידקס**.

תרופות טריציקליים המשמשות לטיפול בדיכאון. אם לקחת אותן בשבועיים האחרונים אל תשתמש ב**סומטרידקס**.

תרופות SSRIs, SNRIs, TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים) המשמשות לטיפול בדיכאון. שימוש ב**סומטרידקס** יחד עם תרופות אלה עלול לגרום לתסמונת סרטונין (אוסף של תסמינים שיכולים לכלול חוסר מנוחה, בלבול, הדיעה, הזיות, הפרקסיות מעורבים, תלמויות שרירים, פזמורטר, עלייה בדופק ורעד). ספר לרופא שלך מיידי אם אתה מושפע באופן זה.

הפירקיום פרופרטום (St. John's Wort). נטילת תרופות פצמיות המכילות הפירקיום יחד עם סומטרידקס עלולה להעלות את הסיכוי לתופעות לוואי.

הריון, הנקה ופוריות
אם אתה בהריון, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת להרות, היועצך ברופא לפני השימוש בתרופה. שימוש מוגבל בלבד על הבטיחות של סומטרידקס בנישים בהריון, אם כי עד כה אין ראיה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדים. הרופא שלך ידון איתך האם את צריכה או לא צריכה להשתמש ב**סומטרידקס** כשאת בהריון.

אם אתה לוקח תרופות נוגדות דיכאון (מעכבי סלקטיביים עם ספיגה חזרה של סרטונין) או SNRIs (מעכבי ספיגה חזרה של סרטונין ונוורדרגלין), או TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים).

← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בסומטרידקס.** ראה גם סעיף "גבובות בין תרופות" להלן.

אם אתה משתמש בסומטרידקס לעיתים קרובות שימוש תכוף מדי בסומטרידקס עלול להחמיר את כאבי הראש שלך.

← **ספר לרופא שלך אם זה מתייחס אליך.** הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק להשתמש בסומטרידקס.

אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה משתמש בסומטרידקס תופעות אלה עלולות להיות עזות אך הן בדרך כלל חולפות במהירות. אם אינן

הריון, הנקה ופוריות
אם אתה בהריון, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת להרות, היועצך ברופא לפני השימוש בתרופה. שימוש מוגבל בלבד על הבטיחות של סומטרידקס בנישים בהריון, אם כי עד כה אין ראיה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדים. הרופא שלך ידון איתך האם את צריכה או לא צריכה להשתמש ב**סומטרידקס** כשאת בהריון.

אם אתה לוקח תרופות נוגדות דיכאון (מעכבי סלקטיביים עם ספיגה חזרה של סרטונין) או SNRIs (מעכבי ספיגה חזרה של סרטונין ונוורדרגלין), או TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים).

← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בסומטרידקס.** ראה גם סעיף "גבובות בין תרופות" להלן.

אם אתה משתמש בסומטרידקס לעיתים קרובות שימוש תכוף מדי בסומטרידקס עלול להחמיר את כאבי הראש שלך.

← **ספר לרופא שלך אם זה מתייחס אליך.** הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק להשתמש בסומטרידקס.

אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה משתמש בסומטרידקס תופעות אלה עלולות להיות עזות אך הן בדרך כלל חולפות במהירות. אם אינן

חולפות במהירות, או שהן מחמירות: ← **פנה מייד לקבלת עזרה רפואית.** סעיף 4 (מופיע בהמשך) כולל מידע נוסף על תופעות לוואי אפשריות אלה.

גבובות בין תרופות שאסור לקחת עם סומטרידקס ואחרות עלולות לגרום לתופעות לוואי אם הן נלקחות עם סומטרידקס.

אם אתה לוקח, או אם אתה לוקח להריון תרופות אחרות כולל תרופות לזכר, מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח: ארגוטאמינן

עם משמשת טיפול במיגרנה, או תרופות דומות כגון מתיסריד (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה").

אל תשתמש ב**סומטרידקס** באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני שימוש ב**סומטרידקס**. אל תקח שוב כל תרופה החכילה ארגוטאמינן או מרכיבים הדומים לארגוטאמינן לפחות 6 שעות לאחר השימוש ב**סומטרידקס**.

טריפטנים/אגוניסטים לקולטן 5-HT_{1B/1D} (אחרים כגון נארטריפטן, זולמיטריפטן) המשמשים גם לטיפול במיגרנה (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתמש ב**סומטרידקס** באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש ב**סומטרידקס**. אל תקח שוב כל תרופה החכילה ארגוטאמינן או מרכיבים הדומים לארגוטאמינן לפחות 6 שעות לאחר השימוש ב**סומטרידקס**.

טריפטנים/אגוניסטים לקולטן 5-HT_{1B/1D} (אחרים כגון נארטריפטן, זולמיטריפטן) המשמשים גם לטיפול במיגרנה (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתמש ב**סומטרידקס** באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש ב**סומטרידקס**. אל תקח שוב כל תרופה החכילה ארגוטאמינן או מרכיבים הדומים לארגוטאמינן לפחות 6 שעות לאחר השימוש ב**סומטרידקס**.

תרופות MAOIs המשמשות לטיפול בדיכאון. אם לקחת אותן בשבועיים האחרונים אל תשתמש ב**סומטרידקס**.

תרופות טריציקליים המשמשות לטיפול בדיכאון. אם לקחת אותן בשבועיים האחרונים אל תשתמש ב**סומטרידקס**.

תרופות SSRIs, SNRIs, TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים) המשמשות לטיפול בדיכאון. שימוש ב**סומטרידקס** יחד עם תרופות אלה עלול לגרום לתסמונת סרטונין (אוסף של תסמינים שיכולים לכלול חוסר מנוחה, בלבול, הדיעה, הזיות, הפרקסיות מעורבים, תלמויות שרירים, פזמורטר, עלייה בדופק ורעד). ספר לרופא שלך מיידי אם אתה מושפע באופן זה.

הפירקיום פרופרטום (St. John's Wort). נטילת תרופות פצמיות המכילות הפירקיום יחד עם סומטרידקס עלולה להעלות את הסיכוי לתופעות לוואי.

הריון, הנקה ופוריות
אם אתה בהריון, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת להרות, היועצך ברופא לפני השימוש בתרופה. שימוש מוגבל בלבד על הבטיחות של סומטרידקס בנישים בהריון, אם כי עד כה אין ראיה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדים. הרופא שלך ידון איתך האם את צריכה או לא צריכה להשתמש ב**סומטרידקס** כשאת בהריון.

אם אתה לוקח תרופות נוגדות דיכאון (מעכבי סלקטיביים עם ספיגה חזרה של סרטונין) או SNRIs (מעכבי ספיגה חזרה של סרטונין ונוורדרגלין), או TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים).

← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בסומטרידקס.** ראה גם סעיף "גבובות בין תרופות" להלן.

אם אתה משתמש בסומטרידקס לעיתים קרובות שימוש תכוף מדי בסומטרידקס עלול להחמיר את כאבי הראש שלך.

← **ספר לרופא שלך אם זה מתייחס אליך.** הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק להשתמש בסומטרידקס.

אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה משתמש בסומטרידקס תופעות אלה עלולות להיות עזות אך הן בדרך כלל חולפות במהירות. אם אינן

הריון, הנקה ופוריות
אם אתה בהריון, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת להרות, היועצך ברופא לפני השימוש בתרופה. שימוש מוגבל בלבד על הבטיחות של סומטרידקס בנישים בהריון, אם כי עד כה אין ראיה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדים. הרופא שלך ידון איתך האם את צריכה או לא צריכה להשתמש ב**סומטרידקס** כשאת בהריון.

אם אתה לוקח תרופות נוגדות דיכאון (מעכבי סלקטיביים עם ספיגה חזרה של סרטונין) או SNRIs (מעכבי ספיגה חזרה של סרטונין ונוורדרגלין), או TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים).

← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בסומטרידקס.** ראה גם סעיף "גבובות בין תרופות" להלן.

אם אתה משתמש בסומטרידקס לעיתים קרובות שימוש תכוף מדי בסומטרידקס עלול להחמיר את כאבי הראש שלך.

← **ספר לרופא שלך אם זה מתייחס אליך.** הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק להשתמש בסומטרידקס.

אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה משתמש בסומטרידקס תופעות אלה עלולות להיות עזות אך הן בדרך כלל חולפות במהירות. אם אינן

הבאה בזמן הרגיל והיועצך ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדיקת הנוזלים והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה.

הרכב המרכיבים אם אתה לוקח להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועצך ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסומטרידקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהיל למקרא הישירות תופעות הלוואי. ייתכן שאת תסבול מאף אחת מהן. חלק מהתסמינים עלולים להיגרם על ידי המיגרנה עצמה.

הגובה אלרגי: פנה מייד לרופא לקבלת עזרה

תופעות הלוואי הבאות התרחשו אך שכיחותן המדויקת אינה ידועה.

סימני האלרגיה כוללים: פריחה, **חולת (פריחה מגרדת) - צפוצפון; עפעפים, נפיחות או שפתיים נפוחים; קריסת מערכת כלי דם.**

אם אתה חווה אחד מתסמינים אלה זמן קצר לאחר השימוש בסומטרידקס: ← **אל תשתמש יותר בתרופה.** פנה מייד לרופא.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-15% מהמשתמשים מתוך 100):

כאב, כבדות, לחץ או מתח בחזה, בגרון או בחלקים אחרים בגוף, או תחושות אלה, רגילות, חולשת חוסר תחושה, קוצץ וחום או קור. תופעות אלה עלולות להיות עזות אך בדרך כלל חולפות במהירות.

אם תופעות אלה משכיחות או מחמירות (מבלי להכאב בחזה):

← **קבל עזרה רפואית בדחיפות.** במספר קטן מאוד של אנשים תסמינים אלה יכולים להיגרם על ידי התקף לב.

תופעות לוואי שכיחות אחרות כוללות: בחילה או הקאה, אם כי זה עלול להיות עקב המיגרנה עצמה.

עייפות או נמנום

חרחורת, תחושת חולשה או גלי חום

עלייה זמנית בחץ הדם

קוצר נשימה

שרירים כואבים

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמשתם אחד מתוך 10,000):

שינויים בתפקוד הכבד. אם יש לך בדיקת דם לבדיקת תפקוד הכבד שלך, ספר לרופא שלך שאתה לוקח **סומטרידקס** (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

פרקוסים/התקפים, רעידות, התכוונויות שרירים, קישיון עורף

הפרעות ראייה כגון הבבוז, ירידה בראייה, ראייה כפולה, אובדן ראייה ובמקרים מסוימים אפילו קליניים בלתי הפיכים בראייה (אם כי אלה עלולים להיות בגלל התקף המיגרנה עצמו)

בעיות לב, בהן הדופק שלך עלול להיות מהיר יותר, איטי יותר או לשנות קצב, כאבים בחזה (תעוקת חזה) או להתקף לב.

עור חיוור, בוגרן כחולחול/או לא כאב באצבעות

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם: Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, acesulfame potassium, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous.

כיצד נראית התרופה ומה נוח האריזה:
סומטרידקס 50: קפלייה לבנה עם הטבעה של "50" בצד אחד.

סומטרידקס 100: קפלייה לבנה עם הטבעה של "100" בצד אחד.

גודלי אריזה מאושרים: 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 20, 24, 28, 30, 48 קפליות. ייתכן שיש גודלי אריזות משוקיים.

נערך בינואר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.