

هيستازين أقراص

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص على: ثنائي هيدروكلوريد السيتيريزين 10 ملغ (cetirizine dihydrochloride 10 mg) المواد غير الفعالة ومُسيبات الحساسية: انظر الفصل 2، البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفضل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عليك تناول المستحضر حسب التعليمات في بند الجرعة الوارد في هذه النشرة. استشر صيدلًا إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد مرور 3 أيام.

1. لم أعد هذا الدواء؟

لعلاج الزكام التحسسي الموسمي والسني ولعلاج الطلع (الشرى) المزمن الذي يتميز بتهيّج الجلد (مثل الحكة، الطفح). للبالغين والأطفال فوق سن 6 سنوات.

المجموعة العلاجية: مضادات الهيستامين

ثنائي هيدروكلوريد السيتيريزين، المركب الفعال في الأقراص هو مضاد الهيستامين. وهو يتبط تأثيرات مادة تدعى الهيستامين الموجودة في الجسم بشكل طبيعي. يشارك الهيستامين في ردود الفعل الأرجية.

تساعد مضادات الهيستامين، مثل هيستازين، على تخفيف الأعراض المزعجة والمقلقة المتعلقة بهذه الحالات، مثلًا: العطس، تهيّج الأنف، سيلان، وانسداد، حكة في العينين، احمرار العينين، وذرف الموع، وطفح جلدي.

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت تعاني من مرض كلوي خطير (قصور عمل الكلى الخطير مع إخلاء الكرياتينين بوتيرة أقل من 10 ملل/الحقة)؛
- كانت لديك حساسية (أرجية) لثنائي هيدروكلوريد السيتيريزين أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء، المفضلة في الفصل 6، حساسية لهيدروكسيدين أو لأي من مشتقات البيبرازين (مكونات فعالة شبيهة، من مجموعة البيبرازين، المتوفرة في أدوية أخرى).

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

قبل استعمال هيستازين أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من قصور عمل الكلى. عند الحاجة، ستتناول جرعة أقل من الدواء.
- أخذت الطبيب المتعالج جرعة الدواء الجديدة.
- كانت لديك مشاكل في التبول (مثلًا: مشاكل في النخاع الشوكي أو في البروستات أو المثانة).
- كنت تعاني من داء الصرع (Epilepsy) أو إذا كنت معرضا للإصابة بالاختلاجات.
- خذك لك موعدًا لفحوص الحساسية. اسأل الطبيب إذا كان يتعين عليك إيقاف تناول هيستازين قبل بضعة أيام من الفحوص. قد يؤثر هذا الدواء في نتائج فحوص الحساسية لديك.

الأطفال والمراهقون

يمنع إعطاء هذا الدواء للأطفال دون سن 6 سنوات.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

استعمال الدواء مع الطعام

يمكن تناول الدواء مع أو دون طعام. لا تؤثر الأطعمة في امتصاص الدواء.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لم تُشاهد ردود فعل ملحوظة من ناحية سريرية بين الكحول (بنسبة 0.5 بروميلى غم/لتر) في الدم، التي تعادل كاسًا من النبيذ) وبين سيتيريزين أثناء استعمال الدواء وفق الجرعات الموصى بها. لهذا، ليست هناك بيانات آمان متعلقة بتناول جرعات أعلى من سيتيريزين مع الكحول. لهذا، كما في الحال مع كل مضادات الهيستامين، يوصى بتجنب تناول هيستازين عند استهلاك الكحول.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تطبين أنك حامل، أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

يمنع تناول هيستازين أثناء الحمل. إذا استعملت امرأة حامل الدواء عن طريق الخطأ، لا يتوقع أن تحدث تأثيرات ضارة على الجنين. رغم ذلك، يجب تناول الدواء فقط عند الحاجة وبعد استشارة الطبيب.

ينتقل سيتيريزين عبر حليب الأم. لهذا، لا يجوز تناول هيستازين أثناء الرضاعة فيما عدا إذا أوصى الطبيب بذلك.

السياقة واستعمال الماكينات

لم يتبين من الأبحاث السريرية أن تناول هيستازين وفق الجرعات الموصى بها يسبب الإضرار بالتركيز، باليقظة والقدرة على السياقة. عليك متابعة ردود فعلك على الدواء عن كثب، وذلك بعد تناول هيستازين وفي حال كنت ترغب في السياقة، القيام بعمليات قد تكون خطيرة، أو تشغيل ماكينات. يمنع تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لاكتوز. إذا أخبرك الطبيب أنك تعاني من عدم القدرة على تحمّل سكريات معينة، عليك استشارة الطبيب المتعالج قبل تناول هذه الأقراص.

3. كيف تستعمل الدواء؟

استعمل هذا الدواء كما هو موصوف في هذه النشرة تماماً أو وفق تعليمات الطبيب أو الصيدلي. اخفض مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة المتبعة عند نفس تعليمات أخرى من الطبيب:

الأولاد في سن 12-6 عاماً: نصف قرص، مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً أو قرص واحد مرة في اليوم.

الأطفال الذين يزيدون أقل من 30 كغم: نصف قرص مرة في اليوم.

البالغون والأولاد بدءاً من سن 12 عاماً: قرص واحد مرة في اليوم على الأكثر.

البالغون والذين أعمارهم أكثر من 65 عاماً وملتقو العلاج الذين يعانون من خلل في أداء الكبد أو الكلى: عليهم استشارة الطبيب. إذا شعرت بنعاس أو دوخة، قد يقلل تناول نصف قرص، مرتين في اليوم، هذه الأعراض.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى.

تعتمد مدة العلاج على نوع، مدة، وسرورة تطور الأعراض لديك. استشر الطبيب. عليك إبلاغ الأقراص مع كأس من الماء. الأقراص قابلة للسحق/السطر/المضغ.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا كنت تعتقد أنك تناولت جرعة مفرطة من هيستازين، استشر الطبيب. فهو سوف يقرر ما هي الوسائل التي يجب اتخاذها، إذا كانت هناك حاجة لذلك. بعد تناول جرعة مفرطة، قد تظهر الأعراض الجانبية الموصوفة لاحقاً بدرجة أعلى. تم الإبلاغ عن أعراض جانبية سلبية، مثلًا: ارتباك، إسهال، دوخة، تعب، صداع، الشعور بالمرض، توسع اليويوبين، حكة، عدم الراحة، خدر، نعاس، تليد الإحساس، وتيرة نظم قلب سريعة وغير سلبية، رجفان، واحتباس البول.

إذا نسيت تناول الدواء

يمنع تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن القرص المنسى. إذا نسيت تناول قرص في الوقت الاعتيادي، عليك تناوله فور تذكرك، ولكن تذكر أن عليك الانتظار 24 ساعة قبل أن تتناول القرص القادم.

إذا توقفت عن تناول الدواء

في أحيان قريبة، قد تشعر بحكة قوية (Pruritus) و/أو شرى (Urticaria) ثانية بعد التوقف عن تناول هيستازين.

يمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استعمال هذا الدواء أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تتزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أي منها.

الأعراض الجانبية التالية نادرة أو نادرة جداً، ولكن عليك التوقف عن تناول الأقراص والتحدث مع الطبيب فوراً إذا لاحظت ما يلي:

- ردود فعل أرجية، بما في ذلك ردود فعل خطيرة ووذمة وعائية (رد فعل أرجي) خطير يؤدي إلى تورم الوجه أو الحنجرة). قد تبدأ ردود الفعل هذه بعد وقت قصير من تناول الدواء للمرة الأولى، أو في وقت لاحق.

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر لدى حتى 1 من أصل 10 متعالجين

• التهاب (الميل إلى النوم)

• دوخة، صداع

• التهاب البلعوم والحنجرة (pharyngitis)، التهاب غشاء الأنف المخاطي (Rhinitis) (لدى الأولاد)

• إسهال، غثيان، جفاف الفم

• إنهاك

أعراض جانبية ليست شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى حتى 1 من أصل 100 متعالج

• عصبية

• تهمل (شعور غير عادي بالجد)

• ألم في البطن

• حكة في الجلد (Pruritus)، طفح

• إرهاق (تعب استثنائي)، ضعف

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى حتى 1 من أصل 1,000 متعالج

• ردود فعل أرجية، جزء منها خطير (نادرة جداً)

• اكتئاب، هلوسة، عوائية، ارتباك، أرق

• اختلاجات

• نبض قلب سريع (ضربات قلب سريعة جداً)

• أداء الكبد غير سليم

• شرى (طفح)

• وذمة (تورم)

• زيادة الوزن

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر لدى حتى 1 من أصل 10,000 متعالج

• مستويات منخفضة من الصفائح الدموية (Thrombocytopenia)

• تشنجات لا إرادية (Tics)

• إغماء (Syncope)، خلل الحركة (Dyskinesia – حركات لا إرادية)، خلل التوتر (Dystonia – تقلصات عضلية متواصلة غير عادية)، خلل الذوق (Disgeusia)

• ضبابية في الرؤية، صعوبات في تركيز النظر (اضطراب في التكيف)، حركات دائرية في العينين غير مُسيطر عليها

• وذمة وعائية (رد فعل أرجي خطير يؤدي إلى تورم الوجه أو الحنجرة)، طفح في موقع ثابت نتيجة استعمال الدواء

• تبؤل غير سليم (التبول في الفراش، ألم و/أو صعوبة في التبول)

أعراض جانبية ونيرتها غير معروفة (أعراض لم تُحدد وتيرة انتشارها بعد)

• الألم في المفاصل

• طفح مع كدمات ملينة بالخرافة

• زيادة الشهية

• ميل إلى الانتحار (أفكار متكررة أو التفكير في الانتحار)، كوابيس

• فقدان الذاكرة، ضرر في الذاكرة

• دوار (الشعور بالدوران أو الحركة)

• احتباس البول (نقص القدرة على إدرار كل كمية البول)

• حكة (Pruritus)، و/أو طفح (شرى) عند التوقف عن تناول الدواء

• التهاب الكبد (Hepatitis)،

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الردود الفعالة إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

يمكن الإبلاغ أيضاً عبر البريد الإلكتروني: safety@trima.co.il

5. كيف يُخزّن الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا يجوز التسبب بالتقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة واليمنتير. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

• يجب التخزين في مكان جاف بدرجة حرارة أقل من 25°C.

• يُمنع إلقاء الدواء في مياه الصرف الصحي أو في سلّة المهملات في البيت. استشر الصيدلي لمعرفة كيف عليك التخلص من الدواء (الأدوية غير المستعملة). هكذا تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, HPMC, titanium dioxide, polyethylene glycol 400.

يحتوي كل قرص على 35 ملغ لاكتوز.

كيف يبدو الدواء، وماذا تحوي العبوة

• قرص مستدير أبيض مع خط للسطر في جهة واحدة. يُسوّق الدواء بعبوات ذات 7، 10، 20 قرصاً.

قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.

المُنتج وصاحب التسجيل: تريما، منتجات طبية إسرائيلية معبوت م.ض.، معبوت 4023000.

تم إعداد النشرة في تشرين الثاني 2020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

104-99-28579-00.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا الدواء معدّ لكلا الجنسين.



معبوت 4023000

منتجات طبية إسرائيلية

معبوت م.ض.